

위 소 탄- 에프정

【원료약품의 분량】 1정 중

건조수산화알루미늄겔(KP)	250mg
탄산마그네슘(KP)	160mg

【성 상】 백색의 장방형 정제

【효능·효과】

위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 식체(위체)(제함), 구역, 구토, 위통, 신트림

【용법·용량】

성인 1회 3정, 1일 3회 식 후 복용

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
투석요법을 받고 있는 환자
2. 다음 사항에 주의할 것.
1) 신장애(신장장애) 환자
2) 다른 약물을 투여받고 있는 환자
3. 부작용
이 약을 투여받는 동안 변비 또는 설사의 증상이 나타날 수 있다.
4. 일반적 주의
1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
2) 2주 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 의사와 상의할 것.
3) 장기연용을 하지 않는다.
4) 신장병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 의사와 상의한다.
5. 소아에 대한 투여
이 약은 7세 이하의 영·유아에게는 투여하지 않는다.
6. 저장상의 주의
1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2) 직사광선을 피하고 되도록이면 서늘한 곳에 보관할 것.
3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

【포장단위】 500 정

- ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정 중 변질 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 반드시 설명서를 읽은 후 사용(복용)하시고, 설명서는 약과 함께 보관하십시오.
- ※ 올바른 사용(복용)법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.
- ※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사·약사 또는 식품의약품안전처 (이지드럭 → 보고마당 → 안전성 정보 → 의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.
- ※ 의약품 용어 설명 및 기타 자세한 의약품정보는 식품의약품안전처 온라인 의약품도서관 (<http://drug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.
- ※ 이 첨부 문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 (02)588-0941 에서 확인할 수 있습니다.
- ※ 제품의 유효기간은 외부용기에 표시되어 있습니다.

최종개정일자 2014.06.25