

재발율이 낮은 무좀약

무조날[®]

외용액 1%
(테르비나핀염산염)

일반의약품	
의 약 품	265
분류번호	기생성 피부질환용제

무조날외용액은 무좀, 사타구니백선, 어루러기와 같은 진균(곰팡이)에 의한 피부질환에 광범위하게 사용되는 제제입니다. 무좀, 사타구니백선, 어루러기 등은 재발이 잘되는 피부질환이며 만성질환으로 진행되기 쉽습니다. 무조날외용액은 allylamine계 약물로서 기존 항진균(곰팡이)제의 단점인 원인균에 대한 내성 발현(드러냄)이 적어 재발율이 낮으며, 피부사상균, 효모균과 같은 원인균에 대해 뛰어난 항진균(곰팡이)작용을 나타냅니다.

【원료약품의 분량】 100g 중
테르비나핀염산염 (KPC) 1g

【성 상】
무색 내지 미황색의 투명한 액제

【효능 · 효과】
1. Trichophyton(T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis 및 Epidermophyton floccosum과 같은 피부사상균에 의한 피부진균(곰팡이)감염증 : 족부백선(무좀), 고부백선(대퇴(넙적다리)부백선)(완선(사타구니백선), 체부백선
2. Pityrosporum orbiculare (Malassezia furfur)에 의한 어루러기

【용법 · 용량】
적응증에 따라 1일 1회 또는 2회 적용한다. 적용전에 환부(질환부위)를 깨끗이 씻고, 완전히 건조시킨 후 환부(질환부위)와 그 주위가 충분히 적셔지도록 충분한 양을 바른다.
치료기간 :
1. 족부백선(무좀), 고부백선(대퇴(넙적다리)부백선)(완선(사타구니백선), 체부백선 : 1일 1회, 1주
2. 어루러기 : 1일 2회, 1주
증상의 경감은 보통 2~3일 이내에 나타난다. 감염 재발을 방지하려면 이 약으로 적정기간 동안 정기적으로 치료한다. 치료기간 이후에도 임상적인 증상이 개선되지 않으면 진단을 다시 해야 한다

【특장점】
1. 광범위 스펙트럼의 항진균(곰팡이)제
allylamine계 약물로서 낮은 농도에서도 피부사상균, 몰드 및 효모균과 같은 원인균(진균(곰팡이))에 대해 살진균(곰팡이) 작용을 가지는, 광범위 스펙트럼의 항진균(곰팡이)제로, 특히 재발이 잘되는 내성발현(드러냄) 피부질환에 효과적입니다.
2. 뛰어난 항진균(곰팡이) 작용
테르비나핀 성분은 진균(곰팡이)세포의 세포막에서 스쿠알렌 에폭시다제의 작용을 저해합니다. 즉, 진균(곰팡이)의 스테롤 생합성 과정에서 스쿠알렌 에폭시다제의 작용을 차단하여 에르고스테롤의 결핍과 스쿠알렌의 세포내 축적을 초래하여 강력한 항진균(곰팡이) 효과를 나타냅니다.
3. 부작용이 적고 안전성이 높은 항진균(곰팡이)제
사이토크롬 p-450에 관여하지 않으므로 호르몬이나 기타 타약물의 대사에 영향을 미치지 않으며, 국소(부분)적용약물로 전신 부작용을 일으킬 확률이 극히 적은 안전성이 높은 제제입니다.
4. 뛰어난 피부흡수율, 높은 치료 효과
무조날 외용액은 피부에 바른면 흡수성이 뛰어나 신속하고 뛰어난 항진균(곰팡이)효과를 나타낼 뿐만 아니라, 자질 친화력이 높아 지방조직, 진피, 표피 등의 감염부위에 잘 흡수되며, 질환 부위에 국소(부분)적으로 약물농도가 높게 유지되어 치료효과가 더욱 높습니다.
5. 간편한 스프레이타입
무조날 외용액은 스프레이타입으로 사용이 더욱 간편합니다.

【사용상의 주의사항】
1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.
1) 테르비나핀 및 이 약 성분에 과민증 또는 그 병력이 있는 환자
2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부
3) 유 · 소아
2. 부작용
피부의 두드러기, 발적(충혈되어 붉어짐), 홍반, 가려움, 자극감, 국소의(부분적인) 접촉피부염, 피부 박리(벗겨짐), 자통(찌르는 것 같은 아픔)(刺痛), 작열감(화끈거림)이 적용부위에 나타날 수 있으며, 이러한 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
3. 일반적 주의
1) 과도한 자극이 나타나거나 더 심해지면 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
2) 의사의 지시가 없는 한 밀봉봉대법 또는 포장법을 사용하지 않는다.
3) 이 약에 대한 반응이 나타나지 않으면 진균(곰팡이)학적인 검사를 실시하여 다른 병원균에 의한 감염 여부 확인 후 다른 항진균(곰팡이)요법을 시행한다.

뿌리는 무좀약

무조날[®]

외용액 1%
(테르비나핀염산염)

일반의약품	
의 약 품	265
분류번호	기생성 피부질환용제

4) 에탄올 등의 알코올성 기제가 국소(부분)자극을 일으킬 수 있으므로 영 · 유아 또는 점막부위에 이 약 투여시 주의한다.
5) 손상되지 않은 피부에 있어서 이 약의 재흡수율이 낮아서 전신적 효과가 나타날 가능성은 희박하나 상처부위, 넓은 부위, 영아(갓난아기)(표면적/체중의 비율 및 배내옷의 밀봉 효과)의 경우에는 전신적 효과가 나타날 수 있으므로 주의한다.

4. 임부 및 수유부에 대한 투여
1) 동물에 대한 생식독성실험에서 태자독성의 위험성이 보고되지는 않았지만, 임신중의 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
2) 이 약은 모유로 분비되므로, 이 약을 투여중인 수유부는 수유를 중단한다.
5. 소아에 대한 투여
소아에 대해 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않으므로 이 약을 소아에 투여하지 않는다 (유 · 소아에 대한 사용경험이 적다).
6. 과량투여시의 처치
실수로 이 약을 복용한 경우에는 위세척 등의 적절한 처치를 한다.
7. 적용상의 주의
1) 이 약은 외용으로만 적용한다.
2) 안과(눈)용으로 각막, 결막에 사용하지 않는다. 실수로 눈에 들어갔을 경우에는 충분한 양의 물로 완전히 씻어 낸다.
3) 손톱, 두피, 입주위 및 질부위에 사용하지 않는다.
4) 자극을 일으킬 수 있으므로 균열(갈라짐), 미란(긁무름) 부위에는 주의하여 사용한다.
8. 저장상의 주의사항
어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 열리지 말 것, 제조일로부터 36개월

【포장 단위】 30mL

【제품문의처】 한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000 (수신자요금부담)

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. (구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 사용하지 마십시오.

※ 주의
1. 정해진 용법 · 용량을 준수하여 사용할 것.
2. 잘못 사용을 막고 품질의 보증을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.
3. 먹지 말 것. 눈, 코, 귀 등에 내용물이 들어가지 않도록 주의할 것.
4. 스프레이 작동 시 단발로 눌러서 사용할 것.
5. 사용도중 연속분사가 안될 시에는 잠시 후 사용할 것.
6. 사용 후 스프레이 끝부분을 휴지(또는 위생타월)로 깨끗이 닦아 보관할 것.


제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

설명서 개정연월일 : 2012. 07. 06

제조외리자:
Hanmi 한미약품(주)
(본사)서울특별시 송파구 위례성대로 14
(공장)경기도 화성시 팔탄면 무화로 214
제조자: 한국콜마(주) 충청남도 연기군 전의면 산단길 245

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는 설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.



8 801121 002551
Ver.00255004