

알러콘 점안액

(케토티펜푸마르산염)

일반의약품

의 약 품	131
분류번호	안과용제

【원료약품의 분량】1mL 중

주성분 : 케토티펜푸마르산염(BP)..... 0.69mg
(케토티펜으로서 0.50mg)
첨가제(보존제) : 벤잘코늄염화물(KP)..... 0.1mg
첨가제(완충제) : 수산화나트륨, 염산
첨가제(등장화제) : 붕산
첨가제(안정(화)제) : 에데트산나트륨수화물, 타우린
첨가제(용제) : 주사용수

【성 상】

투명성이 있는 플라스틱 용기에 든 무색 투명한 점안(눈에 넣음)액

【효능 · 효과】

알려지성 결막염

【용법 · 용량】

성인 : 1회 1적, 1일 2~4회, 또는 상태에 따라 적절히 점안(눈에 넣음)한다.
유 · 소아 : 의사의 처방에 따른다.

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것
이 약 성분에 과민증의 병력이 있는 환자
- 부작용
이 약 투여로 일시적인 작열감(화끈거림)이 가끔 나타날 수 있고, 충혈, 부종(부기), 가려움증과 같은 국소(부분) 자극이 드물게 보고되었다. 안검(눈꺼풀)염, 안검(눈꺼풀)피부염이 생길 수 있으며, 이 경우 투여를 중지한다.
- 일반적 주의
1) 점안 후 시야가 흐려지는 것을 경험한 사람은 시야가 뚜렷해질 때까지 운전이나 기계조작을 해서는 안된다.
2) 드물게 졸리움이나 진정작용이 나타날 수 있으므로 운전이나 기계조작에 적절한 주의가 필요하다.
- 상호작용
케토티펜푸마르산염을 경구투여시
1) 중추신경저하제, 항히스타민제, 알코올의 작용을 강화시킬 수 있으며,
2) 경구(먹는) 다이아트약과 병용(함께 복용(사용))은 Thrombocyte의 가역적인(회복 가능한) 저하를 유발할 수 있다. 그러나 점안액과의 상호작용에 대해서는 알려진 바 없다.
- 임부, 수유부에 대한 투여
동물시험결과 태아에 위험을 끼친다는 증거는 없으나 사람에 대한 연구 결과는 없으므로 안전성이 유효성을 상회(웃돌)할 경우에만 투여한다.
- 과량투여
부주의로 인하여 이 약 1병(5mL)을 구강(입 안)으로 투여하였다 해도 케토티펜푸마르산염의 섭취량은 1일 경구투여(먹는) 권장량보다 현저히 적으므로 과량투여의 염려는 없다.
- 적용상의 주의
콘택트렌즈 착용자는 렌즈를 제거한 상태에서 이 약을 점안(눈에 넣음)하고, 점안(눈에 넣음) 후 적어도 15분이 지난 후에 렌즈를 재착용하도록 한다.
- 저장상의 주의사항
15~25℃에 보관하고, 개봉 후 4주가 지나면 사용하지 말 것.

【저장방법】

기밀용기, 상온(15~25℃)보관

【포장단위】

1병(5mL)/카톤

【제품문의처】

한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000 (수신자요금부담)

- ※ 사용자 편의상 용기 내 빈공간이 존재하며 제품의 용량은 표시사항과 동일합니다.
- ※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. (구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)
- ※ 사용기한이 경과한 제품은 사용하지 마십시오.
- ※ 주의
1. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
2. 정해진 용법 · 용량을 준수하여 사용할 것.
3. 잘못사용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.
4. 사용 시, 용기 입구가 손이나 눈에 닿지 않도록 주의할 것.
5. 먹지 말 것. 코, 귀 등에 내용물이 들어가지 않도록 주의할 것.
6. 뚜껑을 잘 닫아 보관하시고, 치료 종료 후 남은 점안액이 있을 시, 이후 재사용하지 않는 것이 좋음.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포자재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

설명서 개정연월일 : 2017. 01. 02

Hanmi 한미약품(주)

(본사)서울특별시 송파구 위례성대로 14
(공장)경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자에게서는
설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.