

항생제

레보박테라징

(레보플록사신수화물 100mg)

【성분·항형】1형 중

레보플록사신수화물(KP) 100.0mg

【성 상】백색·미황백색의 필름코팅정

【효능·효과】

● 유효균종

포도구균, 황녹연쇄구균, 옅황연쇄구균, 장내구균, 폐렴구균, 폐도연쇄구균, 임균, 대장균, 시트로박터, 시겔라, 엔테로박터, 세리티아, 프로테우스, 녹농균, 헤모필루스 인플루엔자, 아시네토박터, 캄필로박터, 클라미디아 트라코마티스

● 적응증

- 중기, 균종기, 얇은 연조직염(단독), 연조직염, 말성염, 림프관(절)염, 피하농양, 접촉성 여드름, 감염성 죽종, 농양낭, 손끝염(포자), 유선염, 외상·열상·수술상 등의 (표제성) 2차감염, 항문주위농양
- 인후두염, 급성 기관지염, 만성 기관지염, 미만성 폐세기관지염, 만성호흡기질환의 2차감염, 폐렴, 기관지확장증(감염성)
- 신우신염, 방광염, 전립선염, 임균성요도염, 비임균성요도염, 부고환염
- 세균성 이질, 장염
- 담낭염, 담관염
- 농개염, 다기관, 농양, 감염성전, 각막결막
- 판도염, 중이염, 부비동염, 치주조직염, 임균

【용법·용량】보통 성인 레보플록사신수화물로서 1회 100mg을 1일 2~3회 경구투여하십시오. 중증 또는 효과가 불충분한 환자는 이 약으로서 1회 200mg, 1일 3회 투여하십시오.

연령, 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 경고
 - 1) 레보플록사신 등의 퀴놀론계 항균제를 투여받은 환자 중에서 외과적 수술이 필요하거나 또는 장기간의 연장을 유발하는 아메노·소·아질레온 등의 건파열이 보고되었습니다. 시판후 조사에서는 이러한 위험성은 고정하거나 나 스테로이드와 병용 시 더 증가합니다. 환자가 통증, 열증, 건파열을 경험하면 이 약의 투여를 중지해야 합니다. 그리고 건염 또는 건파열이 아픔을 확실히 진단받은 때까지 휴식을 취하고 운동을 삼가야 합니다. 건파열은 이 약 투여 중 또는 투여 후에도 나타날 수 있습니다.
 - 2) 퀴놀론계 항균제는 신근육자단 작용이 있어 중증 근육관절염의 경우 증상이 더 심해 질 수 있다. 시판 후 조사에서는 퀴놀론계 항균제를 복용한 중증근육 환자에게서 사망과 호흡 보조기가 필요한 경우를 포함한 심각한 이상반응이 보고되었다. (‘3. 신중투여’ 참조)
2. 다음 환자에게는 투여하지 마십시오.
 - 1) 이 약 및 퀴놀론계 항균제에 과민반응의 병력이 있는 환자
 - 1) 이 약 및 퀴놀론계 항균제로 인한 간염, 건파열의 병력이 있는 환자
 - 3) 소아 및 18세 이하의 성장 중인 청소년
 - 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
 - 5) 간질 환자
3. 다음 환자에게는 신중히 투여하십시오.
 - 1) 중증 신장장애 환자
 - 2) 중증 뇌동맥경화증 등의 중추신경계 질환이 있거나 의심되는 환자(경련의 위험이 있습니다.)
 - 3) 경련성 질환의 병력이 있는 환자(경련의 위험이 있습니다.)
 - 4) 펜바민, 플루로비프로판과 같은 페닐토산계 비스테로이드소염제 및 테오필린을 투여 중인 환자(경련의 위험이 있습니다.)
 - 5) 고령자
 - 6) 임신된 또는 경구용 혈당강화제와 이 약을 동시에 투여받은 당뇨병 환자
 - 7) 글루코코르티코스테로이드(글루코코르티코스테로이드)를 투여받은 환자(중증 감염의 위험이 있습니다.)
 - 8) 중증근육경화 환자(중증이 더 심해질 수 있습니다.)
4. 이상반응

- 1) 속: 드물게 속이 나타나는 경우가 있으므로 충분히 관찰하고, 혈당강화, 호흡곤란, 흉부압박감 등의 증상이 나타나는 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.
- 2) 과민반응: 치명적인 과민반응과 아나필락시스 반응이 보고되었고 일부 반응은 심장혈관 허탈, 저혈압, 쇼크, 발작, 의식상실, 저리진, 맥관부종, 기도 폐쇄, 호흡곤란, 두드러기, 가려움, 빠른 심장 박동, 연하곤란, 기타의 심각한 피부부종과 동반되어 나타날 수 있습니다. 또한 약물과의 연관관계는 명확하지 않지만 레보플록사신을 포함한 퀴놀론계 항생제를 반복투입한 환자에게 드물게 과민성 혈관염 등의 증상을 수반하는 심각한 또는 치명적인 과민반응이 보고되었습니다. 이러한 증상이 나타나는 경우 투여를 중지하십시오. 또한 과도한 햇빛이나 인공적인 자외선은 피하며 또한 수포, 홍반 등을 동반한 광과민반응이 나타나면 투여를 중단하십시오.
- 3) 정신신경계: 때때로 불면, 어지러움, 두통, 드물게 감각이상, 떨림, 불안, 우울, 정신병적 반응, 초조, 혼돈, 경련, 매우 드물게 시작 및 청각장애, 미각 및 후각 장애, 환각 등이 나타날 수 있습니다. 말초신경 장애로서 드물게 감각이상 또는 감각장애, 손떨림, 손가락의 다발성 신경병증의 결과로 감각이상, 감각장애, 근육 약화 등이 나타날 수 있습니다. 또한 통증, 저혈압, 저림, 무감각, 가벼운 근육통, 두통, 어지, 진전감각 등의 변화가 수반되는 신경 증상(신경이 나타난 투여를 투여하지 마십시오. 오 플록사신에서 드물게 저리진(신경이 나타나는)은 보고되었습니다. (‘일반적주의’ 참조)
- 4) 순환기계: 때때로 심계항진 같은 심장박동 장애가 나타날 수 있습니다. 심전도상에서 QT 간격 연장, 드물게는 부정맥과 관련되는 것으로 보고되었고 시판후 조사에서 Torsades de pointes가 드물게 보고되었으며 저칼륨증, 유익의 사맥, 심전도장애와 같은 Torsades de pointes에 대한 위험(간접적) 존재하는 환자는 투여를 금하십시오.
- 5) 신장: 때때로 BUN, 혈청크레아티닌의 상승, 매우 드물게 급성신부전이 나타날 수 있습니다. 또한 약물과의 연관관계는 명확하지는 않지만 레보플록사신을 포함한 퀴놀론계 항생제를 반복투입한 환자에게 드물게 사이질성 신장염 등의 증상을 수반하는 심각한 때때로 치명적인 과민반응이 보고되었습니다.
- 6) 간장: 흔히 간효소(AST/ALT) 상승, 때때로 급성 간과사, 급성 간부전, 중증 간염, 간장애, 황달, ALP, γ-GTP, 총 빌리루빈의 상승 등이 나타날 수 있습니다.
- 7) 혈액계: 때때로 백혈구 감소, 적혈구 감소, 헤모글로빈 감소, 헤마토크리트 감소, 호산구 증가, 범혈구수상, 빈혈, 옅은색 빈혈(중성: 헤모글로빈), 혈소판감소증, 매우 드물게 무관구성혈이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하십시오.
- 8) 소화기계: 때때로 구역, 구토, 복부불쾌감, 설사, 식욕부진, 복통, 복부팽만감, 드물게 소화불량, 구내염, 혀염, 목막막, 변비 등이 나타날 수 있습니다. 또한 드물게 생명을 위협하는 치명적인 위막성대장염 등의 질환을 수반한 대장염이 나타나는 경우가 있으므로 복통, 빈번한 설사 등 증상을 의심하는 증상이 나타나면 투여를 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.
- 9) 근골격계: 근육통, 무력감, CPK 상승, 혈중 및 요중 미오글로빈 상승을 특징으로 하는 급격한 신기능 약화를 수반한 횡문근융해증이 일어날 수 있으므로 주의하십시오. 드물게 관절통, 관절 등의 건질염, 매우 드물게 건파열이 일어날 수 있습니다. 근력 약화가 나타날 수 있는데, 특히 중증근무력증 환자는 증상이 더 심해질 수 있으므로 주의하십시오.
- 10) 피부: 피부점막증후군(스티븐스-존슨증후군), 중증표피괴사증후군(리얼증후군)이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰하고 이상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.

- 1) 호흡기계: 발열, 기침, 호흡곤란, 흉부X선 이상, 호산구 증가 등을 동반하는 간질성폐렴, 알레르기성폐렴이 나타날 수 있으므로 주의하고, 이런 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 부신피질호르몬제 투여 등의 적절한 처치를 하십시오.
- 2) 경구용 혈당강화제 또는 인슐린을 복용중인 당뇨병 환자에서 혈당장애(고혈당 또는 저혈당)가 보고되었으며, 이러한 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 하십시오.
- 3) 기타: 보이베라카에서 시행된 3상 임상시험에서 이 약과 관련성이 있는 유해반응은 피험자의 6.7%에서 발생되었습니다. 피험자중 4.1%는 유해사건으로 인하여 이 약의 투여를 중지하였습니다. 전반적인 발현율과 유해사건의 종류 및 분포는 750mg을 1일 1회 투여한 경우, 250mg을 1일 1회 투여한 경우, 500mg을 1일 1회 또는 1일 2회 투여한 경우에서 유사하게 나타났습니다. 본 임상시험에서 이 약을 투여받은 피험자 중 이 약과 관련성이 있는 것으로 판단된 약을 유해사건은 다음과 같습니다.: 구역 1.5%, 설사 1.2%, 진전 0.5%, 불면증 0.4%, 복통 0.4%, 해태부종 0.2%, 가려움 0.2%, 어지러움 0.3%, 발진 0.3%, 소화불량 0.3%, 생식기감염 0.2%, 칸디다증 0.2%, 미각도착증 0.2%, 구토 0.3%, 변비 0.1%, 전균감염 0.1%, 생식기 가려움증 0.1%, 두통 0.2%, 신경통 0.1%, 혼란발생 0.1%, 두드러기 0.1%, 식욕부진 0.1%, 졸림 0.1%, 흉부 0.1%, 구갈 0.2%, 떨림 0.1%, 알레르기 반응 0.1%.

5. 일반적 주의

- 1) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발전 등을 방지하기 위하여 감수성을 확인하고 치료상 필요한 최소 기간만 투여하는 것이 바람직합니다.
- 2) 위험요인이 있는 환자에게는 경련 또는 다른 중추신경계 이상반응이 나타날 수 있음을 알려야 합니다.
- 3) 이 약에 의한 광과민반응은 매우 드물게 나타나지만, 광과민반응을 방지하기 위해 환자는 스스로 불필요하게 강한 햇빛이나 인공적인 자외선(예를 들어 태양광선 등, 일광욕실 등)에 노출시키지 않도록 해야 하며, 발진 등의 광과민반응이 의심되는 증상이 발생할 시 투여를 중단해야 합니다.
- 4) 운전 또는 기계조작에 미치는 영향
어지러움, 졸림, 시각장애와 같은 바람직하지 않은 효과들이 환자의 집중력 및 대처능력을 손상시킬 수 있으며, 이는 자동차 운전 중 또는 기계조작과 같은 일에 영향을 줄 수 있습니다.
- 5) 대수요인인 심각한 폐렴구균성 폐렴의 경우는 이 약이 적절한 치료제가 되지 못할 수도 있습니다. 그리고 녹농균(*P. aeruginosa*)에 의한 병원체 감염은 다른 약물과의 병용투여가 필요합니다.
- 6) 이 약을 포함한 거의 대부분의 항균제에서 중증에서 생명을 위협하기도 하는 위막성대장염이 보고되었습니다. 그러므로 어떤 항균제든 투여 후에 설사하는 환자는 주의하여야 합니다. 클로스트리듐 디피테리움(*Clostridium difficile*)에 생성되는 독성물질이 1차적인 원인으로 알려져 있으므로, 위막성대장염이 의심될 때는 이 약의 투여를 즉시 중지하고, 환자에게는 지체없이 보조수단 즉 특수치료로 처치(예를 들어 경구용 반코마이신 등)를 실시하여야 합니다. 이런 임상상태에서는 장 운동을 저해하는 제제는 금하여야 합니다.
- 7) 말초신경병증이 약을 포함한 플루로비프로판과 같은 퀴놀론계 항균제를 투여받은 환자에서 감각신경 또는 감각운동 축색의 다발성 병증의 결과로 감각이상, 감각저하, 감각장애 및 쇠약 등이 보고되었다. 중상은 이 약의 치료 시작 후 빠르게 나타날 수 있고 비가역적일 수 있다. 저혈압, 저림, 무감각, 가벼운 근육통, 두통, 온도, 위치, 진동감각 등의 변화가 수반되는 신경병증의 증상을 경험한 환자는 비가역적인 상태로 진행되는 것을 예방하기위해 이 약의 투여를 중단해야 한다.

6. 상호작용

- 1) 이 약을 포함한 퀴놀론계 항균제와 비스테로이드소염제에: 펜바민, 플루로비프로판과 같은 페닐토산계 또는 프로피온산계류의 병용투여는 중추신경자극과 경련성 발작의 위험을 증가시킬 수 있으므로 신중히 투여하십시오.
- 2) 알부민 또는 마그네슘 함유 제제, 수크랄레이트, 철분 함유 제제, 칼슘 함유 제제, 아연 또는 철분이 함유된 복합비타민제와 병용에 의해 흡수가 저하되어 효과가 저하되는 경우가 있으므로 이 약 투여 전후 2시간 이내에는 병용하지 않는 것이 바람직합니다.
- 3) 퀴놀론계 항균제는 테오필린과의 병용투여 시, 테오필린의 혈중농도를 증가시키고 그 작용을 증강시킨다는 보고이므로 병용하는 경우에는 테오필린을 감량하는 등 신중히 투여하십시오.
- 4) 이 약은 와파린과 같은 경구 항응고제와 단백결합부위에 경쟁적으로 작용하여 항응고제의 작용을 증강시켜 출혈, 프로트롬빈시간 연장 등이 나타났다는 보고이므로 항응고제의 용량을 줄여야 하며, 병용 시 적절한 모니터링이 필요합니다.
- 5) 이 약을 사이클로스포린과 병용투여 시 사이클로스포린의 반감기가 33% 증가하지만, 용량조절은 필요치 않습니다.
- 6) 프로베네시드와 시메티딘
프로베네시드와 시메티딘은 이 약의 소실에 통계학적으로 유의성 있는 영향을 주었습니다. 이 약의 신장소일은 시메티딘에 의해 24%, 프로베네시드에 의해 34%씩 감소하였습니다. 이것은 두 약물 모두 이 약의 신장노출을 배설 차단 물질이 있기 때문인 것으로, 이러한 결과가 비로 어떤 임상적인 의미를 가지는 것은 아니라고 생각되지만, 이 약을 특한 환자에서 있는 환자에게 프로베네시드, 시메티딘과 같은 신장노출 배설에 영향을 주는 약물과 병용투여하는 경우에는 신중히 투여해야 합니다. 이 약의 관 분비를 저해하여 이 약의 오용감염 치료효과를 감소시킬 수 있습니다.
- 7) 당뇨병증상: 퀴놀론계 항균제와 함께 복용할 경우 혈당장애(고혈당 또는 저혈당)가 보고되었으며 병용투여 시 혈당 당수치를 주의감에 모니터링해야 합니다.
7. 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 1) 동물위생시험소 연구에서는 특별한 문제가 없었습니다. 그러나 사람에 대한 연구자료가 부족하고, 퀴놀론계 항균제가 성장 중인 생명의 재충을 지탱하는 역할을 손상시키는 실험적인 위험성 때문에, 이 약은 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 투여하지 않습니다.
 - 2) 이 약과 구조적으로 유사한 옴록사신에서 모유 중으로 이행되는 것이 알려져 있으므로, 이 약 투여 중에는 수유를 중단하십시오.
8. 소아에 대한 투여: 이 약을 포함한 퀴놀론계 항균제는 몇몇 어린 동물종에서 관절염증, 뼈연골증을 유발하였습니다. 소아 및 18세 이하의 성장 중인 청소년에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않습니다.

- 9) 이 약은 주로 신장으로 배설되는데, 고령자는 신기능이 저하된 경우가 많아 높은 혈중농도가 지속될 위험이 있고 이 상반응이 발생할까 쉬우므로, 용량 및 투여간격을 유의하여 신중히 투여하십시오.
- 1) 시판후 조사에서 중증/때로는 치명적인 간독성이 65세 이상의 노인환자에게서 보고 되었습니다. 만약, 간염의 증상이나 중증이나 나타나는 환자에게는 즉시 이 약의 투여를 중지하십시오.
10. 과감투입시의 처치
마우스, 랫트, 개, 원숭이를 이용한 동물실험에서 이 약의 경구제제를 단일 옴록사신으로 투여하였을 때 조혈운동불능, 농개수저진, 운동활동 감소, 호흡곤란, 허탈, 떨림, 경련과 같은 중추신경계 증상과 QT 간격의 연장이 나타났습니다. 과량투여 시 위세척을 실시하고, 환자를 주의감에 관찰하여 적절한 수액보충을 실시하여야 하며, QT 연장의 연장 정도 때문에 심전도 모니터링이 필요합니다. 이 약은 혈액투석이나 복막투석을 통해서도 효과적으로 제거되지 않습니다.
11. 기타: 동물실험(어린 개, 젊은 성견, 어린 랫트)에서 간독성이 나타났다는 보고가 있습니다.

【포장단위】30정, 100정

【저장방법】밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

- 본품을 구입할 때 사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- 본제품은 공공기관위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품포털(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

- ① 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 www.seoulpharma.com이나 (080)780-1931에서 확인하실 수 있습니다.
- 작성일자: 2014. 12. 05 PM.102138(00)

【제조자】(주)서울제약: 경기도 시흥시 경제로 59



마음까지 건강하게

(주)서울제약