

천연 철단백 조절영양제

훼마틴 캡슐

Fematin Caps.

일반의약품 | 분류번호: 322

훼마틴캡슐의 주성분인 Ferritin은 순수한 철의 비강에서 분리 추출된 천연 철결합 단백질로서 Ferritin 1분자는 철(Fe)원자 약 3,000개와 결합하여 생체내에 존재하며 체내의 철분 요구량이 증가될 경우 철분은 단백질로부터 즉시 유리되어 생체내에서 이용될 수 있는 인체내의 유일한 저장철의 형태입니다.

Ferritin은 생체조혈인자로 기존의 무기·유기합성철이 아닌 천연 추출물의 철단백이므로 생체내 이용률이 높고 철결합 용성 문제가 되던 위장장애가 나타날 확률은 극히 드물어 안심하고 복용할 수 있습니다. 또한 훼마틴캡슐은 Folic acid와 Cyanocobalamin이 고단위로 복합처방되어있으며 복용이 간편하고 흡수 및 효력이 빠른 철단백 조절제입니다.

1. Vymazal J, Brooks RA, Bulte JW, Gordon D, Aisen P.: Iron uptake by ferritin: NMR relaxometry studies at low iron loads. J Inorg Biochem. , 71(3-4):153-7. 1998.

성상

적갈색의 분말이 든 적갈색의 경질캡슐제

원료약품 및 그분량 | 1캡슐 중

철단백추출물(별규)	155 mg
시아노코발라민(KP)	500 µg
철산(KP)	800 µg
첨가제(보조제) : 파라옥시벤조산메틸 0.13 mg, 파라옥시벤조산에틸 0.06 mg, 파라옥시벤조산프로필 0.10 mg	

효능 및 효과

철결핍성 빈혈의 예방 및 치료, 개양성 대장암 및 위·십이지장궤양 등 출혈성 질환에 수반되는 빈혈

용법 및 용량

성인 및 12세 이상 어린이 1일 1회,
1캡슐 식후 복용

저장방법

기밀용기

포장단위

20, 30, 60, 100, 300캡슐

사용상의 주의사항

1. 경고 - 철 함유제제는 6세 이하의 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우, 중독성 사망을 일으킬 수 있으므로 어린이의 손에 닿지 않도록 보관한다. 만약 어린이가 사고로 과량 복용하였을 경우, 즉시 의사나 응급센터에 연락한다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분과의 과민 반응 환자 2) 12개월 미만의 영아 3) 혈액소중(철 대사이상으로 철이 과잉, 쇄장에 침착하는 질환), 헤모시데린침착증 환자 4) 비철결핍성 빈혈 (예 : 비타민 B12 결핍으로 인한 거대적아구성 빈혈) 환자 5) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해소결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다. 3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것 1) 인산염, 칼슘염 2) 경구용테트라사이클린계 제제 3) 제산제 4. 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것 - 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차 및 유유·유제품은 복용중, 복용전후에는 피할 것 5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 소화성 궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자 3) 심장·순환기계기능 장애 환자 4) 신장에 환자 5) 저단백혈증 환자 6) 항알도스테론제, 트리암테렌과 함께 복용하는 사람(고칼혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것) 7) 카복시계, 페니실린, 클로람페니콜, 네오미신, 클레스티라민, 제산제 및 비타민 E와 같은 물질을 복용하는 사람

6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것 상당심 가능한 이 첨부문서를 소지할 것 1) 두드러기, 가려움, 햇빛 노출시 피부 과민 반응 2) 복부·위통증, 위 경련 3) 열, 혼수 4) 구역, 구토, 식욕부진, 설사, 변비, 위부부과감 5) 팔이나 부종한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 µg 이상 투여 할 경우 혈액학적 반응이 나타날 수 있다. 6) 대량 투여로 인해 구역, 구토 등의 위장 증상, 고나트륨혈증, 올혈성심부전, 부종등의 증상이 나타날 수 있다. 7. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것 2) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독하에 복용할 것 3) 일정기간 복용하여도 증상이 개선되지 않으면 의사 또는 약사와 상의할 것 4) 천연 페리틴의 경우 복용으로 위장장애가 나타날 확률은 극히 드물다 5) 변비, 구역, 설사, 위통과 같은 병발증상은 대부분의 경우 경미하고 일시적인 것이므로 이로 인해 투약을 중지할 필요는 없다. 6) 아스코르브산비타민 C 200 mg 이상과 함께 복용하는 경우 철분의 흡수가 증가될 수 있다. 8. 저장상의 주의사항 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 적자광선을 피하고 있을 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여 보관할 것 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것

※ 기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오 ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국에서 교환해드립니다. ※ 본 첨부문서의 내용은 최신정보 및 허가사항의 변경에 따라 계속 수정되고 있으므로 사용전에 주의깊게 읽어주시고 의약품과 함께 보관하여 주십시오 ※ 의약품은 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다. ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → 정보마당 → 의약품 등 정보를 참조하십시오 ※ 표지되지 않은 부속물이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전청에 전달하십시오.

2011. 5. 12 등록번호 P11050488 ↓ 뒷면계속
타사제(사제) | KGMP적격업체 |
제출일자. | 조아제약(주) |
- 본사: 서울특별시 영등포구 문래동 3가 55-7 · 공장: 경남 함안군 함안읍 파수리 465
- 인터넷홈페이지 <http://www.chcra.co.kr> · 수신자부담교정상담실 080-888-8888