



※ 의약품 사용하기 전에 다음 문서를 주의깊게 읽고 반드시 의약품과 함께 보관하세요.

빠르고 시원한 변비약

생장환에스정



【성분·함량】 1정(350mg)중

도큐세이트나트륨(USP)	12mg
센나엽가루(BP)[히드록시안트라센글리코사이드(센노사이드B)로서 1.4mg]	55mg
Tinnevely 센나엽가루(BP)[히드록시안트라센글리코사이드(센노사이드B)로서 1.2mg]	55mg
비사코딜(KP)	5mg

첨가제(타르색소) : 녹색3호

동물유래성분 : 유당수화물(KP)/소/우유

【성상】 녹색의 원형 장용성 필름코팅정제

【효능·효과】 변비, 변비에 수반하는 다음 증상의 완화 : 머리가 무거움, 역상, 피부거침, 부스럼, 식욕 부진(식욕감퇴), 복부팽만, 장내이상발효, 치질

【용법·용량】 성인(15세 이상) 1회 1~3정을 1일 1회 취침전(또는 공복(빈 속)시)에 복용해 주십시오. 단, 처음은 최소량을 이용하고, 변통의 비율이나 상태를 보면서 조금씩 증량(양을 늘림) 또는 감량(줄임)해 주십시오.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약은 유당수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 심한 복통 또는 구역, 구토가 있는 사람
- 2) 의사의 치료를 받고있는 사람

3. 부작용.

- 1) 본제(이 약)의 복용에 의해 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 심한 복통, 설사, 구토 등이 나타난 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담해 주십시오.
- 2) 1주일간 복용하여도 증상의 개선이 보이지 않는 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사에게 상담하여 주십시오.

4. 일반적 주의.

- 1) 정해진 용법·용량을 엄수하여 주십시오.
- 2) 다른 설사약과는 동시에 복용하지 말아 주십시오.

5. 임부에 대한 투여

임산부 또는 임신하고 있다고 생각되는 사람은 신중히 투여하여 주십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관하여 주십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 피하고 품질을 유지하기 위해 다른 용기에 바꾸어 넣지 말아주십시오.

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【포장단위】 자사포장단위

【고객상담실】 02-574-2541

본 의약품은 KGMP적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 보상받을 수 있습니다.

2011년 3월 16일 이후 변경된 내용은 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.



정우신약주식회사

충청남도 아산시 신창면 읍내리 80-13
<http://www.jwpharm.co.kr> / T : 041) 533-6191

