

입안을 건강하게

이바내정

일반의약품 | 분류번호 : 313

※ 의약품을 사용하기 전에 다음 문서를 주의 깊게 읽고 반드시 의약품과 함께 보관하세요.

【제품명】 이바내정

【원료약품 및 그 분량】 1정 (350mg) 중

* 유효성분 : 리보플라빈부티레이트(KP)	10mg
피리독신염산염97%과립(별규)(피리독신염산염으로서 50mg)	51.55mg
아스코르브산97%과립(별규)(아스코르브산으로서 25mg)	25.77mg
니코틴산아미드(KP)	15mg
비오틴1%(별규)(비오틴으로서 25μg)	2.5mg
L-시스테인(DAB)	15mg
의이인건조엑스(별규)(의이인으로서 650mg)	50mg
* 동물유래성분 : 유당수화물/소/우유	
* 기타첨가제 : 옥수수전분, 히드록시프로필셀룰로오스, 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 탭실드흰색(19W623), 탭실드갈색(59B691), 탭실드클리어(92C569)	

【성상】 갈색의 원형 필름코팅정제

【효능·효과】

1. 다음 경우의 비타민 B₂, B₆의 보급
육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후) 체력저하시
2. 다음 증상의 완화
구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

【용법·용량】 15세 이상 어린이 및 성인 : 1회 2정을 1일 1회 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자
 - 2) 만 3개월 미만의 영아(젖먹이, 갓난아)
 - 3) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다
2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
레보도파
3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)

- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 4) 통풍환자 또는 신장(콩팥)결석에 있는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
 - (1) 구역, 구토, 설사
 - (2) 식욕부진, 복부(배부분)팽만감
- 2) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 3) 피리독신을 1일 500 mg ~ 2 g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
- 4) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(요산과다증)(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
- 5) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 6) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것.
- 3) 복용 시 의사, 한의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
- 4) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 5) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

【포장단위】 자사포장단위

【사용기간】 제조일로부터 36개월

【제조자】 정우신약(주) / 충청남도 아산시 신창면 서부남로790번길 60

본 의약품은 KGMP적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 구입한 약국을 통하여 교환하여 드립니다.

본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 보상받을 수 있습니다.

※ 최종수정일자(2020년 08월 18일) 이후 변경된 내용은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템 (<https://nedrug.mfds.go.kr>) 또는 문의(☎ 02-574-2541)에서 확인할 수 있습니다.

※ 부작용보고 : 한국의약품안전관리원 (☎1644-6223)



정우신약주식회사

충남 아산시 신창면 서부남로790번길 60