

- **성상** : 황갈색의 삼각형 정제
- **효능·효과** : 방광염, 요도염, 신장염, 신증후군, 부종
- **용법·용량** : 성인 1회 3~6정, 만15세~8세 1회 2~3정, 1일 2회, 아침 저녁으로 공복시에 복용해 주십시오.
- **저장방법** : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

제조번호 :

사용기한 :



일반의약품

분류번호: 399

비뇨기계치료제

요로신정

방광염 · 요도염 · 신장염

20錠



정우신약주식회사

충청남도 아산시 신창면 읍내리 80-13

● 원료약품의 분량 <1정(300mg)중>

지 황(약전)	416.7mg
당 귀(약전)	416.7mg
목 통(약전)	416.7mg
황 금(약전)	250.0mg
택 사(약전)	250.0mg

차전자(약전)	250.0mg
감 초(약전)	125.0mg
치 자(약전)	125.0mg
웅 담(약전)	125.0mg
육 계(약전)	16.7mg

생 강(생규)	16.7mg
대 황(약전)	16.7mg
마 황(약전)	16.7mg
연 교(약전)	16.7mg
이상 수첨건조엑스	200mg

● 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 않 것.
 - 1) 임부 또는 임신할 가능성이 있는 부인(이 약에 함유되어 있는 대황의 자궁 수축작용 혹은 골반 내 장기의 유출작용에 의해 유조산의 위험이 있다.)
 - 2) 수유부(이 약에 함유되어 있는 대황 중 안트라퀴논 유도체는 모유중으로 이행되어 유아에게 설사를 야기할 수 있으므로 수유중에는 약물복용을 금지 하거나, 수유부에게는 복용하지 않는다.)
2. 다음 사람은 복용 전에 의사 또는 약사에게 상담해 주십시오.
 - 1) 혈압이 높은 환자 또는 고혈압 2) 심장 또는 신장에 장애가 있는 환자 3) 부 종에 있는 환자 4) 의사의 치료를 받고 있는 사람 5) 지금까지 약에 의해 발진, 발적, 가려움 등을 일으킨 적이 있는 사람 6) 설사, 묽은변의 증상이 있 는 환자(증상이 악화될 수 있다.) 7) 현재까지 위장이 허약한 환자 8) 식욕부 진, 구제, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.) 9) 현재까지 체력 이 쇠약해진 환자(부작용이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 우려가 있다.)
3. 복용시 다음 사항을 주의해 주십시오.
 - 1) 정해진 용법·용량을 엄수해 주십시오 2) 다음 약제와는 겸용하지 않아 주십 시오: 기타 설사제 3) 어린이에게 복용시키는 경우에는 보호자의 지도감독 하에 복용시켜 주십시오 4) 본 제품은 5세미만의 유아에게는 복용시키지 않아 주십시오
4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 본제의 복용에 의해 노발이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 부어지거나, 손이 굳어지거나, 발이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것. 2) 위약상태(복통, 1 일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기연용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 무릎, 체중증가 등) 위약상태(복통이나 타일 수 있으므로 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되 는 경우 복용을 중지할 것. 3) 급성증, 저칼륨혈증의 결과로서 근경련이 나 타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의

이상 이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것. 4) 소화기계: 식욕부진, 위부 불쾌감, 구역, 구토, 복통, 설사 등이 나타난 경우에는 복용을 중지할 것.

5. 복용중 또는 복용후에는 다음 사항을 주의해 주십시오.

- 1) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프제 이노제(푸로세미드, 에타크리산) 또는 치아지드계 이노제(트리아클로로메치 아지드)와 병용시 위약도스태론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나 타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것. 2) 본 제품은 하제성분도 포함되어 있으 므로 복용에 의해 묽은 변으로 되기도 하지만 만약 심한 복통을 수반하는 설 사가 나타난 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사에게 상담해 주십시 오. 3) 본 제품의 복용에 의해 위부불쾌감, 식욕부진, 설사, 발진, 발적 등의 증상이 나타난 경우에는 복용을 중지하고 의사 또는 약사에게 상담해 주십시 오. 4) 1~2개월간 복용해도 증상의 개선이 보이지 않는 경우는 복용을 중지 하고 의사나 약사에게 상담해 주십시오. 5) 장기연용하는 경우에는 의사나 약사에게 상담해 주십시오. 6) 대황의 사하작용은 개인차가 있으므로 용 법·용량을 주의한다. 7) 자극성 완화제는 장기간 계속 사용시 위장에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 편의를 조사하여야 한다. 8) 다른 한방제제 등을 병용하는 경우는 함유 성상의 중복에 주의한다. 대황 함 유제제는 병용투여시 특히 주의한다.
6. 보관 및 취급상의 주의
 - 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오 2) 적시일광을 피하고 가능한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀봉하여 보관해 주십시오. 3) 오염을 피하고 품질 을 유지하기 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않아 주십시오.
7. 다음 한방제제에는 투여하지 않 것. (경구제 및 주사제에 한함)

이 약은 위약을 함유하고 있으므로 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자 에게는 투여하면 안된다.