



※ 이 문서는

시에 필요한 주의사항을 기재한 것으로 본제와 같이 보관 하십시오.

노즈펜정

일반의약품
분류번호: 132

【원료약품 및 그 분량】 1정 350mg 중

신이청폐탕배농산급탕가시호창출건조엑스 (별규).....	200mg
길 경 (KP).....	333mg
감 초 (KP).....	250mg
작 약 (KP).....	250mg
대 추 (KP).....	250mg
지 실 (KP).....	167mg
생 강 (생규).....	167mg
석 고 (생규).....	167mg
황 금 (KP).....	17mg
창 출 (KP).....	17mg
치 자 (KP).....	17mg
시 호 (KP).....	17mg
승 마 (KP).....	17mg
지 모 (KP).....	17mg
맥문동 (KP).....	17mg
비파엽 (KP).....	17mg
신 이 (생규).....	167mg

【성상】 황갈색의 원형정제

【효능·효과】 부비동염, 비(鼻)카타르, 코막힘, 취비증(코에서 냄새가 나는 증상)

【용법·용량】 보통 성인 1회 3~6정, 15~8세 2~3정을 1일 2회 아침, 저녁 공복에 복용한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30 °C)보관

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
8세 미만의 어린이
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
 - 고혈압 환자
 - 심장에 또는 신장에 환자
 - 부종 환자
 - 고령자(일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의할 것.)
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
 - 수유부, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성

- 7) 이전에 간질한 병력이 있거나 다른 심각한 건강상 위해가 있었던 환자
- 8) 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부불쾌감, 묽은 변, 설사 등이 나타날 수 있다.)
- 9) 현저하게 체력이 쇠약해진 환자(이상반응이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 수 있

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

- (1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저 칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)
- (2) 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
- (3) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 복통, 설사 등
- (4) 간질환자로 의심되는 증상(피곤, 식욕부진, 황달, 구역 및 구토를 동반하는 심각한 상부 위의 통증, 진한 뇨 등)(유럽승마에서 간독성 이상반응이 보고된 바 있다.)

2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
- 2) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 3) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메티아지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.
- 4) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.
- 5) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 복용시킬 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.).
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품들 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

6. 다음 환자에는 투여하지 말 것(경구제 및 주사제에 한함)

이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency)또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품은 약국, 병·의원 등의 개설자를 통하여 교환하여 드립니다.

설명서 개정일자 : 2010.4.9



정우신약주식회사

충청남도 아산시 신창면 읍내리 80-13
Tel. (041)533-6191 www.jwpharm.co.kr