



*이 문서를 본제를 사용할 시에 필요한 주의사항을 기재한 것으로 본제와 같이 보관 하십시오.

정우 정우사칠탕 엑스정

일반의약품
분류번호: 190

■성상 : 갈색의 삼각형 정제

■원료약품및그분량: 1정 (350mg) 중

사칠탕건조엑스(10.1→1)(별규)	190mg
반 하(약전)	0.67g
복 령(약전)	0.56g
후 박(약전)	0.33g
자소엽(약전)	0.22g
생 강(생규)	0.44g

■효능·효과 : 기분이 우울하고 인후·식도부에 이물감이 있고 때로는 숨참, 어지러움, 구역질 등을 동반하는 다음 증상:

불안 신경증, 신경성위염, 입맛, 기침, 설목소리

■용법·용량 : 보통 성인 1회 3정을 1일 3회 식전 또는 식간에 복용한다.

■저장 방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■사용상의주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과 의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 1) 고령자(일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의할 것.)
- 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
- 3) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 4) 지금까지 약에 의한 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
- 5) 어린이(어린이에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다).)

2. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과 의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
피부 : 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움
- 2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

3. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.).
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

5. 다음 환자에는 투여하지 말 것. (경구제 및 주사제에 한함)

이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

설명서 개정일자 : 2010. 04. 09



정우신약주식회사

충청남도 아산시 신창면 읍내리 80-13

www.jwpharm.co.kr

TEL.041-533-6191