

스피드펜[®] 연질 캡슐 200mg

(이부프로펜)

【원료약품의 분량】캡슐 중

유효성분 : 이부프로펜(4P) 200.000mg
기타 첨가제 : 디에틸렌글리콜모노에틸에테르, 부분탈수유동소르비톨, 부틸하이드록시톨루엔, 수산화칼륨, 정제수, 젤라틴, 치차청색소, 포비돈, 폴리소르베이트80, 폴리에틸렌글리콜600

【성상】무색 내지 옅은 황색의 액상 내용물이 든 황색의 투명한 타원형 연질캡슐

【효능·효과】

1. 주요효 효과: 감기로 인한 발열 및 통증(통증), 요(허리)통, 생리통, 류마티양 관절염, 연조직(여러가지 절단나이에 나타나는)류마티양 관절염, 골관절염(퇴행성 관절질환), 수술후 통증(통증)
2. 다음 질환에도 사용할 수 있다. : 두통, 편두통, 치통, 근육통, 신경통, 갑작성 척추염, 급성통풍, 간센마르비늘증후군 관절염, 연조직손상(염좌(좌)), 좌상(타박상)(멍), 비관절 류마티스질환(건염(힘줄염), 건초염(힘줄은활막염), 활액(윤활)낭염)

【용법·용량】

1. 류마티양 관절염, 골관절염, 갑작성 척추염, 연조직손상, 비관절 류마티스질환, 급성통풍, 간센마르비늘증후군 관절염 : 성인 이부프로펜으로서 1회 200~600mg(1~3캡슐) 1일 3~4회 경구투여한다(먹는다). 일 최대 3200mg(16캡슐)까지 투여할 수 있다.
2. 연조직손상이거나 절단나이에 나타나는) 류마티양 관절염 : 일 체중 kg당 30~40mg을 3~4회 분할 경구투여한다(먹는다).
3. 통증(통증) 증상 및 통증도의 통증(통증), 감기 : 성인 1회 200~400mg(1~2캡슐) 1일 3~4회 경구투여한다(먹는다). 연령(나이), 증상에 따라 적절히 조정한다.
4. 편두통 : 성인 1회 200~400mg(1~2캡슐)을 경구투여한다(먹는다). 24시간 동안 2캡슐을 초과하지 않도록 한다.
5. 만 12세 이상 청소년은 1회 200~400mg(1~2캡슐)을 1일 3~4회 경구투여한다. 체중이 30kg 미만인 경우 일일량 500mg을 초과해서는 안되며 공복시 투여는 피하는 것이 바람직하다.

【사용상의 주의사항】

1. **경고** : ① 메일 이전 사신 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용하여 할 경우 반드시 의사 또는 약사의 상의(상)해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있다. ② 심혈관계 위험 : 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염항염진통제 복용시 치명적일 수 있는 중대한 심혈관계 질환 발생, 심근경색증 및 뇌졸중의 위험이 증가한다. 심혈관계 질환 또는 심혈관계 질환의 위험 인자가 있는 환자이거나 이 약을 장기 복용한 환자일수록 심혈관계 이상반응 발생가능성은 증가한다. 이 약을 복용하는 동안 이상반응에 대해 신중히 모니터링을 해야 하며, 이상반응이 나타날 경우 즉시 중단에 대하여 사전에 알고 있어야 한다. 조절되지 않는 고혈압, 울혈성심부전증(NH/A-H), 확장형 허혈성 심장질환, 말초동맥질환, 뇌혈관 질환을 가진 환자들은 신중히 고려하여 이부프로펜을 사용하여야 하며 고용량 이부프로펜(일 2400mg) 사용을 피해야 한다. 또한 심혈관계 위험 요소에, 고혈압, 고지혈증, 당뇨병, 흡연을 가지고 있는 환자가 고용량 이부프로펜(일 2400mg)이 필요한 경우 정기간 치료를 시작하기 전에 신중히 고려하여야 한다. 임상연구 결과 고용량(일 2400mg) 이부프로펜 사용이 동맥 혈전 증상(심근경색증 또는 뇌졸중)에 대한 위험성을 다소 증가시킬 수 있다고 나타났다. 종합적으로 역학연구 결과 고용량 이부프로펜에 일 1200mg 이하와 동맥 혈전 증상의 위험성 증가간의 연관성은 증명되지 않았다. ③ 위장관계 위험 : 이 약을 포함한 비스테로이드성 소염진통제 복용시 위장관계의 출혈, 궤양 및 천공(천공) 등 치명적일 수 있는 중대한 위장관계 이상반응이 나타날 수 있다. 이러한 이상반응은 투여 기간 동안에 경고 증상 없이 발생할 수 있다. 고령자나 노인(노인)이 이 약을 장기복용한 환자일수록 위장관계 이상반응 발생가능성은 증가할 수 있다. 이 약을 복용하는 동안 이상반응에 대하여 신중히 모니터링을 해야 하며, 고위험군의 환자에게는 비스테로이드성 소염항염진통제와 관련 없는 다른 대체 치료제를 고려하여야 한다.

2. **다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것** : ① 위장관 궤양, 위장관 출혈(출혈) 또는 그 병력이 있는 환자 ② 심한 혈액이상 환자 ③ 심한 간장애 환자 ④ 심한 신장장애 환자 ⑤ 심한 심장기능부전(심장) 환자 ⑥ 심한 고혈압 환자 ⑦ 이 약의 성분에 과민(과민) 있는 환자 ⑧ 기관지천식 또는 그 병력이 있는 환자 ⑨ 아스피린이나 다른 비스테로이드성 소염진통제(COX-2 저해제 포함)에 대하여 천식, 두드러기, 알레르기 또는 과민반응 또는 그 병력이 있는 환자 ⑩ 관상동맥(심장동맥) 우회술(CABG) 전후 통증(통증) 환자 ⑪ 임신 말기 3개월 기간에 해당하는 임부(비스테로이드성 소염진통제와 마찬가지로 임신 말기에 이 약을 투여 시 태아의 동맥관을 조기 폐쇄시킬 수 있다) ⑫ 항응고요법으로 고용량 메토크세이트를 투여중인 환자

3. **이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 말 것** : ① 이 약의 경정용량을 초과하여 복용해서는 안된다. ② 일반적으로 다른 비스테로이드성 소염항염진통제(SAIDs)와 함께 복용하지 않는다. ③ 음주(음주)의 위험이 보고되고, 이로 인해 영아(간접(간접)에서) 심각한 이상반응 발생이 우려(우려)되므로 약물투여의 중요성을 고려하여 음주를 중단하거나 약물투여를 중단해야 한다.

4. **다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사의 상의(상)할 것** : ① 혈액이상 또는 그 병력이 있는 환자 ② 출혈경향이 있는 환자(혈소판 기능이상)이 일어날 수 있다 ③ 간장애, 간장애 또는 그 병력이 있는 환자 ④ 신장기능(신장) 또는 그 병력이 있는 환자 ⑤ 심장기능부전 또는 심혈관 환자 ⑥ 고혈압 환자 ⑦ 과민(과민)의 병력이 있는 환자 ⑧ 전신성 홍반성 루푸스(SLE) 환자 및 혼합 결합조직질환(MCTD) 환자 ⑨ 류마티스 대염증 환자 ⑩ 크론병 환자 ⑪ 고령자(노인) 및 노인 ⑫ 임부 (통풍(통풍)에서 태아독성이 보고되어 있고 임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않는 것이 바람직하다.) ⑬ 수유부 ⑭ 심근경색(심장) 뇌졸중 예방(예방) 목적으로 고용량 아스피린을 복용하는 사람 (이 약은 아스피린의 효과를 감소시키고, 중증심한 증상의 위장관계 이상반응의 발생 위험을 증가시킬 수 있다). 심혈관질환 치료에서 이부프로펜과 아스피린(아세틸살리실산) 병용투여시 이부프로펜이 고용량 아스피린의 혈소판 응집 효과를 억제할 수 있다고 나타났다. 이 데이터 약산법에 대해 임상적으로 유효(유효)한 환자(환자)만 일반적(일반)한 것은 정기간 이부프로펜 사용시, 고용량 아스피린의 심장 보호 효과가 감소될 수 있다. ⑮ 다음의 약물을 복용하는 환자 : ACE 저해제 (고혈압 효과) 감소될 수 있다는 보고가 있다) ⑯ 리튬 (혈청 리튬의 농도를 증가시키고 리튬의 신독(신독)과 신독(신독)을 감소시킬 수 있다. ⑰ 다음(다음)의 약물을 복용하는 환자 : ① 양성 약물 (고혈압 효과) 감소될 수 있다는 보고가 있다) ② 리튬 (혈청 리튬의 농도를 증가시키고 리튬의 신독(신독)과 신독(신독)을 감소시킬 수 있다. ③ 프로세미드 및 치아치제(치아치제) 이뇨제 (임상시험 및 시판 후 조사 결과 이 약의 신장에서의 프로세미드(프로세미드) 관련 항 효과에 의해 일부 환자에서 프로세미드 및 치아치제(치아치제)의 나트륨 배설 효과(효과)가 감소될 수 있음이 확인되었다.) ④ 메토크세이트 (신시노노에서 메토크세이트의 배설이 지연되어 치명적인 메토크세이트의 혈액학적 독성(독성)이 증가될 수 있으므로, 항응고요법으로 사용하는 고용량의 메토크세이트(메토크세이트)는 병용(병용)함께(함께)투여하지 않으며, 고용량의 메토크세이트(메토크세이트)와 병용(병용)함께(함께)투여 시 신중히 투여해야 한다) ⑤ 쿠마린계 항응고제(와파린 등) (쿠마린계 항응고제와 병용(병용)함께(함께)투여 시 그 작용을 증강(증강)시킬 수 있다. 중증심한 증상의 위장관계 출혈의 위험이 높아질 수 있다.) ⑥ 선택적 세로토닌 수용체拮抗제(SSRI, 선택적 세로토닌 수용체拮抗제)와 함께 복용 시 위장관 출혈 위험이 증가한다.)

5. **다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사의 상의(상)할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것** : ① 속, 속, 아나(아나)의 발진(발진)반응(과민(과민)성사 반응), 홍반(홍반)고열(고열)증상, 오한, 호흡곤란, 협착(협착) 등(등)가 혈액 : 헤마토크트 감소, 헤모글로빈 감소, 빈혈, 재생(재생)불량(불량)성변화, 용혈(용혈)성변화, 무혈(무혈)구상, 과립(과립)구상, 백혈(백혈)구상, 혈소(혈소)판감소, 혈소판 기능 저하(출혈(출혈)이나 연상, 호산구(호산구)증가 등의 혈액(혈액)에 ② 소화성(소화성) 궤양, 위장(위장)출혈, 천공(천공)궤양, 궤양(궤양) 대염증, 혈변, 위염, 궤양(궤양), 토혈(토혈)혈변(혈변), 크론병, 식욕부진, 구역, 구토, 복통, 소화불량, 설사, 위(위)부종(부종), 상복부(상복부) 통증, 구갈, 구내염, 복부(복부)팽만(팽만), 구강(구강)궤양, 변비, 흑변(흑변) 등(등) ③ 피부(피부)질환(피부질환) : 피부(피부)발진(발진)반응(과민(과민)성사 반응), 홍반(홍반)고열(고열)증상, 오한, 호흡곤란, 협착(협착) 등(등)가 혈액 : 헤마토크트 감소, 헤모글로빈 감소, 빈혈, 재생(재생)불량(불량)성변화, 용혈(용혈)성변화, 무혈(무혈)구상, 과립(과립)구상, 백혈(백혈)구상, 혈소(혈소)판감소, 혈소판 기능 저하(출혈(출혈)이나 연상, 호산구(호산구)증가 등의 혈액(혈액)에 ② 소화성(소화성) 궤양, 위장(위장)출혈, 천공(천공)궤양, 궤양(궤양) 대염증, 혈변, 위염, 궤양(궤양), 토혈(토혈)혈변(혈변), 크론병, 식욕부진, 구역, 구토, 복통, 소화불량, 설사, 위(위)부종(부종), 상복부(상복부) 통증, 구갈, 구내염, 복부(복부)팽만(팽만), 구강(구강)궤양, 변비, 흑변(흑변) 등(등) ③ 피부(피부)질환(피부질환) : 피부(피부)발진(발진)반응(과민(과민)성사 반응), 홍반(홍반)고열(고열)증상, 오한, 호흡곤란, 협착(협착) 등(등)가 혈액 : 헤마토크트 감소, 헤모글로빈 감소, 빈혈, 재생(재생)불량(불량)성변화, 용혈(용혈)성변화, 무혈(무혈)구상, 과립(과립)구상, 백혈(백혈)구상, 혈소(혈소)판감소, 혈소판 기능 저하(출혈(출혈)이나 연상, 호산구(호산구)증가 등의 혈액(혈액)에 ② 소화성(소화성) 궤양, 위장(위장)출혈, 천공(천공)궤양, 궤양(궤양) 대염증, 혈변, 위염, 궤양(궤양), 토혈(토혈)혈변(혈변), 크론병, 식욕부진, 구역, 구토, 복통, 소화불량, 설사, 위(위)부종(부종), 상복부(상복부) 통증, 구갈, 구내염, 복부(복부)팽만(팽만), 구강(구강)궤양, 변비, 흑변(흑변) 등(등) ③ 피부(피부)질환(피부질환) : 피부(피부)발진(발진)반응(과민(과민)성사 반응), 홍반(홍반)고열(고열)증상, 오한, 호흡곤란, 협착(협착) 등(등)가 혈액 : 헤마토크트 감소, 헤모글로빈 감소, 빈혈, 재생(재생)불량(불량)성변화, 용혈(용혈)성변화, 무혈(무혈)구상, 과립(과립)구상, 백혈(백혈)구상, 혈소(혈소)판감소, 혈소판 기능 저하(출혈(출혈)이나 연상, 호산구(호산구)증가 등의 혈액(혈액)에 ② 소화성(소화성) 궤양, 위장(위장)출혈, 천공(천공)궤양, 궤양(궤양) 대염증, 혈변, 위염, 궤양(궤양), 토혈(토혈)혈변(혈변), 크론병, 식욕부진, 구역, 구토, 복통, 소화불량, 설사, 위(위)부종(부종), 상복부(상복부) 통증, 구갈, 구내염, 복부(복부)팽만(팽만), 구강(구강)궤양, 변비, 흑변(흑변) 등(등) ③ 피부(피부)질환(피부질환) : 피부(피부)발진(발진)반응(과민(과민)성사 반응), 홍반(홍반)고열(고열)증상, 오한, 호흡곤란, 협착(협착) 등(등)가 혈액 : 헤마토크트 감소, 헤모글로빈 감소, 빈혈, 재생(재생)불량(불량)성변화, 용혈(용혈)성변화, 무혈(무혈)구상, 과립(과립)구상, 백혈(백혈)구상, 혈소(혈소)판감소, 혈소판 기능 저하(출혈(출혈)이나 연상, 호산구(호산구)증가 등의 혈액(혈액)에 ② 소화성(소화성) 궤양, 위장(위장)출혈, 천공(천공)궤양, 궤양(궤양) 대염증, 혈변, 위염, 궤양(궤양), 토혈(토혈)혈변(혈변), 크론병, 식욕부진, 구역, 구토, 복통, 소화불량, 설사, 위(위)부종(부종), 상복부(상복부) 통증, 구갈, 구내염, 복부(복부)팽만(팽만), 구강(구강)궤양, 변비, 흑변(흑변) 등(등) ③ 피부(피부)질환(피부질환) : 피부(피부)발진(발진)반응(과민(과민)성사 반응), 홍반(홍반)고열(고열)증상, 오한, 호흡곤란, 협착(협착) 등(등)가 혈액 : 헤마토크트 감소, 헤모글로빈 감소, 빈혈, 재생(재생)불량(불량)성변화, 용혈(용혈)성변화, 무혈(무혈)구상, 과립(과립)구상, 백혈(백혈)구상, 혈소(혈소)판감소, 혈소판 기능 저하(출혈(출혈)이나 연상, 호산구(호산구)증가 등의 혈액(혈액)에 ② 소화성(소화성) 궤양, 위장(위장)출혈, 천공(천공)궤양, 궤양(궤양) 대염증, 혈변, 위염, 궤양(궤양), 토혈(토혈)혈변(혈변), 크론병, 식욕부진, 구역, 구토, 복통, 소화불량, 설사, 위(위)부종(부종), 상복부(상복부) 통증, 구갈, 구내염, 복부(복부)팽만(팽만), 구강(구강)궤양, 변비, 흑변(흑변) 등(등) ③ 피부(피부)질환(피부질환) : 피부(피부)발진(발진)반응(과민(과민)성사 반응), 홍반(홍반)고열(고열)증상, 오한, 호흡곤란, 협착(협착) 등(등)가 혈액 : 헤마토크트 감소, 헤모글로빈 감소, 빈혈, 재생(재생)불량(불량)성변화, 용혈(용혈)성변화, 무혈(무혈)구상, 과립(과립)구상, 백혈(백혈)구상, 혈소(혈소)판감소, 혈소판 기능 저하(출혈(출혈)이나 연상, 호산구(호산구)증가 등의 혈액(혈액)에 ② 소화성(소화성) 궤양, 위장(위장)출혈, 천공(천공)궤양, 궤양(궤양) 대염증, 혈변, 위염, 궤양(궤양), 토혈(토혈)혈변(혈변), 크론병, 식욕부진, 구역, 구토, 복통, 소화불량, 설사, 위(위)부종(부종), 상복부(상복부) 통증, 구갈, 구내염, 복부(복부)팽만(팽만), 구강(구강)궤양, 변비, 흑변(흑변) 등(등) ③ 피부(피부)질환(피부질환) : 피부(피부)발진(발진)반응(과민(과민)성사 반응), 홍반(홍반)고열(고열)증상, 오한, 호흡곤란, 협착(협착) 등(등)가 혈액 : 헤마토크트 감소, 헤모글로빈 감소, 빈혈, 재생(재생)불량(불량)성변화, 용혈(용혈)성변화, 무혈(무혈)구상, 과립(과립)구상, 백혈(백혈)구상, 혈소(혈소)판감소, 혈소판 기능 저하(출혈(출혈)이나 연상, 호산구(호산구)증가 등의 혈액(혈액)에 ② 소화성(소화성) 궤양, 위장(위장)출혈, 천공(천공)궤양, 궤양(궤양) 대염증, 혈변, 위염, 궤양(궤양), 토혈(토혈)혈변(혈변), 크론병, 식욕부진, 구역, 구토, 복통, 소화불량, 설사, 위(위)부종(부종), 상복부(상복부) 통증, 구갈, 구내염, 복부(복부)팽만(팽만), 구강(구강)궤양, 변비, 흑변(흑변) 등(등) ③ 피부(피부)질환(피부질환) : 피부(피부)발진(발진)반응(과민(과민)성사 반응), 홍반(홍반)고열(고열)증상, 오한, 호흡곤란, 협착(협착) 등(등)가 혈액 : 헤마토크트 감소, 헤모글로빈 감소, 빈혈, 재생(재생)불량(불량)성변화, 용혈(용혈)성변화, 무혈(무혈)구상, 과립(과립)구상, 백혈(백혈)구상, 혈소(혈소)판감소, 혈소판 기능 저하(출혈(출혈)이나 연상, 호산구(호산구)증가 등의 혈액(혈액)에 ② 소화성(소화성) 궤양, 위장(위장)출혈, 천공(천공)궤양, 궤양(궤양) 대염증, 혈변, 위염, 궤양(궤양), 토혈(토혈)혈변(혈변), 크론병, 식욕부진, 구역, 구토, 복통, 소화불량, 설사, 위(위)부종(부종), 상복부(상복부) 통증, 구갈, 구내염, 복부(복부)팽만(팽만), 구강(구강)궤양, 변비, 흑변(흑변) 등(등) ③ 피부(피부)질환(피부질환) : 피부(피부)발진(발진)반응(과민(과민)성사 반응), 홍반(홍반)고열(고열)증상, 오한, 호흡곤란, 협착(협착) 등(등)가 혈액 : 헤마토크트 감소, 헤모글로빈 감소, 빈혈, 재생(재생)불량(불량)성변화, 용혈(용혈)성변화, 무혈(무혈)구상, 과립(과립)구상, 백혈(백혈)구상, 혈소(혈소)판감소, 혈소판 기능 저하(출혈(출혈)이나 연상, 호산구(호산구)증가 등의 혈액(혈액)에 ② 소화성(소화성) 궤양, 위장(위장)출혈, 천공(천공)궤양, 궤양(궤양) 대염증, 혈변, 위염, 궤양(궤양), 토혈(토혈)혈변(혈변), 크론병, 식욕부진, 구역, 구토, 복통, 소화불량, 설사, 위(위)부종(부종), 상복부(상복부) 통증, 구갈, 구내염, 복부(복부)팽만(팽만), 구강(구강)궤양, 변비, 흑변(흑변) 등(등) ③ 피부(피부)질환(피부질환) : 피부(피부)발진(발진)반응(과민(과민)성사 반응), 홍반(홍반)고열(고열)증상, 오한, 호흡곤란, 협착(협착) 등(등)가 혈액 : 헤마토크트 감소, 헤모글로빈 감소, 빈혈, 재생(재생)불량(불량)성변화, 용혈(용혈)성변화, 무혈(무혈)구상, 과립(과립)구상, 백혈(백혈)구상, 혈소(혈소)판감소, 혈소판 기능 저하(출혈(출혈)이나 연상, 호산구(호산구)증가 등의 혈액(혈액)에 ② 소화성(소화성) 궤양, 위장(위장)출혈, 천공(천공)궤양, 궤양(궤양) 대염증, 혈변, 위염, 궤양(궤양), 토혈(토혈)혈변(혈변), 크론병, 식욕부진, 구역, 구토, 복통, 소화불량, 설사, 위(위)부종(부종), 상복부(상복부) 통증, 구갈, 구내염, 복부(복부)팽만(팽만), 구강(구강)궤양, 변비, 흑변(흑변) 등(등) ③ 피부(피부)질환(피부질환) : 피부(피부)발진(발진)반응(과민(과민)성사 반응), 홍반(홍반)고열(고열)증상, 오한, 호흡곤란, 협착(협착) 등(등)가 혈액 : 헤마토크트 감소, 헤모글로빈 감소, 빈혈, 재생(재생)불량(불량)성변화, 용혈(용혈)성변화, 무혈(무혈)구상, 과립(과립)구상, 백혈(백혈)구상, 혈소(혈소)판감소, 혈소판 기능 저하(출혈(출혈)이나 연상, 호산구(호산구)증가 등의 혈액(혈액)에 ② 소화성(소화성) 궤양, 위장(위장)출혈, 천공(천공)궤양, 궤양(궤양) 대염증, 혈변, 위염, 궤양(궤양), 토혈(토혈)혈변(혈변), 크론병, 식욕부진, 구역, 구토, 복통, 소화불량, 설사, 위(위)부종(부종), 상복부(상복부) 통증, 구갈, 구내염, 복부(복부)팽만(팽만), 구강(구강)궤양, 변비, 흑변(흑변) 등(등) ③ 피부(피부)질환(피부질환) : 피부(피부)발진(발진)반응(과민(과민)성사 반응), 홍반(홍반)고열(고열)증상, 오한, 호흡곤란, 협착(협착) 등(등)가 혈액 : 헤마토크트 감소, 헤모글로빈 감소, 빈혈, 재생(재생)불량(불량)성변화, 용혈(용혈)성변화, 무혈(무혈)구상, 과립(과립)구상, 백혈(백혈)구상, 혈소(혈소)판감소, 혈소판 기능 저하(출혈(출혈)이나 연상, 호산구(호산구)증가 등의 혈액(혈액)에 ② 소화성(소화성) 궤양, 위장(위장)출혈, 천공(천공)궤양, 궤양(궤양) 대염증, 혈변, 위염, 궤양(궤양), 토혈(토혈)혈변(혈변), 크론병, 식욕부진, 구역, 구토, 복통, 소화불량, 설사, 위(위)부종(부종), 상복부(상복부) 통증, 구갈, 구내염, 복부(복부)팽만(팽만), 구강(구강)궤양, 변비, 흑변(흑변) 등(등) ③ 피부(피부)질환(피부질환) : 피부(피부)발진(발진)반응(과민(과민)성사 반응), 홍반(홍반)고열(고열)증상, 오한, 호흡곤란, 협착(협착) 등(등)가 혈액 : 헤마토크트 감소, 헤모글로빈 감소, 빈혈, 재생(재생)불량(불량)성변화, 용혈(용혈)성변화, 무혈(무혈)구상, 과립(과립)구상, 백혈(백혈)구상, 혈소(혈소)판감소, 혈소판 기능 저하(출혈(출혈)이나 연상, 호산구(호산구)증가 등의 혈액(혈액)에 ② 소화성(소화성) 궤양, 위장(위장)출혈, 천공(천공)궤양, 궤양(궤양) 대염증, 혈변, 위염, 궤양(궤양), 토혈(토혈)혈변(혈변), 크론병, 식욕부진, 구역, 구토, 복통, 소화불량, 설사, 위(위)부종(부종), 상복부(상복부) 통증, 구갈, 구내염, 복부(복부)팽만(팽만), 구강(구강)궤양, 변비, 흑변(흑변) 등(등) ③ 피부(피부)질환(피부질환) : 피부(피부)발진(발진)반응(과민(과민)성사 반응), 홍반(홍반)고열(고열)증상, 오한, 호흡곤란, 협착(협착) 등(등)가 혈액 : 헤마토크트 감소, 헤모글로빈 감소, 빈혈, 재생(재생)불량(불량)성변화, 용혈(용혈)성변화, 무혈(무혈)구상, 과립(과립)구상, 백혈(백혈)구상, 혈소(혈소)판감소, 혈소판 기능 저하(출혈(출혈)이나 연상, 호산구(호산구)증가 등의 혈액(혈액)에 ② 소화성(소화성) 궤양, 위장(위장)출혈, 천공(천공)궤양, 궤양(궤양) 대염증, 혈변, 위염, 궤양(궤양), 토혈(토혈)혈변(혈변), 크론병, 식욕부진, 구역, 구토, 복통, 소화불량, 설사, 위(위)부종(부종), 상복부(상복부) 통증, 구갈, 구내염, 복부(복부)팽만(팽만), 구강(구강)궤양, 변비, 흑변(흑변) 등(등) ③ 피부(피부)질환(피부질환) : 피부(피부)발진(발진)반응(과민(과민)성사 반응), 홍반(홍반)고열(고열)증상, 오한, 호흡곤란, 협착(협착) 등(등)가 혈액 : 헤마토크트 감소, 헤모글로빈 감소, 빈혈, 재생(재생)불량(불량)성변화, 용혈(용혈)성변화, 무혈(무혈)구상, 과립(과립)구상, 백혈(백혈)구상, 혈소(혈소)판감소, 혈소판 기능 저하(출혈(출혈)이나 연상, 호산구(호산구)증가 등의 혈액(혈액)에 ② 소화성(소화성) 궤양, 위장(위장)출혈, 천공(천공)궤양, 궤양(궤양) 대염증, 혈변, 위염, 궤양(궤양), 토혈(토혈)혈변(혈변), 크론병, 식욕부진, 구역, 구토, 복통, 소화불량, 설사, 위(위)부종(부종), 상복부(상복부) 통증, 구갈, 구내염, 복부(복부)팽만(팽만), 구강(구강)궤양, 변비, 흑변(흑변) 등(등) ③ 피부(피부)질환(피부질환) : 피부(피부)발진(발진)반응(과민(과민)성사 반응), 홍반(홍반)고열(고열)증상, 오한, 호흡곤란, 협착(협착) 등(등)가 혈액 : 헤마토크트 감소, 헤모글로빈 감소, 빈혈, 재생(재생)불량(불량)성변화, 용혈(용혈)성변화, 무혈(무혈)구상, 과립(과립)구상, 백혈(백혈)구상, 혈소(혈소)판감소, 혈소판 기능 저하(출혈(출혈)이나 연상, 호산구(호산구)증가 등의 혈액(혈액)에 ② 소화성(소화성) 궤양, 위장(위장)출혈, 천공(천공)궤양, 궤양(궤양) 대염증, 혈변, 위염, 궤양(궤양), 토혈(토혈)혈변(혈변), 크론병, 식욕부진, 구역, 구토, 복통, 소화불량, 설사, 위(위)부종(부종), 상복부(상복부) 통증, 구갈, 구내염, 복부(복부)팽만(팽만), 구강(구강)궤양, 변비, 흑변(흑변) 등(등) ③ 피부(피부)질환(피부질환) : 피부(피부)발진(발진)반응(과민(과민)성사 반응), 홍반(홍반)고열(고열)증상, 오한, 호흡곤란, 협착(협착) 등(등)가 혈액 : 헤마토크트 감소, 헤모글로빈 감소, 빈혈, 재생(재생)불량(불량)성변화, 용혈(용혈)성변화, 무혈(무혈)구상, 과립(과립)구상, 백혈(백혈)구상, 혈소(혈소)판감소, 혈소판 기능 저하(출혈(출혈)이나 연상, 호산구(호산구)증가 등의 혈액(혈액)에 ② 소화성(소화성) 궤양, 위장(위장)출혈, 천공(천공)궤양, 궤양(궤양) 대염증, 혈변, 위염, 궤양(궤양), 토혈(토혈)혈변(혈변), 크론병, 식욕부진, 구역, 구토, 복통, 소화불량, 설사, 위(위)부종(부종), 상복부(상복부) 통증, 구갈, 구내염, 복부(복부)팽만(팽만), 구강(구강)궤양, 변비, 흑변(흑변) 등(등) ③ 피부(피부)질환(피부질환) : 피부(피부)발진(발진)반응(과민(과민)성사 반응), 홍반(홍반)고열(고열)증상, 오한, 호흡곤란, 협착(협착) 등(등)가 혈액 : 헤마토크트 감소, 헤모글로빈 감소, 빈혈, 재생(재생)불량(불량)성변화, 용혈(용혈)성변화, 무혈(무혈)구상, 과립(과립)구상, 백혈(백혈)구상, 혈소(혈소)판감소, 혈소판 기능 저하(출혈(출혈)이나 연상, 호산구(호산구)증가 등의 혈액(혈액)에 ② 소화성(소화성) 궤양, 위장(위장)출혈, 천공(천공)궤양, 궤양(궤양) 대염증, 혈변, 위염, 궤양(궤양), 토혈(토혈)혈변(혈변), 크론병, 식욕부진, 구역, 구토, 복통, 소화불량, 설사, 위(위)부종(부종), 상복부(상복부) 통증, 구갈, 구내염, 복부(복부)팽만(팽만), 구강(구강)궤양, 변비, 흑변(흑변) 등(등) ③ 피부(피부)질환(피부질환) : 피부(피부)발진(발진)반응(과민(과민)성사 반응), 홍반(홍반)고열(고열)증상, 오한, 호흡곤란, 협착(협착) 등(등)가 혈액 : 헤마토크트 감소, 헤모글로빈 감소, 빈혈, 재생(재생)불량(불량)성변화, 용혈(용혈)성변화, 무혈(무혈)구상, 과립(과립)구상, 백혈(백혈)구상, 혈소(혈소)판감소, 혈소판 기능 저하(출혈(출혈)이나 연상, 호산구(호산구)증가 등의 혈액(혈액)에 ② 소화성(소화성) 궤양, 위장(위장)출혈, 천공(천공)궤양, 궤양(궤양) 대염증, 혈변, 위염, 궤양(궤양), 토혈(토혈)혈변(혈변), 크론병, 식욕부진, 구역, 구토, 복통, 소화불량, 설사, 위(위)부종(부종), 상복부(상복부) 통증, 구갈, 구내염, 복부(복부)팽만(팽만), 구강(구강)궤양, 변비, 흑변(흑변) 등(등) ③ 피부(피부)질환(피부질환) : 피부(피부)발진(발진)반응(과민(과민)성사 반응), 홍반(홍반)고열(고열)증상, 오한, 호흡곤란, 협착(협착) 등(등)가 혈액 : 헤마토크트 감소, 헤모글로빈 감소, 빈혈, 재생(재생)불량(불량)성변화, 용혈(용혈)성변화, 무혈(무혈)구상, 과립(과립)구상, 백혈(백혈)구상, 혈소(혈소)판감소, 혈소판 기능 저하(출혈(출혈)이나 연상, 호산구(호산구)증가 등의 혈액(혈액)에 ② 소화성(소화성) 궤양, 위장(위장)출혈, 천공(천공)궤양, 궤양(궤양) 대염증, 혈변, 위염, 궤양(궤양), 토혈(토혈)혈변(혈변), 크론병, 식욕부진, 구역, 구토, 복통, 소화불량, 설사, 위(위)부종(부종), 상복부(상복부) 통증, 구갈, 구내염, 복부(복부)팽만(팽만), 구강(구강)궤양, 변비, 흑변(흑변) 등(등) ③ 피부(피부)질환(피부질환) : 피부(피부)발진(발진)반응(과민(과민)성사 반응), 홍반(홍반)고열(고열)증상, 오한, 호흡곤란, 협착(협착) 등(등)가 혈액 : 헤마토크트 감소, 헤모글로빈 감소, 빈혈, 재생(재생)불량(불량)성변화, 용혈(용혈)성변화, 무혈(무혈)구상, 과립(과립)구상, 백혈(백혈)구상, 혈소(혈소)판감소, 혈소판 기능 저하(출혈(출혈)이나 연상, 호산구(호산구)증가 등의 혈액(혈액)에 ② 소화성(소화성) 궤양, 위장(위장)출혈, 천공(천공)궤양, 궤양(궤양) 대염증, 혈변, 위염, 궤양(궤양), 토혈(토혈)혈변(혈변), 크론병, 식욕부진, 구역, 구토, 복통, 소화불량, 설사, 위(위)부종(부종), 상복부(상복부) 통증, 구갈, 구내염, 복부(복부)팽만(팽만), 구강(구강)궤양, 변비, 흑변(흑변) 등(등) ③ 피부(피부)질환(피부질환) : 피부(피부)발진(발진)반응(과민(과민)성사 반응), 홍반(홍반)고열(고열)증상, 오한, 호흡곤란, 협착(협착) 등(등)가 혈액 : 헤마토크트 감소, 헤모글로빈 감소, 빈혈, 재생(재생)불량(불량)성변화, 용혈(용혈)성변화, 무혈(무혈)구상, 과립(과립)구상, 백혈(백혈)구상, 혈소(혈소)판감소, 혈소판 기능 저하(출혈(출혈)이나 연상, 호산구(호산구)증가 등의 혈액(혈액)에 ② 소화성(소화성) 궤양, 위장(위장)출혈, 천공(천공)궤양, 궤양(궤양) 대염증, 혈변, 위염, 궤양(궤양), 토혈(토혈)혈변(혈변), 크론병, 식욕부진, 구역, 구토, 복통, 소화불량, 설사, 위(위)부종(부종), 상복부(상복부) 통증, 구갈, 구내염, 복부(복부)팽만(팽만), 구강(구강)궤양, 변비, 흑변(흑변) 등(등) ③ 피부(피부)질환(피부질환) : 피부(피부)발진(발진)반응(과민(과민)성사 반응), 홍반(홍반)고열(고열)증상, 오한, 호흡곤란, 협착(협착) 등(등)가 혈액 : 헤마토크트 감소, 헤모글로빈 감소, 빈혈, 재생(재생)불량(불량)성변화, 용혈(용혈)성변화, 무혈(무혈)구상, 과립(과립)구상, 백혈(백혈)구상, 혈소(혈소)판감소, 혈소판 기능 저하(출혈(출혈)이나 연상, 호산구(호산구)증가 등의 혈액(혈액)에 ② 소화성(소화성) 궤양, 위장(위장)출혈, 천공(천공)궤양, 궤양(궤양) 대염증, 혈변, 위염, 궤양(궤양), 토혈(토혈)혈변(혈변), 크론병, 식욕부진, 구역, 구토, 복통, 소화불량, 설사, 위(위)부종(부종), 상복부(상복부) 통증, 구갈, 구내염, 복부(복부)팽만(팽만), 구강(구강)궤양, 변비, 흑변(흑변) 등(등) ③ 피부(피부)질환(피부질환) : 피부(피부)발진(발진)반응(과민(과민)성사 반응), 홍반(홍반)고열(고열)증상, 오한, 호흡곤란, 협착(협착) 등(등)가 혈액 : 헤마토크트 감소, 헤모글로빈 감소, 빈혈, 재생(재생)불량(불량)성변화, 용혈(용혈)성변화, 무혈(무혈)구상, 과립(과립)구상, 백혈(백혈)구상, 혈소(혈소)판감소, 혈소판 기능 저하(출혈(출혈)이나 연상, 호산구(호산구)증가 등의 혈액(혈액)에 ② 소화성(소화성) 궤양, 위장(위장)출혈, 천공(천공)궤양, 궤양(궤양) 대염증, 혈변, 위염, 궤양(궤양), 토혈(토혈)혈변(혈변), 크론병, 식욕부진, 구역, 구토, 복통, 소화불량, 설사, 위(위)부종(부종), 상복부(상복부) 통증, 구갈, 구내염, 복부(복부)팽만(팽만), 구강(구강)궤양, 변비, 흑변(흑변) 등(등) ③ 피부(피부)질환(피부질환) : 피부(피부)발진(발진)반응(과민(과민)성사 반응), 홍반(홍반)고열(고열)증상, 오한, 호흡곤란, 협착(협착) 등(등)가 혈액 : 헤마토크트 감소, 헤모글로빈 감소, 빈혈, 재생(재생)불량(불량)성변화, 용혈(용혈)성변화, 무혈(무혈)구상, 과립(과립)구상, 백혈(백혈)구상, 혈소(혈소)판감소, 혈소판 기능 저하(출혈(출혈)이나 연상, 호산구(호산구)증가 등의 혈액(혈액)에 ② 소화성(소화성) 궤양, 위장(위장)출혈, 천공(천공)궤양, 궤양(궤양) 대염증, 혈변, 위염, 궤양(궤양), 토혈(토혈)혈변(혈변), 크론병, 식욕부진, 구역, 구토, 복통, 소화불량, 설사, 위(위)부종(부종), 상복부(상복부) 통증, 구갈, 구내염, 복부(복부)팽만(팽만), 구강(구강)