

기능성 소화제 소하자임® 플러스 정

일반의약품

의약품 분류번호	232 소화성제양용제
-------------	----------------

소하자임플러스정은 위장관 운동을 정상화시키며, 제산 및 점막보호작용을 나타내는 동시에 소화력을 회복하도록 도와주는 기능성 종합 소화제입니다.

【원료약품의 분량】 1정 중

트리메부틴말레산염(KPC)	50mg
비도디아스타제 2000IV(KPC)	20mg
(전분당화력(pH4.5) 278단위, 단백소화력(pH3.0) 170단위)	
리파제III(KPC)	7.5mg
(지방소화력(pH6.0) 45단위)	
감초가루(KPC)	25mg
(글리시리진으로서 0.625mg)	
스코폴리아엑스(KP)	5mg
(총알칼로이드(히오스시아민 및 스코폴라민으로서) 0.045mg)	
메타규산알루미늄산화물(산화물로서) 40mg	
(산화물이며)(산화물로서 12.92mg, 산화물로서 5.08mg)	
탄산수소나트륨 (KP)	50mg
침강탄산칼슘(KP)	100mg

【성상】

상층은 흰색, 하층은 회갈색의 필름코팅정제

【특징】

- 위장운동기능 개선작용**
소하자임플러스정은 위장관 평활근에 직접 작용하여 불규칙적이고 저하된 위장관의 운동을 정상화합니다.
- 제산 및 점막 보호작용**
소하자임플러스정은 위산을 중화시키고 위점막을 보호하는 각종 제산성분과 생약성분이 함유되어, 속쓰림, 신트림, 위통 등의 증상을 효과적으로 완화시켜줍니다.
- 우수한 소화작용**
소하자임플러스정은 우수한 전분 및 단백소화효소와 지방소화효소가 배합되어 있어 정상적인 소화력을 회복하도록 도와줍니다.

【효능·효과】

소화불량(소화안됨), 과식, 체함(위체), 소화촉진, 소화불량(소화안됨)으로 인한 위부팽만감, 구역, 구토, 식욕감퇴(식욕부진), 위산과다, 속쓰림, 위부불쾌감, 위부팽만감, 위통, 신트림

【용법·용량】

성인 1회 2정, 1일 3회 매 식후 복용

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것.
 - 투석요법을 받고 있는 환자
 - 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
 - 이 약으로 알레르기 증상(발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 환자
 - 다른 약물을 투여받고 있는 환자
 - 신장장애(신장장애) 환자
 - 간장애 환자
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 인산염 저하가 있는 환자
- 다음과 같은 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의할 것.
 - 혈압이 높은 환자 또는 고령자(노인)
 - 심장 또는 신장(콩팥)에 장애가 있는 환자
 - 부종(부기)이 있는 환자
 - 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.

- 이 약의 복용에 의해 노량이 감소하거나, 얼굴이나 손발이 붓거나, 눈꺼풀이 무겁거나, 손이 굳어지거나, 혈압이 오르거나, 두통 등의 증상이 나타나는 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사에게 상담할 것.
- 위알도스테론증 : 1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기로 계속 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부기, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청 칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우 복용을 중지할 것.
- 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타나는 경우가 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우에는 복용을 중지할 것.
- 복용 중 또는 복용 후는 다음 사항을 주의할 것.**
칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 혹은 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 치아지드계 이뇨제(트리클로르메치아지드)와 함께 복용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여할 것.
- 부작용**
 - 이 약을 투여함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움등)이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
 - 이 약을 투여함으로써 드물게 동계(두근거림), 졸음, 현훈(머지러움), 권태감, 두통이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
 - 이 약을 투여하는 동안 드물게 변비, 또는 입이 마르는 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
 - 순환기계 : 드물게 심계항진(두근거림)이 나타날 수 있다.
 - 간장 : 드물게 GOT, GPT 상승이 나타날 수 있다.
- 일반적 주의**
 - 장기로 연용(계속복용)을 하지 않는다.
 - 신장병의 병력이 있는 환자는 복용전에 의사 또는 약사와 상의한다.
 - 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
 - 2주정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 투여를 중지하고 약사 또는 의사와 상의한다.
- 상호작용**
위장진통, 진경(경련완화)제와 함께 복용하지 않는다.
- 소아·임부에 대한 투여**
 - 이 약은 소아(15세 미만)에게는 투여하지 않는다.
 - 임산부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유중인 부인에게는 투여하지 않는다.
- 저장상의 주의사항**
 - 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관한다.
 - 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

【저장방법 및 사용기한】 차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 24개월

【포장단위】 자사포장단위

【제품문의처】 한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000 (수신자요금부담)

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다. (구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.

※ 주의

- 충분한 양의 물과 함께 복용할 것.
- 포장을 개봉하여 복용 시 가급 정제에 포장물이 같이 따라오는 경우가 있으니 복용 시 정제에 포장물이 있는지 꼭 확인하시고 복용할 것.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포장재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

설명서 개정연월일 : 2012. 06. 20

Hanmi 한미약품(주)

(본사) 서울특별시 송파구 위례성대로 14
(공장) 경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자에게서 설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.