

PANTONE 909C

PANTONE 7739C

일반 의약품

분류번호 03950

소염소제

트로나제 정

1000정

대한뉴팜

8038400-000

조제용

【원료약품 및 분량】 1정 중

• 유효성분 : 결정트립신(USP)1.0 mg (2,500 USP 트립신 단위)
(동물유래성분 : 소, 췌장)

• 첨가제(동물유래성분) : 유당수화물(소, 우유)
브로멜라인(KP)40.0 mg (20,000 브로멜라인 단위)

• 기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 콜로이드성이산화규소, 크로스포비돈, 스테아르산마그네슘, 탭실드 흰색 11W401, 탭실드 녹색 319G726

【성상】 연녹색의 원형 장용성 필름코팅정

【효능·효과】 다음 질환 및 증상의 염증성 부종(부기)의 완화 : 수술 및 외상(상처)후, 유종물체(젖고임)

【용법·용량】 성인 : 첫날 1회 2정, 1일 4회, 이후 유지량으로 1회 1정, 1일 4회 복용한다. 체내에서의 작용기전은 아직 해명되지 않은 점이 많고 용량, 효과 관계도 밝혀진 것이 아니므로 목적 없이 투여하지 않는다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

1) 혈액응고이상 환자

2) 심한 간장애 또는 신장애 환자

3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(임신중 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않으므로 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.)

4) 항응고제를 투여하고 있는 환자(병용투여에 의해, 항응고제의 작용이 증강될 수 있으므로 관찰을 충분히 하고 신중히 투여한다.)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 중단 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 과민반응 : 발진, 발적 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나면 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.

2) 소화기계 : 설사, 변비, 때때로 식욕부진, 배가 거북함, 구역, 구토 등의 증상이 나타날 수 있다.

3) 혈액계 : 드물게 코피, 혈액가래 등의 출혈 경향이 나타날 수 있다.

4. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

정해진 용법·용량을 지킬 것.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1-30°C)

【제조회사】 대한뉴팜(주) / 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 66

【제조자】 (주)노바엠헬스케어 / 경상북도 경산시 하양읍 지식산업 4로 16-53

* 약은 어린이의 손에 닿지 않도록 보관해야 합니다.

* 의약품 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원에 피해구제를 신청할 수 있습니다.

개정년월일 : 2025. 02. 17



HDPE
뚜껑LDPE



8 806699 040226

【제조번호】
【사용기한】

30x18mm