

일반의약품

분류번호114

부레콜에프 캡슐



우수의약품제조

K G M P

적격업체제품

누구나 걸릴 수 있는 감기! 초기에 잡을 수 있습니다. 바이러스에 의한 감염으로 찾아오는 감기는 신체저항력이 저하되
며 합병증이 오기 쉽습니다. 부레콜에프캡슐은 오한, 두통, 발열, 항배부(項背部 : 목덜미)가 뻣뻣한 경우의 감기, 코감기,
열성질환의 토기, 염증성질환에 전통적으로 효과가 우수한 순수한방제제인 갈근탕과 해열진통제, 진해(분리되지 않은
가래) 거담제 등의 약이 약이 중합적으로 처방되어 복잡한 감기의 모든 증상상-코통, 코막힘, 기침, 인후통, 오한, 발열, 두
통, 관절통, 근육통에 신속하고 탁월한 효과를 나타냅니다.

【제품명】 부레콜에프캡슐

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐(400mg) 중

아세트아미노펜(KP)	150mg
슈도에페드린염산염(KP)	15mg
덱스트로메토르판브로마수소산염수화물(KP)	7.5mg
클로르페니라민말레산염(KP)	1.25mg
갈근탕엑스(10-1)(생규)	100mg

【성 상】 열은 갈색 또는 갈색의 가루가 든 상부 주홍색, 하부 미황색의 캡슐제

【효능·효과】 감기의 증상상(코통, 코막힘, 재채기, 인후통, 기침, 오한, 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

【포장단위】 자사포장단위

【용법·용량】 성인 : 1일 3회, 1회 2캡슐을 식후 30분에 복용합니다.

8세~14세의 어린이 : 1일 3회, 1회 1캡슐을 식후 30분에 복용합니다.

【저장방법 및 사용기한】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

【사용상의 주의사항】

1. 경고

매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다.
이러한 사람이 이 약을 복용하면 간 손상이 유발될 수 있다.

2. 다음 사람은 복용하지 말 것

- 1) 지금까지 이 약에 의한 과민 증상(예를 들면 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등)을 일으킨 적이 있는 사람
- 2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 복용하여 전신이나 나타난 적이 있는 사람

3. 다음 사람은 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지 천식, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람.
- 3) 수도 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영유아 및 14세 이하의 어린이.
- 4) 간장, 신장, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람.
- 5) 심장에 장애가 있는 사람 또는 고령자
- 6) 녹내장(예: 눈의 통증, 눈이 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨곤란이 있는 사람
- 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부
- 8) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람.

4. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것

- 1) 용법, 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 다음 약들과는 동시에 복용하지 말 것 (진해거담제, 다른 감기약, 해열진통제, 항히스타민제, 진정제 등.)
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 책임 하에 복용시킬 것.
- 4) 3개월 미만의 영아에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우도 1세 미만의 영아에게는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋다.
- 5) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의
사 또는 약사와 상담할 것.
 - ① 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수축이 차가워 지고 식은 땀, 숨
가쁨 등이 나타나는 경우
 - ② 고열을 수반하여 발진, 발적, 황상모양소포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
 - ③ 천식이 나타난 경우
- 6) 바르나탈계 약물, 삼한계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의
혈장반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있다.

5. 복용 중 또는 복용 후에는 다음사항을 주의할 것

- 1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨곤란, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
- 2) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.
- 3) 수회 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
- 4) 장기 연용하지 말 것.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
- 2) 직사일광을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

갈근탕 제제(경구)

1. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 병후의 쇠약, 현저하게 체력이 쇠약해진 환자(부작용이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 우려가 있다)
- 2) 현재까지 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토 등의 증상이 나타날 수 있다)
- 3) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다)
- 4) 발한경향이 현저한 환자(발한과다, 전신무력감 등이 나타날 수 있다)
- 5) 협심증, 심근경색 등의 순환기계 장애가 있는 환자 또는 그 병력이 있는 환자
- 6) 중증 고혈압 환자
- 7) 중증 신장에 환자
- 8) 배뇨장애 환자
- 9) 갑상선기능항진증 환자

2. 부작용

- 1) 위일도스테론증 : 글리시리진산으로서 1일 최대량 40밀리그램 이상을 함유하는 제제는 정기 연용할경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액
의 저류, 부종, 체중증가 등의 위일도스테론증이 나타날 수 있으므로 관촬(혈청칼륨치의 측정 등을)을 충분히 하고 이상이 인정되는 경우에는
투여를 중지하고 칼륨제 투여 등의 적절한 처치를 한다.
- 2) 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로 근병증이 나타나는 일이 있으므로 관촬을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 인정되는 경우에는
투여를 중지하고 칼륨제 투여 등의 적절한 처치를 한다.
- 3) 간기능장애, 황달 : AST, ALT, ALP, γ -GTP 등의 상승을 동반한 간기능장애, 황달이 나타날 수 있으므로 관촬을 충분히 하고, 이상이 인정
되는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다.
- 4) 과민증 : 발진, 발적, 가려움 등이 나타나는 경우가 있으므로 이러한 경우는 투여를 중지한다.
- 5) 자율신경계 : 불면, 발한과다, 빈뇨, 심계항진, 전신무력감, 정신흥분 등이 나타날 수 있다.
- 6) 소화기 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토 등이 나타날 수 있다.
- 7) 비뇨기 : 배뇨장애 등이 나타날 수 있다.

3. 일반적주의

- 1) 이 약의 사용에 있어 환자의 증(證)(체질, 증상)을 고려하여 투여하며, 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 이 약을 복용함으로써 노력이 감소하고 얼굴과 손발이 붓고 손이 굳어지며, 혈압이 오르면 두통 등의 증상이 나타날 때에는 복용을 중지하
고 약사 또는 의사와 상담한다.
- 3) 수일간 복용하여도 증상이 개선이 없을 때에는 복용을 중지하고 약사 또는 의사와 상담한다.
- 4) 장기간 계속해서 복용하지 않는 것이 바람직하며, 장기간 계속해서 복용할 때에는 약사 또는 의사와 상담한다.
- 5) 다른 한방제제 등과 병용투여할 경우 함유 생약의 중복에 주의해야 한다.

4. 상호작용

- 1) 생약함유제제, MAO저해제, 갑상선제제(치로신, liothyronine), 카테콜아민제제(에피네프린, 이소프레날린), 크산틴계제제(테오필린, 디프
로필린)과 병용투여시 불면, 발한과다, 빈뇨, 심계항진, 전신무력감, 정신혼란 등의 증상이 나타나기 쉬우므로 감광하는 등 신중히 투여한다.
- 2) 칼륨함유제제 및 글리시리진산 혹은 그 염류 함유 제제와 병용투여시 위일도스테론증이 나타나기 쉬우며, 저칼륨혈증으로 인하여 근병증
이 나타나기 쉬우므로 신중히 투여한다.

5. 임부에 대한 투여

임신중의 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고
판단되는 경우에만 투여한다.

6. 소아에 대한 투여

소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다).

7. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에게는 생리기능이 저하되어 있으므로 감광하는 등 주의한다.

8. 저장상의 주의

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사일광을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 보관한다.
- 3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

9. 기타

습진, 피부염 등이 악화될 수 있다.

설명서 개정년월 : 2017.01.



KYOUNG BANG
경방신약주식회사

인천광역시 남동구 남동대로 384(남동동, 남동공단 33B/8L)
인원전화: 032-622-4322, 032-622-4323

※ 자세한 사항은 식품의약품 안전처 온라인 의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 통하여 확인하실 수 있습니다.

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품은
구입처를 통하여 교환하여 드립니다.