

※ 이 문서는 본제를 사용할시에 필요한 주의사항을 기재한 것으로 본제와 같이 보관하십시오.

KGMP
우수약품지정업체

순수한방염증치료제

제 감 산 (은교산)
엑스과립

일반의약품
분류번호: 114

I-05

【원료약품 및 그분량】 1회용량(3.0g)중

금은화(KP)	1420mg	형개(KP)	568mg
연교(KP)	1420mg	두시(생규)	712mg
박하(KP)	852mg	우방자(KP)	712mg
길경(KP)	852mg	영양각(생규)	44mg
감초(KP)	852mg	이상 연조엑스로서	3600mg
담죽엽(생규)	563mg		
동물유래성분 :	유당수화물(소의 우유)		

【성 상】

갈색의 과립제

【효능 · 효과】

감기로 인한 목구멍 통증, 목마름, 기침, 두통

【용법 · 용량】

보통 성인 1회 1회 용량(3.0g)

1회 7~14세 1/2포(성인 용량의 1/2) 5~6세 1/4포(성인 용량의 1/4)를 1일 3회 식전 또는 식간(식사때와 식사때 사이)에 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적 인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

5세 미만의 영(젖먹이) · 유아

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한 약사와 상의할 것.

1) 고혈압 환자

2) 심장에 또는 신장에(신장장애) 환자

3) 부종(부기) 환자

4) 몸이 허약한 환자(체력이 쇠약해진 환자, 몸이 약한 환자)

5) 위장이 허약한 환자

6) 지금까지 약에 의한 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자

7) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)

8) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성

9) 고령자(노인)(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량(줄임)하는 등 주의할 것.)

4. 다음과 같은 사람은 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

(1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무

거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압 상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)

(2) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.

(3) 피부 : 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움

(4) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역 등

2) 수일간 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것.

2) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 · 감독 하에 복용시킬 것.

4) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메타이디드)와 병용(함께복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.

5) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.

6. 저장상의 주의사항

1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.).

2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.

3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에의한 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관 할 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온보관(1~30℃)보관

【포장단위】 120포, 500g

【소비자상담실】 080)597-1020

문서개정일 : 201701

※ 만약 구입 시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.i-pharm.kr)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 이 제품은 제제의 특성상 제조번호 별로 색상의 차이가 있을 수 있습니다.



(주)아이월드제약

인천광역시 남동구 함박외로 316(논현동)

www.i-pharm.kr

