



콧물 · 코막힘 · 재채기에...

# 코에드정

일반의약품  
분류번호 : 114

## [원료약품 및 그 분량] 1정 중

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 아세트아미노펜(KP) .....     | 325mg |
| 슈도에페드린염산염(USP) .....  | 30mg  |
| 클로르페니라민말레산염(KP) ..... | 2mg   |

## [성상]

흰색 장방형 정제 (앞 : TG 뒤 : CED)

## [효능·효과]

감기의 증상(여러증상)(콧물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

## [용법·용량]

성인 1회 1정 1일 3회 식후 30분에 복용한다.

## [사용상의 주의사항]

### 1. 다음 사람은 복용하지 말 것.

- 1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람.
- 2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람.
- 3) 이 약은 유당(젖당)수화물을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp유당(젖당)수화물분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

### 2. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것.

이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 된다.

### 3. 다음 사람은 복용 전에 의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 본인 양친 또는 형제 등의 두드러기 접촉성 피부염 기관지천식 알레르기성 비염(코염) 편두통 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람.
- 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람.
- 3) 수도 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 유·유아 및 14세 이하의 어린이
- 4) 간장·신장(콩팥), 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등의 병이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람
- 5) 녹내장(예: 눈의 통증, 눈이 침침함 등)이 있는 사람, 배뇨(소변을 누)곤란이 있는 사람
- 6) 고령자(노인).
- 7) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부.
- 8) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람.

### 4. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것.

- 1) 용법 · 용량을 잘 지킬 것.
- 2) 다음 약물과는 동시에 복용하지 말 것  
: 진해(기침을 그치게 함)거담(가래)제, 다른 감기약, 해열진통약, 항히스타민제, 진정제 등.
- 3) 소아에 복용시킬 경우는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.

- 4) 3개월 미만의 유아에는 복용을 피하고 3개월 이상인 경우 1세 미만의 유아에는 부득이한 경우를 제외하고는 복용시키지 않는 것이 좋다.
- 5) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것.  
① 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수족(손발)이 차가워지고, 식은땀, 숨기쁨 등이 나타나는 경우  
② 고열을 수반하여 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신(온몸)피부, 입 및 눈의 점막에 나타나는 경우  
③ 천식이 나타난 경우
- 6) 비르비탈계 약물, 심한게 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있다.
- 7) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

### 5. 복용 중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의할 것.

- 1) 복용하는 동안 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 배뇨(소변을 누)곤란, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상의할 것.
- 2) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전조작을 피할 것.
- 3) 수화(여러 차례) 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것.
- 4) 장기 연용(계속 복용)하지 말 것.

### 6. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것.
- 2) 직사광선(햇빛)을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것.
- 3) 오용(잘못 사용)을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법] 기밀봉기, 실온(1~30℃)보관

[포장단위] 10정

\* 본 의약품은 우수약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

- \* 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- \* 사용(유효)기한이 지난 의약품은 복용(사용)하지 마십시오.
- \* 이 약을 복용(사용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- \* 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- \* 부작용 보고 : 한국의약품안전관리원(1644-6223)

첨부문서 개정 연월일 : 2015. 07. 31

제조 · 판매자

 태극제약(주)

경기도 화성시 함남읍 제약공단3길 123  
☎ 소비자상담전화 080-300-8282  
🌐 <http://www.taiguk.co.kr>