

- 반드시 첨부문서를 읽은 후 사용하시고 첨부문서는 약과 함께 보관하십시오.
- 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하시기 바랍니다.

붙이는 구내염 치료제

분류번호 : 231(치과구강용약) 일반의약품

아프타치® 정


트리암시놀론 아세토니드

AFTACH® Tablets

【원료약품의 분량】 1정 중

주성분: 트리암시놀론 아세토니드(Triamcinolone acetoneide, JP) 0.025mg
(백색부착층에 주성분인 트리암시놀론 아세토니드 0.025mg을 함유)
첨가제(타르색소): 황색5호

【성 상】 흰색과 담황적색의 원형 이중정입니다.



【효능·효과】

• 주효능 효과

다음 질환에 의한 염증의 완화: 미란(잇몸염) 또는 궤양을 수반하는 난치성 구내염(입안염) 및 설염(혀염)

【용법·용량】

1. 환부(질환 부위)에 트리암시놀론 아세토니드로서 1회 0.025mg 1일 1~2회 백색면을 환부(질환부위)점막에 부착하십시오.

연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

- ① 이 약에 과민증의 병력이 있는 환자
- ② 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하지 마십시오.

2. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여합니다.

3. 부작용

때때로 칸디다증이 발생할 수가 있습니다. 이러한 증상이 나타날 경우에는 적절한 항진균제를 투여하고 증상이 개선될 때까지 이 약의 투여를 중지하십시오.

4. 일반적 주의

① 구강(입안)내의 감염을 수반하는 경우에는 투여하지 않는 것이 원칙이지만, 부득이 투여할 필요가 있는 경우에는 미리 적절한 항균제, 항진균제로 치료할 것을 고려하십시오.

② 특히, 이 약 투여중에 수두 또는 홍역에 감염되면, 치명적인 경과에 이를 수 있으므로, 다음 주의가 필요합니다.

- ① 이 약 투여전에 수두 또는 홍역의 병력과 예방접종의 유무를 확인하십시오.
- ② 수두 또는 홍역의 병력이 없는 환자에 대해서는 수두 또는 홍역에의 감염을 최대한 방지하여 충분한 배려와 관찰을 하십시오. 감염이 의심스러운 경우와 감염된 경우에는 즉시 진찰을 받아 지도하고, 적절한 처치를 하십시오.
- ③ 수두 또는 홍역의 병력과 예방접종을 받은 적이 있는 환자에서도 이 약 투여중에 수두 또는 홍역이 나타날 가능성이 있으므로 유의하십시오.

5. 고령자(노인)에 대한 투여

일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하될 수 있으므로 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여하십시오.

6. 적용상의 주의

① 이 약은 구강(입안)점막 부착제이므로 삼키지 마십시오.

② 다음 사항에 주의하여 정확히 사용하십시오.

- ① 사용방법: 손끝에 타액(침)을 약간 묻혀 정제의 착색면에 손끝을 대어 손끝에 정제를 부착시킨 후 환부(질환 부위) 점막에 흰색면을 접촉시키고 2~3초 가볍게 손끝으로 누른 후 손을 떼십시오.
 - ② 흰색면이 타액(침)에 젖게 되면 점막에의 부착성이 나빠지므로 주의하십시오.
 - ③ 환부(질환 부위) 점막이 타액(침) 등으로 심하게 젖어 있는 경우 부착하지 않을 수도 있으므로 미리 거즈 등으로 가볍게 닦은 후 부착시키십시오.
- ③ 유·소아에 사용할 경우에는 침부 후 손가락으로 떼어낼 수 있으므로 주의하십시오.

【저장방법】 차광기밀용기, 실온(4~30℃)보관

【포장단위】 아프타치정




【문의전화】 본사 : (02)2021-9300, 소비자 상담실 : 080-023-1897 (수신자 요금부담)

【수입자】 동화약품(주), 본사: 서울특별시 중구 후암로 98, 19층, 공장: 충청북도 충주시 충주산단1로 167

본 의약품은 KGMF품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결 기준에 의거, 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다. 본 의약품에 대한 자세한 허가사항은 식품의약품안전처 온라인의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조해주시기 바랍니다. ※이 첨부문서 작성일자 (2014년 5월 13일) 이후 변경된 내용은 www.dong-wha.co.kr에서 확인하실 수 있습니다.

1405

아프타치는 먹는 약이 아니라 입안에 붙이는 약입니다.
사용방법을 잘 읽어보신 후 사용하십시오.

1		정제가 얇으므로 깨어지지 않도록 부드럽게 눌러 빼내신 후, 깨끗한 종이 위에 오렌지색 면이 위로 오도록 놓으십시오.
2		염증부위의 침을 티슈나 가제로 눌러 깨끗이 닦아내십시오.
3		손가락 끝에 침을 조금 바르고 오렌지색 면을 가볍게 눌러 아프타치를 손가락에 부착시키십시오.
4		염증부위에 백색면을 부착합니다. (입안 깊은 곳에 염증이 있어 잘 안보일 경우에는 거울을 이용하거나 다른 사람의 도움을 받는 것도 좋습니다.)
5		약물 부착 부위를 손끝으로 누른 상태에서 1에서 10까지 천천히 센 후 손가락을 떼십시오.
6		혀에 생긴 구내염(입안염)일 경우, 아프타치를 붙인 후 침이 계속 나오면 2~3회 티슈나 가제로 닦아 내십시오. 15분 정도 지나면 오렌지색은 없어지고 투명한 젤리처럼 되어 떨어지지 않습니다.