

레보틴

점안액

(레보플록사신수화물)



전문 의약품

의약품	131
분류번호	안과용제

레보틴 점안액은 레보플록사신수화물을 주성분으로 하는 퀴놀론계 광범위 항균 점안제입니다. 레보플록사신수화물은 오픈플록사신의 항균활성체로만 구성되어있기 때문에 기존 오픈플록사신 제제보다 강력한 항균력을 가지고 있습니다. 또한 더 퀴놀론계 성분보다 중성부근 용해도가 높으므로 안조직내 이행성이 좋아 눈의 감염증을 효과적으로 치료해줍니다.

【성분·함량】 1ml 중

레보플록사신수화물(KP).....5mg
첨가제(등장화제):염화나트륨(KP).....9mg
첨가제(pH조정제):염산(KP)
첨가제(pH조정제):수산화나트륨(KP)
첨가제(용제):멸균정제수(KP)

【성상】

플라스틱용기에 든 미황색 내지 담황색의 투명한 용액의 점안제

【효능·효과】

<적응군>

이 약에 감수성이 있는 포도구균속, 연쇄상구균속, 폐렴구균, 소구균속, 장구균속, 코리네박테리움속, 슈도모나스속, 스테노트로포모나스(산토모나스) 말토필리아, 녹농균, 혈균속[인플루엔자균, Haemophilus aegyptius(Koch-Weeks)] 모락셀라속, 세라티아속, 클렙시엘라속, 프로테우스속, 모르겔라-모르가니, 아시네토박터속, 엔테로박터속, 아크네균

<적응증>

안검염, 맥립증, 누낭염, 결막염, 경판선염, 각막염, 각막궤양, 안과 수술시의 무균화요법

【용법·용량】 1회 1방울, 1일 3회 점안합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약 및 퀴놀론계 항생물질에 과민증 병력이 있는 환자

2. 이상반응

- 1) 속·드물게 속양 증상(구역, 사지냉감, 호흡곤란 등)이 나타날 수 있으므로 이상이 인정되는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
- 2) 과민증: 드물게 심혈관계 허탈, 의식소실, 혈관부종(인두, 후두, 얼굴), 기도폐쇄, 호흡곤란, 발진, 두드러기, 가려움증, 안검발적 부종, 피부발적, 결막출혈 등이 나타날 수 있으므로 이러한 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
- 3) 눈: 때때로 일시적인 작열감등 자극감, 불쾌감이, 때때로 자통, 발적, 소양감, 화학적결막염 및 각막염, 안구주위 및 안면부종, 이물감, 눈부심, 시력불선명, 눈물, 건조감, 안통, 드물게 어지러움, 비만성 표층각막염등의 각막장애 및 독성표피괴사로까지 악화되는 스티븐스-존슨 증후군이 일어날 수 있으므로 이런 증상이 나타나는 경우에는 투여를 중지한다.
- 4) 기타: 청각장애, 때때로 자극증상이 일어나는 경우가 있다.
- 5) 국내 시판후 조사결과
국내에서 재심사를 위하여 6년 동안 908명의 환자를 대상으로 실시한 시판후 조사결과 이상반응의 발현증례율은 인과관계와 상관없이 1.98%(18명/908명, 총 19건)로 나타났으며, 약물 이상반응으로는 작열감 (1.1%, 10례), 소양감(0.11%, 1례)이 보고되었다.

3. 일반적 주의

- 1) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현등을 방지하기 위하여 원칙적으로 감수성을 확인하고 치료상 필요한 최소 기간만 투여한다.

뒷면이어짐>>

【저장방법 및 사용기간】

기밀용기, 실온(1~30℃)차광 보관 사용기간 : 제조일로부터 36개월

【포장단위】 5ml, 6ml

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리하에서 제조된 (KGMP) 적격업체 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 유통 과정 중 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 주의

1. 사용전에 제품설명서를 자세히 읽어보십시오.
2. 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상의하십시오.
3. 정해진 용법·용량을 준수하십시오.
4. 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
5. 점안시 용기의 끝이 눈에 닿지 않도록 주의하십시오.
6. 투약을 잘 따라 보관하시고 치료 종료후 남은 점안액이 있을시 이후 재사용하지 않는 것이 좋습니다.

■ 소비자상담전화 (서울)02-3477-1731 (부산)051-204-3831



대우제약(주)

부산광역시 사하구 대저로 153 (신명동)
http://www.daewoopharm.com

최종개정년월일: 2014. 12. 05
작성년월일: 2015. 07. 06

※ 이 첨부문서 작성일자(2015년 7월 6일)이후 변경된 내용은 http://www.daewoopharm.com나 051-204-3831(대우제약 개발부)에서 확인할 수 있습니다.

- 2) 이 약의 장기 사용은 진균을 비롯한 비감수성균의 과잉 성장을 초래할 수 있으므로 장기 사용하지 않는다. 중복 감염시 투여를 중지하고 다른 요법으로 대체한다.
- 3) 이 약의 메티실린내성 포도상구균(MRSA)에 대한 유효성은 증명되어있지 않기 때문에 MRSA에 의한 감염증이 분명하고 임상증상의 개선이 나타나지 않은 경우 신속히 항MRSA 작용이 강한 약제를 투여한다.
4. 임부 및 수유부에 대한 투여
1) 임신중의 투여에 관한 안전성은 확립되어 있지 않으므로, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
2) 수유부에 투여할 경우에는 수유를 중단하거나 이 약의 투여를 중지한다.
5. 소아에 대한 투여
1세 미만의 영아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않다.
6. 작용상의 주의
1) 점안용오로만 사용한다.
2) 점안시 용기의 입구가 직접 눈에 닿지 않도록 주의한다.
3) 오염을 방지하기 위해 접 수 있는 한 공동으로 사용하지 않는다.
7. 저장상의 주의사항
1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 직사일광을 피하고 되도록 서늘한 곳에 보관한다.
3) 오염을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.