

돌트람셋^정

Doltramcet Tab.

【전문약품】

【원료약품 및 그 분량】1정 중
돌트람셋정
트라마돌염산염(TP)..... 37.5mg
아세트아미노펜(KP)..... 325.0mg
동물유래성분(참가제) : 유당수화물(소 우유)
참가제(식약처인정타르사스) : 청색2호, 황색5호, 황색203호

돌트람셋세미정
트라마돌염산염(TP)..... 18.75mg
아세트아미노펜(KP)..... 162.5mg
동물유래성분(참가제) : 유당수화물(소 우유)
참가제(식약처인정타르사스) : 청색2호, 알루미네레이크, 황색5호, 알루미네레이크, 황색203호, 알루미네레이크

【성 상】 연한 황색의 장방형 필름코팅형
【효능·효과】 중등도~중증의 급·만성 통증
【용법·용량】

돌트람셋정
12세 이상의 소아 및 성인 : 용량은 환자의 통증 정도 및 치료 반응에 따라 조절한다. 초회용량으로 2정 투여를 권장하며, 그 이후 투여 간격은 최소 6시간 이상으로 하되, 1일 8정을 초과하지 않도록 한다. 이 약을 필요 이상 장기간 투여하지 않도록 하며, 질병의 특성 및 심한 통증도 인해 장기간 투여가 필요한 경우, 정기적인 모니터링을 실시하여 이 약의 지속되어 여부를 확인하도록 한다.

돌트람셋세미정
12세 이상의 소아 및 성인 : 용량은 환자의 통증 정도 및 치료 반응에 따라 조절한다. 초회용량으로 4정 투여를 권장하며, 그 이후 투여 간격은 최소 6시간 이상으로 하되, 1일 16정을 초과하지 않도록 한다. 이 약을 필요 이상 장기간 투여하지 않도록 하며, 질병의 특성 및 심한 통증도 인해 장기간 투여가 필요한 경우, 정기적인 모니터링을 실시하여 이 약의 지속되어 여부를 확인하도록 한다.

돌트람셋정/돌트람셋세미정
소아 : 12세 미만의 소아에 대한 이 약의 안전성 및 유효성은 확립되어 있지 않으므로, 투여를 권장하지 않는다.

노인 : 통상적인 성인 용량을 투여하도록 한다. 단, 75세 이상의 노인에게 트라마돌을 경구 투여시 트라마돌의 소살분감기가 17%증가하였으므로 최소 6시간 이상 간격으로 이 약을 투여하도록 한다.
신부전환자 : 중등도 신부전 환자(크레아티닌 청소율이 10~30ml/분)에게는 투여간격을 12시간으로 연장하여 투여하도록 한다. 중증 신부전 환자(크레아티닌 청소율이 10ml/분 미만)에는 투여를 권장하지 않는다. 트라마돌은 혈액투석 및 여과시 매우 천천히 제거되기 때문에, 투석 후 진통효과 유지를 위해 이 약을 재투여할 필요가 있다.
간부전환자 : 중등도의 간부전 환자에게는 투여 간격을 연장하여 투여하는 것을 신중히 고려하도록 한다.

중증의 간부전 환자에게는 이 약을 투여하지 않도록 한다.

【사용상의 주의사항】

- 경고
 - 트라마돌을 권장용량 범위 내에서 투여받은 환자에서 발작이 보고된 바 있으며, 권장용량 이상 투여 시 발작의 위험은 증가되는 것으로 나타났다.
 - 트라마돌을 다량의 알콜과 병용시 발작의 위험은 증가된다;
 - 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRI) 항우울제 또는 다약제감
 - 삼환제 항우울제(TCA) 및 다른 삼환제 약물 (예, 시클로프라지민, 프로메타진 등)
 - 다른 마약류
- 트라마돌은 다음의 알콜과 병용시 발작의 위험을 증가시킬 수 있다;
 - MAO (Monamine Oxidase) 억제제
 - 신경안정제
 - 발작 역치를 낮출 수 있는 약물
- 간질 환자, 발작 병력자 또는 발작에 대한 위험인자 (머리 상해, 대사장애, 알콜을 또는 약물 금단 환자, 중추신경계 감염)가 있는 환자에서 경련 발생의 위험이 증가될 수 있다.
- 트라마돌 투약 환자에서 드물게 치명적인 아나필락시스반 반응이 보고된 바 있다.
- 트라마돌의 트라마돌을 마취제 또는 알콜올과 병용시 호흡억제가 나타날 수 있다. 이 약 과량 투여시 호흡억제에 대한 처치를 실시해야 한다. 날록손을 투여할 경우에 발작이 있을 수 있으므로 주의하도록 한다.
- 중추신경계 억제제를 복용한 환자에게 이 약을 투여시 중추신경계 및 호흡억제의 위험이 증가될 수 있다.
- 두개골내압이 증가된 환자나 머리상해 환자에서 이 약의 투여는 이면제제의 호흡억제 효과로 이산화탄소 지류와 이산화탄소 배출작용의 압력 증가로 인해 이러한 증상이 심각하게 나타날 수 있다.
- 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.
- 트라마돌은 모르핀(*μ-opioid*)의 정신적, 육체적 의존성을 유발할 수 있다.
- 간독성 : 돌트람셋정, 돌트람셋세미정에는 아세트아미노펜 및 트라마돌염산염이 함유되어 있다. 아세트아미노펜은 때로 간손상 및 사망을 초래하는 급성 간부전과 관련이 있으며, 대부분의 간손상은 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 4000 밀리그램을 초과하였을 때와 관련이 있으므로 사용시 주의한다. 특히 간장애 환자는 반드시 의사와 상의한 후 복용해야 한다.

- 다음 환자에는 투여하지 말 것
 - 이 약의 성분에 과민성이 있는 환자
- 알콜을, 수면제, 중추작용진통제, 이면제 또는 항정신성 약물 등 중추신경계 작용약물 중독 환자
- 심한 호흡억제상태 환자(가벼운 호흡억제가 나타날 수 있다.)
- 두부손상, 뇌의 병변이 있는 경우로 의식혼탁의 위험이 있는 환자
- MAO억제제를 투여받고 있는 환자 또는 최근 14일 이내에 투약한 경력이 있는 환자
- 소아청소년과 심한 혈액성 환자
- 심한 간장애, 심한 신장애, 심한 신기능부전 환자
- 아스피린, 전신비스테로이드성 소염진통제에 의한 전신발진 유발또는 병력이 있는 환자
- 약물로 조절되지 않는 간질 환자
- 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency)또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

돌트람셋세미^정

Doltramcet Semi Tab.

분류번호 : 114(해열진통소유제)

- 다음 환자에는 신중히 투여할 것
 - 모로모 병용 또는 병복투여 환자(동물용시험에서 가벼운 모르핀 길항작용이 인정되었으며 금단증상을 일으킬 수 있다.)
 - 아면제제, 마취제, 최면제, 페노카진, 신경안정제, 진정제 등과 같은 중추신경계 억제제 복용 환자
 - 담도질환 환자(동물용시험에서 대량투여하는 경우 오디팔마근을 수축한다.)
 - 간장애 환자(동물용 시험에서 혈청GOT, GPT 활성치의 상승을 보이는 수가 있다.)
 - 신장애 환자
 - 음주 환자
 - 이면에 과민증 환자
 - 간질 환자 또는 발작 발생 가능성이 있는 환자
 - 속성대, 만년포는 이유로 인한 의식 변화상태 환자
 - 이 약은 황색2호색소(타르사스 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
- 이상반응
 - 이상반응
 - 과민증
 - 4시간 이상
 - 과민증 - 속 등의 과민증상이 나타날 경우에는 투여를 중지한다.
 - 전신장애
 - 우면증, 피로, 흥조, 때때로 흥동, 경직, 실신, 금단증상이 나타난다.
 - 순환기계
 - 때때로 고혈압, 고혈압약의, 저혈압, 부정맥, 심박항진, 빈맥이 나타난다.
 - 중추신경계 및 말초신경계
 - 헛기, 두통, 진전, 때때로 운동실조, 경련, 긴장형진, 편두통, 편두통 의복, 불수면의, 수축, 지각이상, 혼, 한(경이) 나타난다.
 - 소화기계
 - 복통, 배변, 설사, 소화불량, 방기, 구제2호, 구역, 구토, 때때로 연하곤란, 혈변(melena), 허부종이 나타난다.
 - 정신과적 장애
 - 식욕감퇴, 불안, 착란, 도취, 불면증, 신경과민, 졸음, 때때로 간망증, 이인증, 우울증, 약물남용 및 의존, 감정 불안정, 환각, 발기부전, 악몽, 비정상적 사고가 나타난다.
 - 혈액계
 - 때때로 빈혈이 나타난다.
 - 호흡기계
 - 때때로 호흡곤란이 나타난다.
 - 비뇨기계
 - 때때로 단백뇨, 배뇨장애, 참조, 뇨저류가 나타난다.
 - 피부
 - 소양증, 발진, 발진 두드러기 등
 - 가타 - 간기는 이상, 재종증, 이명, 비정상적인 사시, 오향이 나타난다.
- 트라마돌(아세트아미노펜의 임상시험에서는 보고된 바 없으나, 이 복합제 보다 더 많은 환자들에게 사용경험이 있는 트라마돌염산염 및 아세트아미노펜의 임상시험과 시판 후 조사에서 관련이 있는 것으로 보고되고 기타 이상반응은 다음과 같다.
 - 트라마돌염산염
 - 혈관미란, 기립성 저혈압, 사색, 하탈, 심근허약, 폐부종, 호흡기중상(호흡곤란, 기관지경련, 천명, 혈관신장성 부종), 일회성 반응(아나필락시스와 두드러기, 스킨테스-존슨 증후군, 식욕부진, 운동장애, 호흡기 억제, 인지 기능 이상, 진동곤란, 우울증, 자살경향, 간염, 간 기능 부전과 위양과 출혈, 또한 간경, 활동, 인지 및 감각 변화를 포함한 다양한 정신 부작용) 게인에 따라 다르게 나타날 수 있다. 심혈관계상에서 크레아티닌과 간기능 검사를 포함한 심혈관계 검사치가 증가되었다는 보고가 있으며, 드물게 프로트롬빈 시간 상승을 포함하여 외파린 작용 변화가 밝혀졌다. 트라마돌을 선택적 세로토닌 재흡수 억제제(SSRIs)와 MAOa와 같은 세로토닌 제제와 병용시 세로토닌 증후군(장상장애 변화, 비정상진 발열, 떨림상 전신 흥분, 발작, 혼수, 빈맥, 착란, 환상, 빈혈, 착란, 근경련, 설사 등)이 포함)이 보고되었다. 인과관계는 확립되지 않았지만 전신의 약화가 보고된 바 있으며, 미약중단 중 나타나는 것과 유사하게 금단증상이 나타날 수 있다.
 - 아세트아미노펜
 - 알레르기 반응 (주로 마취 발진 또는 아세트아미노펜에 대한 2차성 과민반응)이 드물게 보고되었으나, 일반적으로 알콜을 마여 중독 후 회복 되었고, 필요한 경우 중증 치료가 실시되었다. 혈소판 감소증과 무구립과증 포함한 혈액학적 약화증이 보고된 바 있으나 반드시 아세트아미노펜과 관련된 것은 아니다. 아세트아미노펜이 외파린 유사물질과 같이 투여하였을 때 자프로트롬빈혈증을 일으킬 수 있음을 나타내는 여러 보고가 있다. 다른 연구에서는 프로트롬빈 시간은 변하지 않았다.
- 2시간 후 이상반응
 - 국내에서 재사용을 위하여 6년 동안 37,967명의 환자를 대상으로 실시한 시판 후 조사결과 이상반응의 발생빈율은 약물과의 인과 관계와 상관없이 45.7%(137명/37,967명, 2501건)로 나타났다. 이상반응으로는 구역, 변비, 구토 등의 소화계가 이상반응이 총 1,399건(3.66%)으로 가장 많았고, 한기증, 두통 등의 신경계 유해사례가 563건(1.46%), 전신이상미이 149건(0.39%), 정성제 이상 149건(0.39%), 피부 및 부속기관이 105건(0.28%), 혈액계 37건(0.09%), 신장 및 비뇨계가 28건(0.07%), 순환계가 28건(0.07%), 호흡계가 21건(0.05%), 심혈관계 12건 및 기타 432건(1.1%)로 조사되었다. 이 약과의 인과관계에 배제할 수 없는 약물이상반응을 발현율은 1.46%(57명/37,967명, 2244건)이었다. 주된 약물의 이상반응으로는 구역,149%(667명/37,967명, 한기증 0.39%(368명/37,967명)이며, 그 밖에 % 미만으로 보고된 이상반응을 기관별로 분류하면 다음과 같다
 - 전신이상 반응
 - 우면증, 피로, 발열, 부종, 흥동, 경직, 실신,
 - 심혈관계 작용
 - 심혈관성 유행성 심부전
 - 신경계
 - 헛기증, 두통, 현훈, 한기, 편두통, 진전, 지각이상, 긴장형진, 편두통형, 불수면의, 수축, 경련
 - 호흡기계
 - 호흡곤란, 천식, 운동성호흡곤란, 기침, 기침지연
 - 신장 및 비뇨계가
 - 배뇨장애, 뇨저류, 빈뇨, 신장기능 수치이상, 편뇨
 - 피부 및 부속기관
 - 소양증, 발진, 발혈종, 두드러기
 - 소화기계
 - 구토, 구토, 소화불량, 복통, 변비, 구강건조, 설사, 연하곤란, 방기, 허부종, 타액증가, 직장안 진행, 식도인정열, 위양진열, 마비성 장폐색증, 궤양직, 담낭염
 - 정신계
 - 졸음, 불안증, 식욕감퇴, 불안, 우울증, 신경과민, 감정 불안정, 환각, 이인증
 - 혈액계
 - 빈혈, 헤모글로빈감소, 적혈구감소, 백혈구감소, 핵혈구감기, 혈소판감소
 - 순환계가
 - 심장경전, 고혈압, 부정맥, 빈맥, 고혈압약제, 대동맥협착
 - 기타
 - 혈액, 혈색소대증상, 재종증, 이명, 오향, 영양이상증, 대비통증, 알레르기성비염, 비출혈, 비정상사시, 담도염, 진행, 눈의 물결, 간염발진, 간기능 이상, 중대한 약물이상반응은 간기능이상, 담낭염, 비정상장폐색증, 혼인등이 각 대씩 보고되었으며, 예상치 못한 약물의 이상반응으로 담낭염, 담로직, 마비성장폐색증, 신장기능수치이상(BUN,CR)상증, 타액증가, 허혈이 각각씩 보고되었다. 특수한 환자인 신장애 환자를 대상으로 한 조사에서 나타난 약물이상반응 발현율은 6.25%(17명/176명, 16%) 이었으며, 주된 약물 이상반응은 구역 및 한기증이 각 4건(22.7%)씩 이었다. 중대한 약물이상반응과 예상하지 못한 이상반응은 없었다. 특수한 환자인 간장애 환자를 대상으로 한 조사에서 나타난 약물이상반응 발현율은 6.63%(22명/332명, 36.2%)이었으며, 주된 약물이상반응은 구역 12건(3.61%), 한기증6건(1.8%)이었다. 중대한 약물이상반응은 마비성 장폐색증, 담낭염, 간기능 이상 각 1건(0.30%)씩 이었고, 예상하지 못한 이상반응은 마비성 장폐색증과 담낭염 각 1건씩이었다.
 - 국내 시판 후 조사기간 동안 저발생률이나 드물게 중대한 이상반응은 구역 32건, 현훈, 호흡곤란 각 2건,

혼미, 편두통, 안장애, 약소실, 심근경색증의 재발, 저혈압, 구토, 소화불량, 착란, 다발성 장기부전, 아나필락시스, 의도적인 과량 복용이 각각씩 총 23건으로, 이는 불확실한 규모의 인구집단으로부터 보고되었으며, 그 빈도 및 이 약의 인과관계를 확실히 추정하기가 어렵다.

- 또한 국내 시판 후 조사기간 동안, 총 3,666명을 대상으로 사용성적 조사 이의 별도로 실시한 시판 후 임상시험 결과, 예상치 못한 약물 이상반응으로는 트림 22건(0.04%), 가루분감전 12건(0.24%)씩 총 3건이 보고 되었다.
- 울트라셋정을 투여하기 전 치료약제진통제 투여력이 있는 환자군은 투여력이 없는 경우에 비해 이상반응 발현율이 통계적으로 유의하게 높게 나타났다(52.9% vs 37.9%, p<0.001). 또한 일 평균투여량이 480이상인 조사대상자에서 이상반응 발현율은 8.35%(289/3460명)로 2정 이상 4정 미만 투여한 한 환자군 4.36%(335/3449명)보다 이상반응 발현율이 통계적으로 유의하게 높게 나타났다.(p<0.001)
- 일반적 주의
 - 관절염을 치료하여 투여하지 않도록 하며, 다른 트라마돌 또는 아세트아미노펜 제제와 병용 투여하지 않도록 한다.
 - 트라마돌은 의존성 발현이 낮은 약물이라는 하나, 장기간 투여할 경우에는 의존성의 가능성을 전적으로 배제하기 어려우므로 투여기간을 조정하도록 한다. 약물남용 가능성이나 의존성의 위험이 있는 환자들은 신중히 관찰하며 단기간 투여하도록 한다. 트라마돌은 어떤 의존성 환자의 치료에 약물로 적절하지 않으며, 아편작용 약물이나 모르핀과 같은 금단증상을 억제하지 못한다. 아편양 작용제-길항제 (날부린, 부부프레놀, 펜타조신)와 병용시 수용체에서의 경쟁적 차단효과로 인하여 진통효과 감소와 금단증상 발생 위험이 있으므로 병용사용은 권장되지 않는다.
 - 이 약의 투여를 갑자기 중단할 경우 불안, 발한, 발열, 경직, 동통, 구역, 진전, 설사, 상기도 충후곤, 입문, 흥분, 신장장애, 운동장애, 위양과 증상 등과 같은 금단증상이 나타날 수 있다. 공황발작, 심한 발열, 한기, 지각이상, 이명, 비정상적인 중추신경계 병용 또한 매우 드물게 보고되었다. 임상경향상 악용량을 감행해 가며 중단할 경우 금단증상이 완화될 수 있다.
 - 트라마돌 투여 환자에서 중대한 아나필락시스상 반응을 포함하여 두드러기, 발진, 기면지, 경련, 중증속 피부괴사 및 스킨테스-존슨 증후군 등의 일차지 반응이 보고된 바 있다. 코데인과 같은 이면제제에 아나필락시스상 반응 병력이 있는 환자에서 그 위험이 증가될 수 있다.
 - 알콜을, 마취제, 최면제, 페노카진, 신경안정제 또는 진정 수면제, 진정 항우울제, 진정 항히스타민제, 신경이완제, 중추작용 항콜린제, 탈리도마이드, 바르콜린 등과 같은 중추신경계 억제제 투약 환자에게 이 약 투여시 주의하도록 하며, 이 약의 감량을 고려한다. 이러한 환자에서 트라마돌 투약 시 중추신경계 및 호흡 억제 위험이 증가될 수 있다. 이 약을 호흡 억제 위험이 있는 환자에서 투여시 주의하도록 하며, 다른 비아편제 진통제 사용을 고려하도록 한다.
 - 발작 가능성이 있거나 발작 역치를 낮추는 기타 약물, 특히 선택적 세로토닌 재흡수 억제제, 삼환제 항우울제, 항정신약, 중추작용 진통제 또는 크로아티제를 투여한 환자에게 트라마돌 투여시 경련이 보고된 바 있다. 알콜로 조절된 간질환자나 간질 가능성이 있는 환자는 꼭 필요한 상황에서만 이 약을 투여해야 한다.
 - 만성 알콜을 중독자에게 과다한 아세트아미노펜 투여로 간독성이 증가될 수 있다. 간장애 환자에게 이 약의 투여를 권장하지 않는다.
 - 간기능 부전 환자들에 대한 이 약의 약동학 및 내역상에 대해 시험한 바 없다. 트라마돌과 아세트아미노펜은 주로 간에서 대사된다. 중증의 간장애 환자는 이 약의 사용을 권장하지 않는다.
 - 신부전 환자들에 대한 트라마돌과 아세트아미노펜의 복합제에 대해 시험된 바 없다. 트라마돌의 사용 경험으로 신기능 부전 환자에서 트라마돌과 황색 대사제 M의 배설 정도와 배설량이 감소될 수 있다. 크레아티닌 청소율이 30mL/min 미만인 환자의 경우 이 약의 투여 간격을 12시간 마다 돌트람셋정 2정/돌트람셋세미정 4정을 초과하여 투약하지 않도록 한다.
 - 트라마돌을 장기적 투여할 경우에는 의존성의 가능성을 전적으로 배제하기 어려우므로 투여기간을 조정하거나 일회성 투여하여 기간을 가린다.
 - 이 약과 외파린 유사약물을 병용할 경우에는 혈액응고시간 (INR) 증가 보고가 있으므로, 의학적으로 적절한 경우 프로트롬빈 시간을 정기적으로 평가하도록 한다.
 - 한 연구에서 엔부펜과 산화질소로 말한 마취중 트라마돌을 사용하였을 때 수술 중 마취가 약해지는 경우가 증가되는 것으로 보고되었다. 추가 정보가 있을때까지 약한 수준의 마취중 트라마돌의 사용을 피해야 한다.
- 약물상호작용
 - 선택적세로토닌재흡수억제제SSRI 항우울제 및 식욕감퇴제, 삼환제 항우울제 (TCA), 다른 삼환제 약물 (예, 프로메타진 등) 및 다른 아편제제 투여 환자에게 이 약 투여시 발작의 위험이 증가될 수 있다. 트라마돌은 발작의 역치를 낮추는 MAO 억제제, 신경이완제 또는 다른 약물들을 복용하는 환자들에서 발작의 위험을 증가시킬 수 있다. MAO 억제제를 투여하고 있는 환자에서 이 약 투여시 신중하도록 한다. 동물시험에서 MAO 억제제와 트라마돌을 병용시 시험동물의 사망 수가 증가되었다. 트라마돌과 MAO 억제제 또는 선택적 세로토닌 재흡수 억제제를 병용시 발작 및 세로토닌 증후군 등 부작용이 증가될 수 있다.
 - 카르바마제핀과 병용시 트라마돌의 혈장 간도 감소로 인하여 트라마돌 진통 효과 및 작용 시간이 유의하게 감소할 수 있다. 카르바마제핀이 트라마돌 대사를 증가시키나, 트라마돌의 발작 발생 위험을 증가시킬 수 있으므로 병용을 금한다.
 - 트라마돌은 CYP2D6에 의해 대사제 M으로 대사된다. 키니딘은 CYP2D6의 선택적 억제제로서 트라마돌과 키니딘의 병용투여는 트라마돌의 농도를 증가시키고 M의 농도를 감소시킨다. 이러한 현상의 임상적 중요성은 아직 모른다. 인해 간 마이크로솜 생체의 약물상호작용 시험에서 트라마돌은 키니딘 대에 영향이 나타나지 않았으며, 플루옥세틴, 파록세틴, 이타프리드,플린과 같은 CYP2D6 저해제와의 병용 투여는 트라마돌의 대사를 일부 저해하였다.
 - 케토코나졸과 에리스로마시인과 같이 CYP3A4를 저해하는 것으로 알려진 기타 약물들은 트라마돌의 대사 (N-디메틸화)를 저해할 수 있고, 황색 O-디메틸화 대사체의 대사 또한 저해할 수 있다. 이러한 상호작용의 임상적 의미에 대해서는 연구된 바 없다.
 - 아세트아미노펜의 흡수 속도는 메드코프라이드나 또는 돔페리돈으로 증가될 수 있으며 클레스티라미드로 흡수가 감소될 수 있다.
 - 소아 및 노인에 대한 투여
 - 12세 미만의 소아에 대한 안전성 및 유효성이 확립되어 있지 않다.
 - 간, 신장, 심장 기능의 저하 및 동시에 수반되는 질병과 다양한 약물치료가 더 자주 일어날 수 있으므로 노인환자에서 이 약의 투여를 주의하여야 한다.
 - 임부 및 수유부에 대한 투여
 - 임부에 대한 적절한 임상시험은 실시된 바 없으며, 태아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우 투여한다.
 - 트라마돌과 그 대사체는 유모으로 소량 분비되므로, 수유부에는 투여하지 않는 것이 바람직하다.
 - 운전, 기계조작에 대한 영향
 - 중등도는 졸음이나 한기를 일으킬 수 있으며 이것은 알콜을 또는 기타 중추신경계 억제제에 의해 증강될 수 있다. 민첩성에 영향을 주기 때문에 운전이나 기계조작과 같은 위험 가능성이 있는 행위시 주의하도록 한다.
 - 과량 투여
 - 과량 투여시 트라마돌 독성, 아세트아미노펜 독성 또는 두 약물 모두의 독성 증상 및 징후가 나타날 수 있다.
 - 트라마돌 과량 투여시 호흡억제, 기면, 혼수, 발작, 심장마비, 사망의 심각한 증상이 나타날 수 있다. 트라마돌 과량 투여시 간부전 및 사망을 야기하는 간경의 소염증성상 과다가 나타날 수 있으며 신장의 세뇨관 괴사, 저혈당, 응고장애가 일어날 수 있다. 아세트아미노펜 과량 투여시 초기

- 증상은 구역, 구토, 권태감 등이 나타나며 간독성의 임상과 실험실적 증가는 48-72시간 투여 후에도 나타나지 않을 수 있다.
- 과량투여시 응급조치가 가능한 기관이나 병원으로 연락하도록 하며, 일관적인 처치법과 함께 적절한 호흡이 유지될 수 있도록 한다. 날록손 투여로 트라마돌 과량 투여로 유발된 증상을 일부 회복시킬 수 있으나, 발작의 위험이 증가된다. 트라마돌 사용 경험상 혈액투석은 4시간 투석하여 투여량의 7%가 제거되었으며, 과량투여시 처치법으로 유지하지 않다. 아세트아미노펜의 과량 투여시에는 10-12시간 이내에 N-아세틸시스테인을 정맥주사하거나 메치모린을 경구투여하여 간을 보호한다.
 - 기타
 - 트라마돌의 경우 동물시험에서 내성이 나타나므로 연용 및 중량의 경우에는 주의하여 투여한다.
 - 이 약의 발작성, 변이형성 및 수태능 장애 유발을 평가하기 위한 동물시험 및 실험실적 시험이 실시되지 않았다.
 - 발양성: 트라마돌 30mg/kg 90mg/㎡, 1일 최대 임상용량 185mg/㎡의 0.5배를 2년간 마우스에게 경구 투여한 발양성 시험에서 폐와 간에서 종양 발생이 적었지만, 통계학적으로 유의하게 증가 되었다. 인체에서의 이러한 종양 발생 위험은 없었으나 사료되며, 트라마돌을 30mg/kg (180mg/㎡, 1일 최대 임상용량 1배) 투여한 쥐의 발양성 시험에서는 관찰되지 않았다.
 - 유전독성: 트라마돌은 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험, 포유류 배양세포를 이용한 염색체 이상시험, CHO 세포를 이용한 유전자 돌연변이시험, 마우스 혈종마 k+/+ 유전자돌연변이시험중, 침묵마, 마우스와 헬스시험을 이용한 스펙시험, 마우스를 이용한 유전자시사시험에서 음성이었다만, 마우스 결과와 유전자 돌연변이시험 중 대사활성법과 젯트 소화시험에서 양적인 변이가 유발되었다. 전체적인 시험결과를 볼 때, 트라마돌은 인체에서 유독성을 발생위험은 없다.
 - 수태능: 트라마돌을 수컷 쥐에게 50mg/kg (360mg/㎡, 1일 최대 임상용량 185mg/㎡의 1.6배)까지 투여한 경우와 암컷 쥐에게 75mg/kg (460mg/㎡, 1일 최대 임상용량 185mg/㎡의 2.4배)를 투여한 시험에서 수태능에 대한 영향은 관찰되지 않았다.

【저장방법】 일냉(25℃ 이하)보관

【포장단위】 30정, 100정

- * 본 약품들은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변형 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
* 본 제품은 공정거래위원회 고시에 의거 소비자 피해에 보상해드립니다.
* 본 제품은 복용법에 맞게 정제기 기도에 걸릴 수 있으나 유익하시기 바랍니다.
* 본 제품은 염·우야의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
* 본 참문서상의 내용은 최신정보 및 허가정보의 변경에 따라 계속 수정됩니다. 작성일 이후 변경된 내용은 시스템업데이트로 온라인약국도서관(http://drug.mlds.go.kr) 또는 클로바서신(080-024-0030)에서 확인할 수 있습니다.

소비자상담실 ◆ 080-024-0030(수신자부담 클로바서신)

작성일자 : 2016.03.30

광동제약(주)

경기도 평택시 선단로 114

www.ekdp.com