

복용전에 이 설명서를 꼭 읽어 주세요. 또, 필요한 때에 읽을 수 있도록 보관해 주세요.

일반의약품

분류번호114

포박신

[작약감초탕] 캡슐

우수의약품제조

K G M P

적격업체제품

한방의 작약감초탕을 원방으로 한 포박신캡슐은 진통, 진경작용을 하는 작약과 원화, 해독, 진통에 효과가 있는 감초를 엄격한 품질관리와 과학적방법으로 추출하여 분말화하여 탕제의 효과를 그대로 복용하기 편리하도록 캡슐에 충전한 치료제입니다.

【제품명】 포박신캡슐(작약감초탕)

【원료약품 및 그 분량】 1캡슐(550mg) 중

작 약(KP)	1.0g
감 초(KP)	1.0g
상기수침건조엑스 350mg	

【성상】 갈색의 분말이 충전된 상부 연청색, 하부 담청색의 캡슐제

【효능·효과】 급격히 일어나는 근육의 경련을 수반하는 통증

【포장단위】 자사포장단위

【용법·용량】 보통 성인 1회 2캡슐을 1일 3회 식전 또는 식간에 복용한다.

【저장방법 및 사용기한】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 심장병 또는 그 병력이 있는 환자(증상이 나타나면 투여를 중지하고 연용하지 않는다.)
- 2) 1세 이하의 영아 (소아에 대한 용법·용량이 있는 경우에 한함)

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

- 1) 고혈압 환자
- 2) 신장에 환자
- 3) 부종 환자
- 4) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자)
- 5) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성
- 6) 어린이(어린이에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다.))(소아에 대한 용법·용량이 없는 경우에 한함)
- 7) 고령자(일반적으로 고령자는 생리기능이 저하되어 있으므로 감량하는 등 주의할 것.)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

- (1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)
- (2) 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
- (3) 울혈성심부전, 심실빈박 : 전신의 나른함, 두근거림, 숨참, 흉부 불쾌감, 흉통, 어지러움, 실신 등
- (4) 간기능 장애 : 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색으로 됨) 등
- 2) 5~6회 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 이 약은 증상이 있는 경우에만 복용하고, 계속하여 복용하지 말 것.
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 복용시킬 것.(소아에 대한 용법·용량이 있는 경우에 한함)
- 4) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메타이디드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.
- 5) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.

5. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐보관할 것.).
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 3) 의약품을 원래용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 의한 사고발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

설명서 개정년월 : 2017.03.



※ 자세한 사항은 식품의약품 안전처 온라인 의약품정보관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 통하여 확인하실 수 있습니다.
 ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질·변태 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.