

래비정(快鼻錠)

KGMP 적격지정업체 / 일반의약품 / 분류번호 : 132

※ 의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

부비동염·비카타르·코막힘·취비증

원료약품의 분량 : 1정(600mg) 중

길경(KP).....	666.66mg	참출(KP).....	33.32mg
감초(KP).....	500.00mg	치자(KP).....	33.32mg
작약(KP).....	500.00mg	시호(KP).....	33.32mg
대추(KP).....	500.00mg	승마(KP).....	33.32mg
지삼(KP).....	333.32mg	지모(KP).....	33.32mg
생강(생규).....	333.32mg	맥문동(KP).....	33.32mg
석고(KP).....	333.32mg	비파엽(KP).....	33.32mg
신이(생규).....	333.32mg	이상수침근조엑스 400mg	
황금(KP).....	33.32mg	동물유래성분(유당수화물/소/우유)	

성 상 : 담갈색의 장방형 필름코팅 정제**효능 · 효과 :** 부비동염, 비(鼻)카타르, 코막힘, 취비증(코에서 냄새가 나는 증상)**용법 · 용량 :** 보통 성인 1회 1.5 ~ 3정, 1회 15 ~ 8세 1 ~ 1.5정을 1일 2회 아침, 저녁 공복(빈 속)에 복용한다.

사용상의 주의사항

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 8세 미만의 어린이 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
 - 1) 고혈압 환자 2) 심장병 또는 신장(콩팥)장애 환자 3) 부종(부기) 환자 4) 고령자(노인)일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이 저하되어 있으므로 감람(참)을 임하는 등 주의할 것. 5) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자) 6) 수유부, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 7) 이전에 간질환 병력이 있거나 다른 심각한 건강상 위해가 있었던 환자 8) 위장기 허약한 환자(식욕부진, 위부불쾌감, 묽은 변, 설사 등이 나타날 수 있다.) 9) 현재 저하계 체력이 쇠약해진 환자(이상반응이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 수 있다.)
- 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 (1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감소로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.) (2) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지(팔다리)경련, 마비 등의 증상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것. (3) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 복통(배앓음), 설사 등 (4) 간질환으로 의심되는 증상(피곤, 식욕부진, 황달, 구역 및 구토를 동반하는 심각한 상부 위와 통증, 진한 노 등)유럽증(수면에서 간혹씩 이상반응이 보고된 바 있다.) 2) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
- 기타 이 약의 복용시 주의할 사항
 - 1) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 2) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것. 3) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(부로세미드, 에타크리산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메타이디드)와 병용(함께 복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것. 4) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것. 5) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 · 감독 하에 복용시킬 것.
- 저장상의 주의사항
 - 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.). 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오염(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

저장방법 및 사용기간 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월**포장단위 :** 60포

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다.

민약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.

※ 제품에 대한 기타 자세한 사항은 본사 (043)881-6333로 문의 하시기거나 또는 온라인의약품도서관(<http://drug.mids.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.

첨부문서 개정 년월일 2014. 04. 22

제조자

한솔신약(주)

 충북 음성군 규암읍 행령길
 Hansol Pharmacy, Co., Ltd. 2-11도청리 33-22

HS : 280410