



복합 정장·지사제

일반의약품

분류번호:237

바이스탑 캡슐

BYSTOP Caps.

설사는 누구나 흔히 경험하는 증상으로 스트레스, 신경과민, 소화불량, 세균감염 등 여러 원인으로 일어날 수 있습니다. 이런 증상은 가볍게 지나가는 경우도 많지만 지속되면 장에서 영양소나 수분의 흡수가 충분하지 않아 건강유지에 큰 지장을 줄 수 있으므로 주의해야 합니다.

바이스탑캡슐은 설균, 정장, 수렴, 진경(경련완화) 등의 작용을 나타내는 4종의 성분이 배합된 복합 정장·지사제로 설사, 복통(배아픔)을 수반하는 설사, 체함, 묽은 변, 토사에 우수한 효과를 나타냅니다.

【성분·함량】 (1캡슐 중)

베르베린탄닌산염(KP)	50mg
(무수물로서 베르베린 14.8mg)	
비스무트차질산염(KP)	100mg
(비스무트로서 73mg)	
스코폴리아엑스10배산(KP)	50mg
(총 알카로이드(히요시이아민 및 스코폴아민)로서 0.05mg)	
우르소데옥시콜산(KP)	2mg
첨가제(타르색소) : 적색 3호, 황색 5호, 황색 203호	

【성 상】 담황갈색의 분말이 충전된 상부-주홍색, 하부-미황색(연노랑)의 캡슐제

【약리작용】

바이스탑캡슐은 베르베린탄닌산염, 비스무트차질산염, 스코폴리아엑스10배산, 우르소데옥시콜산의 4종 성분을 함유한 복합 정장·지사제입니다.

1. 바이스탑캡슐에 함유된 베르베린탄닌산염은 장내에서 수렴방부작용을 나타내는 탄닌산과 장관(창자) 내 유해세균 살균작용을 지니는 베르베린으로 분해되어 설사를 멈추는데 이종으로 작용합니다.
2. 바이스탑캡슐은 비스무트차질산염을 함유하여 위·장점막을 보호하는 수렴작용과 자극완화 작용을 지니므로 우수한 정장효과를 나타냅니다.
3. 바이스탑캡슐은 진통 및 진경(경련완화)효과를 지니는 스코폴리아엑스10배산을 함유하므로 설사에 수반하여 나타나는 경련 및 복통(배아픔)의 증상을 완화하여 줍니다.
4. 바이스탑캡슐은 식습관변화로 인해 발생하는 고지방식 등에 의한 소화흡수불량성 설사를 개선하기 위해 우르소데옥시콜산(UDCA)을 함유하고 있습니다.

【효능·효과】 설사, 복통(배아픔)을 수반하는 설사, 체함, 묽은 변, 토사

【용법·용량】

만 15세 이상 : 1회 2캡슐, 1일 3회
 만 11세 이상 ~ 만 15세 미만 : 1회 2캡슐, 1일 2회
 만 8세 이상 ~ 만 11세 미만 : 1회 1캡슐, 1일 3회
 복용시간을 4시간 이상으로 하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 신생아
 - 2) 만 7세 이하의 어린이
 - 3) 이 약은 유당수화물(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp

유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애 (glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

위장진통 · 진경(경련완화)제

3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 약으로 알레르기 증상(발진, 충혈되어 붉어짐, 가려움 등)을 일으킨 일이 있는 사람
- 2) 발열을 수반하는 설사 환자, 고령자(노인), 혈변 환자 또는 점액변이 계속되는 환자
- 3) 위 · 십이지장궤양 등이 있는 환자
- 4) 어린이
- 5) 다른 약물을 복용하고 있는 사람
- 6) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

상당 시 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약을 복용함으로써 알레르기 증상(발진, 가려움 등)이 나타나는 경우
- 2) 이 약을 복용하는 동안 드물게 입이 마르는 증상이 나타나는 경우
- 3) 여러 차례 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지키십시오.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 투여하십시오.
- 3) 급성의 심한 설사를 할 경우 또는 구역, 복통(배아픔), 복부(배부분)팽만 등의 증상을 수반하는 설사를 할 경우에는 이 약으로 무리하게 설사를 멈추게 하면 오히려 병을 악화시킬 수 있으므로 이러한 경우에는 투여에 대하여 약사 또는 의사와 상의하십시오.
- 4) 복용 시에는 음주하지 마십시오.
- 5) 3일 이상 계속하여 복용하지 마십시오.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법 및 사용기간】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 3년

【포장단위】 자사포장단위(외부용기 표기)

※구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회고시 "소비자 분쟁해결기준"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

■제품문의 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

코스닥상장
 **신일제약(주)**

충청북도 충주시 양성면 복상골길 28



설명서 개정년월일 : 2014.05.02