

세코론-지 크림

일반의약품

의약품 분류번호	264 진통, 진정, 수렴, 소염항염제
-------------	--------------------------

세코론지크림은 급만성습진, 접촉피부염, 아토피피부염, 구진상두드러기, 건선, 가려움증, 일광피부염 등 알레르기성, 염증성 피부질환에 사용됩니다.
세코론지크림은 벌레 물린데, 1도 화상, 2차 세균 감염에 의한 피부질환 등에 광범위하게 사용되는 국소 용 (부분적)피부질환치료제입니다.

【원료약품의 분량】 1g 중

베타메타손발레레이트 (KP)	0.61mg
겐타마이신황산염 (KP)	1.0mg(역가)
첨가제(보존제): 파라옥시벤조산메틸 (KP)	1.6mg
파라옥시벤조산프로필 (KP)	0.4mg

【성상】

전질균등한 백색의 크림

【효능·효과】

- 2차 감염된 알레르기성 또는 염증성 피부질환 : 습진, 접촉피부염, 지루피부염, 아토피피부염, 광피부염, 만성단순태선, 간찰진(피부 스침증), 박탈피부염, 가려움, 건선
- 1도 화상

【용법·용량】

1일 1~3회 환부(질환부위)에 적당량을 바른다.

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.
 - 1) 세균(결핵, 매독 등)·진균(칸디다증, 백선 등)·스피로헤타속·효모·바이러스(대상포진, 단순포진, 수두, 풍두증 등)·동물(곰, 사면발이 등)성 피부감염증 환자(증상이 악화될 수 있다.)
 - 2) 이 약 또는 이 약 성분에 과민증 및 그 병력이 있는 환자
 - 3) 고막천공(뚫림)이 있는 습진성 외이도(바깥귀길)염 환자(천공부위의 치유지연이 나타날 수 있다.)
 - 4) 궤양(베체트병 제외), 제2도 심재생(드러나지 않는) 이상의 화상·동상 환자(피부재생이 억제되어 치유가 지연될 수 있다.)
 - 5) 입주위피부염, 보통여드름, 주사(rosacea) 환자
 - 6) 스트렙토마이신, 카나마이신, 겐타마이신, 네오마이신 등 아미노글리코사이드계 항생물질 또는 바시트라신에 의한 과민증 및 그 병력이 있는 환자(아미노글리코사이드계 항생물질사이에는 교차 알레르기유발성이 입증되었다.)
- 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인 및 수유부 2) 유·소아
- 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부서류를 소지할 것.
 - 1) 피부
 - ① 감염증 : 피부의 세균성(전염성농가진(고름딱지증), 모낭염 등), 바이러스성 감염증이 나타날 수 있다.밀봉봉대법(ODT)의 경우 나타나기 쉽다. 이와 같은 증상이 나타날 경우에는 적절한 항균제나 항진균(곰팡이)제등을 병용(함께 복용)하고 증상이 신속히 개선되지 않을 경우에는 사용을 중지한다.
 - ② 일반적 피부증상 : 모낭염, 부스럼, 피부자극, 자통(찌르는 것 같은 아픔), 발열, 작열감(화끈감), 가려움, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 홍조, 피부건조, 농포(고름물집)성피부염, 멍뭍, 상처 악화, 욕창, 농포(고름물집)증, 과민증, 피부변색, 다모증, 여드름상발진, 색소침착저하증, 입주위피부염, 알레르기성접촉피부염, 피부자극, 피부자극, 2차감염, 피부위축, 줄무늬 등의 증상이 나타나는 경우에는 사용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담한다. 겐타마이신으로 치료하면 일시적인 피부자극(홍반, 가려움증)이 나타나지만 일반적으로 치료를 중지할 필요는 없다.
 - ③ 장기연용(계속 복용) : 스테로이드성 여드름, 스테로이드성 피부(피부위축, 모세혈관 확장, 자반(자주색 반점), 스테로이드성 주사, 입주위피부염(입주위·안면전체에 홍반, 모세혈관확장, 딱지, 인설(비늘, 껍질)), 어린선(魚鱗癬)양 피부변화, 다모(털과다), 색소탈실 등이 나타날 수 있다. 이러한 증상이 나타날 경우에는 천천히 사용량을 줄여 코르티코이드를 함유하지 않은 약으로 바꾸어 사용한다.
 - 2) 내분비계 : 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용, 밀봉봉대법에 의해 코르티코이드 전신투여와 같은 뇌하수체·부신(콩팥위샘)피질계 기능의 억제를 가져올 수 있으므로 주의한다.
 - 3) 눈 : 안검(눈꺼풀) 피부에 사용시 안압 상승, 녹내장을 일으킬 수 있으므로 주의한다. 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용, 특히 밀봉봉대법을 사용할 경우 후방하백내장, 녹내장 등이 나타날 수 있다.
 - 4) 균교대현상 : 국소적용 항생물질제제를 장기간 사용한 경우에 때때로 진균을 포함하는 비감수성균의 균교대감염(superinfection)을 일으킬 수 있으므로 이러한 경우에는 사용을 중지하고 적절한 처치를 한다.
 - 5) 신(콩팥)장애, 난청(귀먹음) 등이 나타날 수 있으므로 장기 연용(계속 복용)을 피한다.
- 기타 이 약의 사용시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
 - 2) 소아에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 사용한다.
 - 3) 국소(부분) 코르티코이드의 전신적 흡수는 몇몇 환자에게 가역적인 시상하부-뇌하수체-부신(HPA)축의 억제, 쿠싱증후군, 고혈당증, 당뇨 등을 일으킬 수 있으므로 국소(부분) 코르티코이드를 광범위한 치료면 또는 밀봉봉대법 하에 사용하는 환자는 정기적으로 혈중 코르티솔 농도, 요중에 유리되는 코르티솔을 측정하거나 ACTH자극시험을 하여 HPA축 억제 여부를 검사한다.
 - 4) 국소(부분) 코르티코이드의 전신적 흡수로 인해 HPA축이 억제되었다면 약물사용의 중지, 투여빈도의 감소, 화상이 약한 코르티코이드로의 대체 등의 방법을 시도하고 일반적으로 국소(부분) 코르티코이드 약물투여 중지 후 HPA축 기능은 신속히 회복된다.
 - 5) 치료기간은 질환의 정도나 병소의 범위, 환자의 반응에 따라 다르다. 그러나 3~4주 치료 후에도 증상이 개선되지 않으면 다른 질환을 의심해 보아야 한다. 증상이 개선되지 않거나 악화되는 경우에는 사용을 중지한다.
 - 6) 증상이 개선 되면 가능한 한 빠른 시일 내에 사용을 중지한다.
 - 7) 대량, 장기간, 광범위하게 특히 밀봉봉대법을 사용함으로써 코르티코이드제를 전신적으로 투여한 경우와 같은 증상이 나타날 수 있다. 특별한 경우를 제외하고는 장기, 대량사용 및 밀봉봉대법을 피한다.
 - 8) 감작(과민상태로 만들)할 수 있으므로 충분히 관찰하고 감작징후(발적(충혈되어 붉어짐), 부종(부기), 구진, 소수포(물집) 등)가 나타날 경우에는 사용을 중지한다.
 - 9) 장기 연용(계속 사용) 하지 않는다.
 - 10) 코르티코이드 및 겐타마이신은 밀봉봉대법 또는 광범위한 부위 적용, 장기연용(계속 사용)등으로 인해 피부를 통해 흡수된다고 알려져 있다. 이러한 경우에는 정기적인 관찰 및 치료에 앞서서 BUN 검사등을 통한 신기능 검사가 권장된다.
 - 11) 겐타마이신 국소(부분)투여시 전신적인 효과가 나타나지 않지만, 전신독성을 나타낼 수 있는 농도에서는 신부전환자 또는 제8뇌신경환자에서는 영구적인 전정(前庭)기능장애의 원인이 될 수 있다.
 - 12) 임부에 대한 안전성이 확립되지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인에는 대량 또는 장기간에 걸친 광범위한 사용을 피하고 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여한다.
 - 13) 국소적으로 투여된 코르티코이드가 모유로 이행되는지 여부는 알려져 있지 않으나 전신적으로 투여된 코르티코이드가 모유중으로 이행되므로 수유부에 투여시 주의하여야 하며, 수유부에 대한 이 약의 투여가 필요한 정도를 고려하여 수유를 중지하거나 이 약의 투여를 중지한다.
 - 14) 소아는 체중당 체표면적의 비율이 성인보다 커서 코르티코이드로 인해 HPA축 억제, 쿠싱증후군, 발육장애 등이 나타나기 쉬우므로 주의한다. 국소적용 코르티코이드로 치료받은 소아에게서 HPA축 억제, 쿠싱증후군, 발육장애, 체중증가의 지연 및 두개골내고혈압의 발생이 보고된 바 있다. 소아에게서 발견되는 부신억제의 징후는 혈장 코르티솔 수치가 낮아지고 ACTH 자극에 반응이 없는 것이다. 두개내고혈압의 징후로는 솟구멍의 돌출(bulging fontanelle), 두통 및 양쪽시신경유두부종(papilledema)이 있다.
 - 15) 기저귀 등은 밀봉봉대법과 같은 작용을 나타낼 수 있으므로 주의한다.
 - 16) 소아환자에게 사용할 경우에는 치료 효과를 나타내는 최소 양만을 사용한다.
 - 17) 국소용 코르티코이드의 과다사용 또는 장기사용 시 뇌하수체-부신기능을 억제하여 2차적인 부신 기능부전증을 유발하고 쿠싱증후군을 포함하는 고코르티솔혈증을 유발시킬 수 있다. 겐타마이신을 국소로 과다 또는 장기간 사용하였을 때는 병소부에 진균 또는 비감수성 균의 과도한 증식이 일어날 수 있다. 이러한 경우 적절한 대중적 치료와 필요하다. 급성 고부신피질호르몬증상(hypercorticotid symptoms)은 보통 가역적이다. 필요할 경우 전해질 불균형을 치료하여야 한다. 만성독성인 경우 코르티코이드를 서서히 감량하여 중단하여야 한다.
 - 18) 건선환자에게 장기, 대량 사용할 경우에는 치료 중 또는 치료종지 후에 건선성 흉피증, 농포성 건선 등이 나타난다는 보고가 있다.
- 적용상의 주의
 - 1) 안과용으로 사용하지 않는다.
 - 2) 화상이나 면도 후 등 치료 이외의 목적으로 사용하지 않는다.
 - 3) 의사의 감독없이 밀봉봉대법을 사용하지 않는다.(특히 밀봉봉대법을 사용할 경우 세균감염이 나타나기 쉬우므로 적용 전에 환부(질환부위)를 청결히 한다.)
- 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
 - 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관한다.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 24개월

【포장단위】 자사포장단위

【제품문의처】 한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000(수신자요금부담)

- ※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다.
(구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질·변패·오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)
- ※ 사용기한이 경과한 제품은 사용하지 마십시오.

※ 주의

1. 먹지 말 것. 눈, 코, 귀 등에 내용물이 들어가지 않도록 주의할 것.
2. 사용 중 중간에 공기가 찬 부분이 나올 수 있으나 중량에는 문제가 없음.
3. 사용 후 뚜껑을 바로 닫지 않아 내용물이 흐를 수 있으니 주의할 것.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포자재(용기, 케이스)에 상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

설명서 개정연월일 : 2011. 10. 20

제조의뢰자 : **Hanmi 한미약품(주)**

(본사)서울특별시 송파구 방이동 45
(공정)경기도 화성시 팔탄면 하저리 893-5

제 조 자 : (주)씨트리 - 경기도 남양주시 일패동 778-1

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는
설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품 정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.

8-801121-001738

Ver. 00173005