

알피렌 연질캡슐

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중

셀레늄 함유건조 효모(KPC)	926mg
(셀레늄으로서 50μg)	
토코페롤아세테이트(KP)	400 IU
레타놀 팔미테이트(KP)	500 IU
아스코르브산(KP)	500mg
참가제(보존제) 파라옥시벤조산 메틸(KP)	0.143mg
참가제(보존제) 파라옥시벤조산 프로필(KP)	0.028mg
참가제(동물유래): 젤라틴, 소(Bovine) 가죽의 안쪽부위에서 유래	
참가제(타르색소): 황색 4호, 적색 40호, 청색 1호	

[성상]

담갈색의 유상물 질이 함유된 암보라 색의 타원형 연질캡슐

[효능·효과]

1. 다음 경우의 비타민 A, C, E의 보급

- 육체 피로
- 임신·수유기
- 병중·병후의 체력저하
- 노년기

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.

- 눈의 건조감 완화, 야맹증
- 말초혈행장애 및 경년기시 다음 증상의 완화 - 어깨·목결림, 수족저질·수족냉증
- 햇빛·피부병 등에 의한 색소침착(기미, 주근깨)의 완화, 잇몸출혈·비출혈 예방

[용법·용량]

성인 1회 1캡슐, 1일 1회 식후복용한다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

임부에 비타민 A(레타놀)를 1일 5,000 IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 말 것(비타민 A 결핍증 환자는 제외).

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것

- (1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- (2) 만 12개월 미만의 젖먹이
- (3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- (4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것

인산염, 칼슘염, 경구용 테트라사이클린계 제제, 제산제

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- (1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- (2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)
- (3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민 A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민 A 결핍증 치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이 약을 투여하지 않는다.

또한 비타민 A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민 A 투여는 5,000 IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.

(4) 소화성 궤양, 만성세양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자

(5) 심장·순환기계기능 장애 환자

(6) 신장장애 환자

(7) 자간백혈증 환자

(8) 동맥화자 또는 신장결석에 있는 환자

(9) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 자질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

(10) 이 약은 황색4하이드록시타르타르산을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.

5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상할 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것

(1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우

구역, 구토, 가려움, 건조하고 가친 피부, 통풍성 관절부종, 피부부종, 설사, 변비, 발진, 발적, 피부염, 말·호흡기 약
취, 탈모, 조급증

(2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있다.

(3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.

(4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.

(5) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장증상, 고나트륨혈증, 우혈심부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있다.

(6) 장기간 고용량의 비타민 A(헵타로틴으로부터 전환된 것을 제외한) 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈염성증) 위험을 높일 수 있다.

(7) 항알도스테로제, 트리암 테렌과 병용투여시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의할 것.

(8) 우발적으로 과량복용 한 경우

(9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

(1) 장해진 용법& #8228;용량을 잘 지킬 것

(2) 이 약에 함유된 비타민 A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000 IU 이상을 넘지 않도록 한다.

(3) 각종 요검사에서 혈당의 검출을 방해할 수 있다.

(4) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용중, 복용전후에는 피할 것

(5) 지방과 부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 자질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

7. 저장상의 주의사항

(1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것

(2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것

(3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

[포장단위] 자사포장단위

[저장방법] 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

[사용기한] 제조일로부터 36개월

■ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.

■ 제품에 대한 기타 자세한 사항은 본사(054-552-5381~2)로 문의하시기 바랍니다.

개정일자 2014.03.25

제조사 :



알파제약

경북 문경시 산양면 산양공단2길 20