

감기몸살 · 발열 · 두통 치료제

패감산과립

(인삼패독산)

KGMP 적격지정업체 / 일반의약품 / 분류번호 : 114

※의약품을 사용하시기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하십시오.

▶ 감기로 인한 몸살 ▶ 발열 ▶ 두통 치료제

원료약품의 분량 : 1포(3.0g) 중

인삼(KP).....	1.25g	길경(KP).....	1.25g
시호(KP).....	1.25g	천궁(KP).....	1.25g
전호(생규).....	1.25g	복령(KP).....	1.25g
강황(KP).....	1.25g	감초(KP).....	1.25g
독활(KP).....	1.25g	이상수침연조엑스 3.62g	
지각(생규).....	1.25g	동물유래성분(유당수화물 / 소 / 우유)	

성 상 : 회갈색의 과립

효능 · 효과 : 감기로 인한 몸살, 발열, 두통

용법 · 용량 : 보통 성인 1회 1포(3.0g)를 1일 3회 식전 또는 식간에(식사때와 식사때 사이에) 복용한다.

사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당) 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.

1) 고혈압 환자 2) 심장예 또는 신장예(신장장애) 환자 3) 부종(부기) 환자 4) 현저하게 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있다.) 5) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.) 6) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고 있는 환자) 7) 어린이(어린이에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 적다.)) 8) 고령자(노인)(일반적으로 고령자노인은 생리기능이 저하되어 있으므로 감령(감량)하는 등 주의할 것.)

3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 한의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능한한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 복용(사용)에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 (1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등(1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류(고임, 붓림), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.) (2) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증(근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것. (3) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 설사 등 (4) 피부 : 발진, 두드러기 등 2) 수일간 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 정해진 용법 · 용량을 잘 지킬 것. 2) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과 의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 3) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 푸르제 이노제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 타이리드제 이노제(트리클로르메타이리드)와 병용(함께 복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것. 4) 다른 한약제제 등과 함께 복용할 경우에는 함유 생약의 중복에 주의할 것.

5. 저장상의 주의사항

1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것.). 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것. 3) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

저장방법 및 사용기간 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 36개월

포장단위 : 60포

※ 본 제품은 우수의약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다.

만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입하신 약국을 통해 교환하여 드립니다.

※ 제품에 대한 기타 자세한 사항은 본사 (043)881-6333로 문의 하시기거나 또는 온라인의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인할 수 있습니다.

제조사

한솔신약(주)

Hansol Pharm. Co., Ltd.

충북 음성군 공음읍 청암리 2-1(의도리 33-3)

첨부문서 개정 년월일 2013. 12. 05

HS : 181010