

눈 영양제

일반의약품

분류번호:311

아이비즈

연질
캡슐

Eye beads soft caps.

“눈은 마음의 창(窓)”이라는 말이 있듯이 눈은 인체의 중요한 부위이며 눈을 건강하게 유지하고 관리하는 것은 매우 중요한 일입니다.

우리의 눈은 장시간의 컴퓨터 사용, TV시청, 독서, 운전, 주위의 건조한 환경, 자외선 등에 의해 혹사당하고 있습니다. 아이비즈연질캡슐은 눈의 건강을 소홀히 하기 쉬운 현대인을 위한 눈 영양제로서 동물성 필수지방산의 집합체인 사유와 비타민 A를 함유하고 있어 눈의 건조, 피로, 시력저하, 야맹증(밤에 잘 못보는 증상) 등의 예방 및 치료에 효과적입니다.

【성분 · 함량】 (1캡슐 중)

사유(생유)	296.7mg
레티놀팔미테이트유(KP)	2.0mg
(비타민 A 로서)	2,000 IU)
에르고칼시페롤과립(별규)	0.2353mg
(비타민 D ₂ 로서)	200 IU)
동물로로필(별규)	0.3mg
첨가제(타르색소) : 청색 1호, 황색 5호, 황색 203호	

【성 상】 연한 녹색의 점조(끈끈하고 뻑뻑함)성 내용물이 든 녹색의 삼각형 연질캡슐제

【약리작용 및 특징】

1. 체내에 비타민 A가 결핍되면 눈 조직 세포들이 노화되어 안구조직이 탄력성을 잃게되어 눈이 건조해지게 됩니다. 아이비즈연질캡슐은 비타민 A를 함유하고 있어서 안구의 탄력성을 정상으로 유지시켜주는 윤활제와 같은 역할을 함으로써 눈의 건조감 및 이를 수반하는 각막 연화증을 개선시켜줍니다.
2. 아이비즈연질캡슐은 망막에서의 로돕신 재생능력을 촉진시켜 광감수성을 높여주고, 어둠속에서 시력회복을 증진시켜 야맹증(밤에 잘 못보는 증상)을 예방, 치료해줍니다.
3. 아이비즈연질캡슐은 비타민 A, 비타민 D, 인체에 필요한 필수지방산의 총체인 사유 및 동물로로필을 주성분으로 하고있어 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후) 체력저하시, 발육기, 노년기의 시력저하를 개선시켜 줍니다.

【효능 · 효과】

1. 다음 증상의 완화 : 눈의 건조함 2. 치골의 발육불량 3. 야맹증(밤에 잘 못보는 증상) 4. 구루병 예방
5. 다음 경우의 비타민 A, D의 보급 : 임신수유기, 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후) 체력저하 때, 발육기, 노년기

【용법 · 용량】

15세 이상 성인 : 1일 1회, 1회 2캡슐

7세 이상~ 15세 미만 : 1일 1회 1캡슐씩 복용하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 경고

임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 IU 이상을 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 비타민 A를 5,000 IU/일 이상 투여하지 마십시오. (비타민 A 결핍증 환자는 제외)

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 마십시오.

- 1) 복용 후 다음과 같은 증상이 나타난 경우 : 피부(가려움), 소화기(오심(구역), 구토)
- 2) 1개월 정도 복용하여도 증상이 개선되지 않을 경우
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

4. 다음 사람은 복용(사용)하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 사람
- 2) 임신 3개월 이내 또는 임신을 원하는 여성 (임신 전 3개월부터 임신 3개월 사이에 비타민 A 를 1일 10,000 IU 이상 섭취한 임부에서 태어난 아이에 선천성 이상 비율이 증가한다는 보고가 있습니다.)

5. 다음과 같은 증상이 계속 또는 증강되는 경우에는 복용(사용)을 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의 하십시오 : 설사

6. 기타 이약의 복용(사용)시 주의 할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 복용시키십시오.
- 3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이약의 투여를 적절히 조절하십시오.
환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전(뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관하십시오.
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못사용)을 피하고 품질을 보호 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 실온보관(1~30℃), 제조일로부터 3년

【포장단위】 자사포장단위(외부용기 표기)

〈보관시 주의사항〉

본 제품은 하절기에는 열이나 습기에 의해 젤라틴피막이 녹아 변형(녹아 붙음)될 수 있으며, 건조기에는 외기의 낮은 온도에 의하여 캡슐이 열어 파손이 일어날 수 있으므로 가능한면 건조하고 서늘한곳에 보관하십시오.

※ 구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변태 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회고시 "소비자 분쟁해결기준"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※ 본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

■ 제품문의 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

제조의뢰자

제조사

코스닥상장
 **신일제약(주)**
충청북도 충주시 양성면 복성골길 28

(주)서흥
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61



설명서 개정년월일 : 2015.05.29