

큐텐홀

연질
캡슐

코큐텐 · 항산화제 · 비타민 · 미네랄 복합 영양제

큐텐홀연질캡슐은 신체의 노화 및 질병에 의해 생성된 활성산소를 제거하는 능력이 탁월한 코엔자임Q10 (유비데카레논)과 우리 몸에서 바로 작용하는 활성비타민 및 각종 미네랄이 함유되어 있는 고품격 영양제로서, 체내 에너지생성 촉진, 심장기능 개선, 운동기능 향상 및 피로회복 작용을 가지고 있으며 체력저하시, 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후) 회복시에 빠른 쾌유를 도와드립니다.

【특장점】

큐텐홀연질캡슐은 코엔자임 Q10 및 활성비타민, 각종 미네랄이 함유되어 있어,

1. 성인병의 원인이 되는 활성산소에 대한 저항능력을 증가시킵니다.
2. 체내 에너지 생성을 촉진하여 세포 및 각 기관의 기능을 향상시킵니다.
3. 피로물질의 상상을 억제하여 피로회복, 운동기능의 향상을 도와줍니다.
4. 항산화제인 코엔자임 Q10의 함량이 높아 하루 1번 복용으로 우수한 효과를 발휘하며 활성비타민과 각종 미네랄을 함유하여 우리 몸의 활력을 되찾아 줍니다.

【성분 · 함량】 (1캡슐 중)

유비데카레논 (Ubidecarenone) (코엔자임 Q10 (Coenzyme Q10))(KP)	10mg
티아민질산염 (Thiamine Nitrate) (KP)	25mg
리보플라빈부티레이트 (Riboflavin Butyrate) (KP)	12mg
니코틴산아미드 (Nicotinamide) (KP)	50mg
판토텐산칼슘 (Calcium Pantothenate) (KP)	50mg
피리독신염산염 (Pyridoxine Hydrochloride) (KP)	5mg
아스코르브산 (Ascorbic Acid) (KP)	300mg
토코페롤아세테이트 (Tocopherol Acetate) (KP)	100mg
셀레늄함유건조효모 (Selenium in Dried Yeast) (별규)	38.46mg
(셀레늄으로서 (as Se))	50μg
산화아연 (Zinc Oxide) (KP)	6.22mg
(아연으로서 (as Zn))	5mg
황산망간수화물 (Manganese Sulfate Hydrate) (USP)	3.08mg
(망간으로서 (as Mn))	1mg
d-비오틴 (d-Biotin) (USP)	0.03mg
폴산 (Folic Acid) (KP)	0.4mg
산화마그네슘 (Magnesium Oxide) (KP)	10mg
(마그네슘으로서 (as Mg))	6mg
첨가제(타르색소) : 적색 40호, 청색 1호	

【성 상】

노란색의 유상체가 충전된 어두운 적색의 불투명 장방형 연질캡슐제

【효능 · 효과】

1. 다음경우의 비타민 B1, B2, B6, C, E의 보급

- 육체피로
- 임신 · 수유기
- 병중 · 병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 노년기

2. 이 약에 함유된 비타민 등의 효능 · 효과는 다음과 같습니다.

- 비타민 E
말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨 · 목 결림, 수족저림 · 수족냉증 (손발이 차가움)
- 비타민 B1
다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등)
각기 · 눈의 피로
- 비타민 B2
다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

【용법 · 용량】 만 8세 이상 및 성인 1일 1회, 1회 1캡슐

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 12개월 미만의 젖먹이
- 3) 심한 증상의 신부전 환자
- 4) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 5) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 인산염, 칼슘염, 경구용(복용용) 테트라사이클린계 제제, 제산제
- 2) 레보도파

3. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
- 2) 고옥살산뇨증 환자(hyperoxaluria : 요중에 과량의 옥살산염이 배설되는 상태)
- 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
- 4) 소화성궤양, 만성궤양성대장염, 국한성대장염 등의 위장질환 환자
- 5) 심장·순환기계기능 장애 환자
- 6) 신장장애 환자
- 7) 저단백혈증 환자
- 8) 당뇨병(췌장)관련 질환, 간질환 환자
- 9) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자
- 10) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오. 상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구토, 구역, 묽은 변, 식욕부진, 복부팽만감, 붉은 반점, 부전수축(심장박동정지), 중추신경계 기능저하, 피부염, 땀·호흡 시 악취, 탈모, 조급증, 위장관장애, 소화장애, 상복부통증, 저혈압, 폐부종
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관 막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있습니다.
- 5) 피리독신을 1일 500mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
- 7) 대량투여로 인해 구역, 구토 등의 위장장애, 고나트륨혈증, 울혈성부전, 부종(부기) 등의 증상이 나타날 수 있습니다.
- 8) 할알도스테론제, 트리암테렌과 병용(함께 복용)투여 시 고칼륨혈증을 일으킬 수 있으므로 주의하십시오.
- 9) 우발적으로 과량복용 한 경우
- 10) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여하십시오.
- 3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있습니다.
- 4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사에 영향을 줄 수 있습니다.
- 5) 녹차, 홍차 등 탄닌을 함유하는 차는 복용 중, 복용전후에는 피하십시오.
- 6) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절하십시오. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
- 3) 오염(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

【저장방법 및 사용기간】 기밀용기, 차광실온(1~30℃)보관, 제조일로부터 2년

【포장단위】 자사포장단위(외부용기 표기)

※구입시 사용기한이 경과되었거나 유통과정중 변질, 변태 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회고시 "소비자 분쟁해결기준"에 의거 소비자의 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

※본 설명서 작성(개정)년월일 이후 변경된 내용은 아래 제품문의 및 홈페이지를 통하여 확인할 수 있습니다.

■제품문의 (02)2211-6700, www.sinilpharm.com

제조의뢰자

코스닥상장



신일제약(주)

충청북도 충주시 양성면 북성길 28

제조사 : (주)알피코프

경기도 화성시 향남읍 제약공단 4길 35-7



설명서 개정년월일 : 2014.09.01