

# 오로친<sup>®</sup>에스 정

항히스타민제



(010880644506601)

## 두드러기·습진·가려움증·꽃 / Hives, Urtication improve.

오로친 에스®정은 생약과 양약이 복합처방된 피부전용 항히스타민제입니다. 두드러기란 약이나 음식의 중독 등으로 생기는 피부병의 한 종류로서 가려움증을 동반한 피부 부종(부기)·홍반(붉은반점)·습진 등의 증상을 나타내는데, 이것은 체내 히스타민 활성이 증가되어 나타나는 현상입니다. 오로친 에스®정은 우수한 효과를 가진 항히스타민제로서 두드러기, 습진, 가려움증, 꽃 등의 치료에 효과적인 제제입니다. 전세계적으로 가장 널리 사용되어지는 항히스타민제 클로르페니라민말레산염과 d-메틸에페드린염산염은 항아세트콜린·혈관수축작용을 통해 두드러기·습진·가려움증 등에 효과적입니다. 또한, 생약 성분 인진호·치자·대황 3가지 한방처방으로 구성된 인진호탕건조엑스는 간해독 작용을 통해 신체내 독소 물질의 해독, 두드러기 유발물질을 신속히 배설시켜줌으로써 근본적인 치료를 돕습니다.

**【원료약품 및 그 분량】**이 약 1정(240mg) 중

### · 유효성분

클로르페니라민말레산염(KP) ..... 4.0mg  
d-메틸에페드린염산염(KP) ..... 12.0mg  
인진호탕건조엑스(10→1)(별규) ..... 53.3mg

· 동물무래성분 : 유당수화물(소, 우유)

· 기타 첨가제 : 미결정셀룰로오스, 스테아르산마그네슘, 오파드라이 II검은색(85367705), 폴리디드성아산화규소, 크로스포비돈, 폴리 에틸렌글리콜6000

**【성상】** 검은색의 원형 필름코팅정

**【효능·효과】** 두드러기, 습진, 가려움증, 꽃

**【용법·용량】** 성인(15세이상) : 1회 1정 1일 3회 식후에 복용

### 【사용상의 주의사항】

#### 1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

- 1) 15세 미만의 소아
- 2) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.
- 3) 임부 또는 임신할 가능성이 있는 부인(이 약에 함유되어 있는 대황의 자궁 수축작용 혹은 글란 내 장기의 유출작용에 의해 유조산의 위험이 있다.)
- 4) 수유부(이 약에 함유되어 있는 대황 중 안트라퀴논은 유도체는 모유중으로 이행되어 유아에게 설사를 야기할 수 있으므로 수유 중에는 약물복용을 금지하거나, 수유부에게는 복용하지 않는다.)

#### 2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

- 1) 지금까지 알레르기용약, 감기약, 진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 멀미약 등에 의해 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움증을 일으킨 적이 있는 환자
- 2) 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈의 침침함 등) 환자, 배뇨(소변을 누)곤란 환자
- 3) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인
- 4) 다른 약물을 투여중인 환자
- 5) 허약체질 환자
- 6) 설사, 연변이 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)
- 7) 현저하게 위장이 허약한 환자
- 8) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수 있다.)

9) 현저하게 체력이 쇠약해진 환자(부작용이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 수 있다.)

### 3. 부작용

- 1) 이 약에 의해 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구갈(목마름), 구역, 구토, 식욕부진, 위부(상복부)불쾌감 등의 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
- 2) 이 약은 하제(설사약)성분을 함유하고 있으므로 투여에 의해 묽은 변이 나타날 경우도 있으나 만약 심한 복통(배아픔)을 수반하는 설사가 나타날 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
- 3) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 복통, 설사 등이 나타날 경우

### 4. 일반적 주의

- 1) 이 약은 극약 성분이 함유되어 있으므로 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 이 약의 투여에 의해 졸음이 나타날 수 있으므로 자동차 또는 기계류의 운전조작을 하지 않도록 주의한다.
- 3) 수일간 투여하여도 증상의 개선이 없는 경우에는 투여를 중지하고 의사 또는 약사와 상의한다.
- 4) 장기간 계속하여 투여하지 않는다.
- 5) 대황의 사하작용은 개인차가 있으므로 용법·용량에 주의한다.
- 6) 자극성 완화제는 장기간 계속 사용시 약물에 대한 내성이 증가하고 변비가 악화될 수 있으므로 1주일 이상 계속 사용해서는 안 된다. 만약 매일 변비약이 필요한 상태라면 원인을 조사하여야 한다.
- 7) 다른 한방제제 등을 병용하는 경우는 함유 생약의 중복에 주의한다. 대황 함유제제는 병용투여 시 특히 주의한다.

### 5. 상호작용

다른 설사약, 알레르기용약, 항히스타민제를 함유하는 약(예 : 멀미약, 감기약, 진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약))과는 병용(함께 복용)투여하지 않는다.

### 6. 저장상의 주의사항

- 1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아)보관한다.
- 3) 오용(잘못 사용)을 피하고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.

**【저장방법】** 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

**【포장단위】** 20정(10정/PTPX2), 100정(10정/PTPX10)

**【제조사】** ㈜유유제약 / 충북 제천시 바이오밸리 1로 94

※ 본 의약품은 KGMP 적격업체에서 생산하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질·변패·오염 되거나 손상된 의약품은 구입한 약국 및 의약품 판매자를 통하여 교환하여 드립니다. 제품에 관한 문의 및 확인은 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(nedrug.mfds.go.kr) 또는 홈페이지(www.yuyu.co.kr)나 크로바서비스(수신자요금부담) 080-070-0701으로 하시기 바랍니다.

※ 사용자 이상반응 발생할 경우 한국 의약품안전관리원(www.drugsafe.or.kr) 부작용 신고 및 피해구제 상담(1644-6223)

※ 첨부문서 개정연월: 2020년 11월 13일

## 유유제약

서울사무소 : 서울시 중구 동호로 197 유유빌딩  
본사·공장 : 충북 제천시 바이오밸리 1로 94