

의약품은 복용하기 전에 첨부문서를 주의깊게 읽고, 첨부문서를 의약품과 함께 보관하여 주십시오.

기능성소화불량 개선제

가스탄정

(모사프리드시트르산염수화물)

GASTAN Tab.

K G M P	전문의약품
적격업체	분류번호: 239

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

- 유효성분: 모사프리드시트르산염수화물(KP).....5.29mg
(모사프리드시트르산염무수물로서 5mg)
- 첨가제(동물유래성분): 유당수화물(기원동물: 소, 사용부위: 우유)
- 기타첨가제: 산화티탄, 스테아르산마그네슘, 옥수수전분, 저치환도히드록시프로필 셀룰로오스, 콜로이드성 이산화규소, 폴리에틸렌글리콜 6000, 히드록시프로필 셀룰로오스, 히프로멜로오스

【성상】 흰색의 장방형 필름코팅정제

【효능·효과】

기능성소화불량으로 인한 소화기증상(속쓰림, 구역, 구토)

【용법·용량】

성인: 모사프리드시트르산염무수물로서 1일 15mg을 3회로 나누어 식전 또는 식후에 경구투여한다(먹는다, 복용한다).

【사용상의 주의사항】

- 다음 환자에는 투여하지 말 것
이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
- 이상반응
998례 중 40례(4.0%)에서 이상반응이 나타났다. 주요한 이상반응으로는 설사·연변(1.8%), 구갈(목마름)(0.5%), 권태감(0.3%) 등이 있다.
임상검사치에서는 792례 중 30례(3.8%)에서 이상변동이 보였다. 주요 내용으로는 호산구증가증(1.1%), 중성지방의 상승(1.0%), AST(GOT), ALT(GPT), ALP 및 γ -GTP의 상승(각 0.4%) 등이 있다.
1) 중대한 이상반응
극중간염, 간기능장애와 황달(각 0.1% 미만): 극중간염, 현저한 AST(GOT), ALT(GPT), γ -GTP의 상승 등을 동반한 심각한 간기능장애, 황달이 나타나는 경우가 있고, 사망에 이른 예도 있으므로, 충분히 관찰하고, 이상이 확인되는 경우에는 즉시 투여를 중지하고, 적절한 처치를 실시한다.
2) 기타 이상반응
① 과민증: 발진, 두드러기, 때때로 부종
② 혈액계: 때때로 호산구증가, 백혈구감소
③ 소화기계: 복부팽만감, 구강마비(혀와 입술을 포함), 때때로 설사, 연변(똥은 변), 구갈(목마름), 복통, 구역, 구토, 미각이상
④ 간장: 때때로 ALP의 상승, 빌리루빈 상승
⑤ 순환기계: 때때로 심계항진(두근거림)
⑥ 정신신경계: 때때로 어지러움, 휘청거림, 두통
⑦ 기타: 떨림, 때때로 권태감, 중성지방의 상승
- 국내 시판후 조사결과
국내에서 재심사를 위하여 6년 동안 745명을 대상으로 실시한 시판후 사용성적조사결과 이상반응의 발현(드러냄)증례율은 인과관계 여부와 상관없이 1.9%(14례/745례)로 보고되었고, 이 중 이 약과 인과관계가 있는 것으로 조사된 것은 1.3%(10례/745례)이다. 이상반응은 인과관계 여부와 상관없이 복통, 설사 각 4례, 뉘은 변 3례, 오심(구역) 2례, 복부팽만, 소화불량, 유증과생산, 권태, 발진 각 1례로 나타났다. 이 중 시판전 임상시험에서 나타나지 않았던 새로운 이상반응으로

소화불량, 유증과생산이 각 1례씩 보고되었다.

- 4) 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989-2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로서 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.
 - 졸림
3. 일반적 주의
일정기간(보통 2주) 투여하여도 소화관 증상의 개선이 보이지 않을 경우 장기간 투여하지 않는다.
4. 상호작용
본제의 소화관운동촉진작용은 콜린작용성 신경과의 관련성으로 인해 항콜린제(황산아트로핀, 브롬화부틸스코폴라민 등)와 병용(함께 복용(사용))투여시 이 약의 작용이 감소될 수 있으므로 복용 간격을 두는 등 병용(함께 복용(사용))에 주의해야 한다.
5. 임부 및 수유부에 대한 투여
1) 임부 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 치료의 유익성이 위험성을 상회(웃돌)한다고 판단되는 경우에만 투여한다(임신중의 투여에 관한 안전성이 확립되어 있지 않다.).
2) 수유중에는 투여를 피하고, 부득이한 경우에는 수유를 중단한다(실험동물에서 모유중으로의 이행이 보고되어 있다.).
6. 소아에 대한 투여
소아 등에 대한 안전성이 확립되어 있지 않다(사용경험이 없다.).
7. 고령자(노인)에 대한 투여
일반적으로 고령자(노인)에서는 신기능, 간기능 등의 생리기능이 저하되어 있으므로 환자의 상태를 관찰하면서 신중히 투여하고 이상반응이 발현(드러냄)된 경우에는 감량(예, 1일 7.5mg)하는 등 적절한 처치를 한다.
8. 보관 및 취급상의 주의사항
1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것
2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 이를 주의할 것
9. 기타
설치류에 임상통상용량의 100~300배(30~100mg/kg/일)을 장기간 경구투여한 시험(랫트 104주, 마우스 92주간)에 있어 종창(부기)(간세포선종 및 갑상선여포성 종창(부기)) 발생률의 상승이 나타났다.

【포장단위】 30정, 300정

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【사용기간】 제조일로부터 36개월

※ 사용기한은 제품 포장에 표시된 6자리 숫자『○○.△△.□□』로 표기되어 있으며 ○○년 △△월 □□일 까지 복용가능한 의약품입니다.

- * 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- * 이 첨부문서 개정일자 이후 변경된 내용은 당사 홈페이지(<http://www.youngilpharm.co.kr>)나 영일제약(주) 소비자상담실(02-522-7005)에서 확인할 수 있습니다.
- * 의약품의 용어 설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하세요.
- * 첨부문서에 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우 의사나 약사 또는 식품의약품안전처(이 지드릭→보고마당→안전성정보→의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.
- * 제조판매원: 영일제약(주) - 충북 진천군 진천읍 문화12길 6-1
- * 이상반응보고: 한국의약품안전관리원(1644-6223)
- ☞ 의품을 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여 주시기 바랍니다.

개정년월일: 2017년 09월 05일



영일제약(주)
www.youngilpharm.co.kr