

【원료약품의 분량】 1정(550mg)중

아세트아미노펜(KP).....450mg

DL-메티오닌(KP).....45mg

첨가제(타르색소) : 황색4호(KPTaCS)

【성 상】 미황색의 정방형 정제

【효능 및 효과】 두통, 치통, 발치후 통증, 인후통, 귀의 통증, 관절통, 신경통, 요통, 근육통, 건통, 타박상, 골절통, 월경통(생리통), 외상통의 진통, 오한, 발열시의 해열

【용법·용량】 성인 1회 1~2정, 1일 3~4회까지 공복시를 피하여 복용한다.

복용간격은 4시간 이상으로 한다. 분할선이 있는 경우 - 어린이 1회 : 7~14세 1/2정

【저장방법 및 사용기간】 차광기밀용기, 실온보관, 사용기간 36개월

【사용상의 주의사항】

1. 다음 사람은 복용전에 의사, 약사와 상의할 것 1) 본인양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염, 편두통, 음식물 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람 2) 지금까지 약에 의해 알레르기증상 (예: 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람 3) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영·유아 및 어린이 (14세 이하) 4) 간장, 신장, 간상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람 5) 고령자 6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부 7) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것. 이 약은 황색4호(타르트라진)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
3. 복용할 때 다음 사항을 주의할 것 1) 용법 용량을 잘 지킬 것 2) 다음 약들과는 동시에 복용하지 말 것 - 다른 해열진통제, 감기약, 진정약 등 3) 메치오닌과 레보도파의 병용투여시 레보도파의 효과를 억제할 수 있으므로 의사, 약사와 상의할 것 4) 어린이에게 복용시킬 경우는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것 5) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담할 것 - 이 약의 복용 후 곧바로 두드러기, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백해지고, 수축이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우 - 고열을 수반하며 발진, 발적, 화상모양 수포 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우 - 천식이 나타난 경우 6) 바르비탈계 약물, 심한게 항우울제 및 알코올을

을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있다.

4. 다음 사람은 복용하지 말 것. 1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면, 발진, 발적, 가려움, 부종(후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람 2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람

5. 복용중 또는 복용 후에는 다음 사항을 주의할 것

1) 복용하는 동안 발진, 발적, 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 현기증 등이 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것 2) 수회 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의할 것 3) 장기 연용하지 말 것

6. 보관 및 취급상의 주의 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관할 것 3) 오용을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것

7. 경고 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.

- * 본 제품은 "우수의약품 제조관리기준(GMP)"에 따라 제조 및 품질관리를 마친 의약품입니다.
- * 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품은 구입한 경로를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 본 제품은 소비자피해보상규정(정정제보고시)에 의해, 정당한 소비자 피해에 대해 보상해 드립니다.
- * 본 제품에 대한 문의사항은 당사 소비자 상담실 ☎031-319-1990으로 문의하십시오.
- * 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상담하십시오.



판매원

광동제약(주)



제조원

동인당제약주식회사

소재지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 12-1 동인당빌딩 10층
www.kdpharm.com



8 806641 012134

분류번호

01140

의약품안전용기 포장

일반의약품



Human Healthcare Group
KWANGDONG PHARM.

DL-Methionin 함유
진통·해열
이타펜 (정)

두통, 치통, 인후통, 근육통, 신경통, 관절통



광동제약(주)

10정