

복합 항생제

유로박탐 정 500밀리그램
(아목시실린수화물 · 설박탐피복실)

【원료약품 및 그 분량】 1정 중

아목시실린수화물(KP) 250.0mg(약가)
 설박탐피복실(KP) 250.0mg(약가)
 첨가제(부형제) : 셀락토오스(유당·소의 우유)

【성 상】 흰색 타원형 필름코팅 정제

【약리작용 및 특징】

1. 복합 항생제 : 유효박탈점은 PC계 항생제인 Amoxicillin과 비가역적인 β -lactamase inhibitor Phoxyl subactam이 복합된 항생제로서 경구 투여시의 낮은 흡수율을 개선시켰습니다.
2. 우수한 항균효과 : 유효박탈점은 G(+), G(-)균 뿐만 아니라 β -lactamase 내성균주에도 효과가 우수하며, Ampicillin, subactam 복합제와 비교시에도 약 4-7배의 강력한 항균력을 나타냈습니다.
3. 낮은 이상반응 발생 : 유효박탈점은 Phoxyl subactam의 도입으로 소화기계 이상반응을 개선하여, Amoxicillin/ Clavulanic acid 복합제와 비교시 설사, 항문출을 훨씬 이하로 줄였습니다.
4. 경제성이 우수한 1차 선택 항생제 : 유효박탈점은 비용효과가 우수하여 G(+), G(-)균 뿐만 아니라 β -lactamase 내성균주로 인한 각종 감염증(호흡기계, 상부인피, 비뇨기계, 피부계, 복부 감염증)에 부담없이 1차 선택제로 사용할 수 있습니다.

【효령 · 효녀】

- 유효균증
황색포도구균, 표피포도구균, 부생포도구균, 화농성연쇄구균, 폐렴연쇄구균, 헤모필루스 인플루엔자, 대장균, 클레브시엘라속, 프로테우스 미라빌리스, 임균, 박테로이드속(박테로이드즈 프라질리스 포함), 모락셀라 카타라리스(임피피리 및 아목시실린에 내성이 있는 β 락타마제 생성균주 포함)
2. 적음증
상기도 감염증 : 중이염, 부비강염, 편도선염, 인두염, 후두염
하기도 감염증 : 기관지염, 폐렴
상하부 요로 감염증, 피부 및 상처감염증, 산부인과 감염증, 복부 감염증

【용포 · 용강】

성인 및 12세 이상의 어린이 : 1회 아목시실린, 설박탐피복실으로서 500~1000mg(역가), 1일 3회 경구투여한다.

【사용상의 주의사항】

3. 다음 환자에는 투여할 것
1) 이 약 성분 또는 페니실린계 항생물질에 과민증의 병력이 있는 환자
2) 세팔로스포린계 약물에 과민증의 병력이 있는 환자
3) 동반감염 바이리악스 질환 특히 전염단핵구증 현재(발진위험이 증가할 수 있다)
4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안된다.
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것
1) 위장관 질환(특히 활동성 대장염, 국소적인 장염 또는 항생제에 의한 대장염)의 병력이 있는 환자
2) 여러 가지 알레르기 유발 항원에 과민반응의 병력이 있는 환자
3) 본인 또는 부모, 형제자녀가 기관지천식, 발진, 두드러기 등의 알레르기증상을 일으키기 쉬운 체질을 가진 환자
4) 중증 신장장애 환자(혈장 청소능도가 계속 유지되므로 투여간격을 연장한다.)
5) 경구진상에 불량한 환자 또는 비경구영양환자, 고형사, 전신상태가 나쁜 환자(비타민 K 결핍에 의한 출혈경향이 나타날 수 있으므로 충분히 관찰한다.)
3. 이상반응
1) 소화기계: 오심, 구토, 설사, 식욕부진, 상복부증, 위장성 대장염. 이러한 증상은 특히 낭포성섬유증에 걸린 소아들에게서 빈번하게 발생한다(전체 사례 중 80%). 위막성대장염 등의 합병증 동반한 중증의 대장염이 나타날 수 있으므로 복통, 빈번한 설사가 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
2) 피부진: 담피반, Quincke 부종, 반점구진성 발진, 드물게 아나필락시스 쇼크
3) 간장애: 드물게 간질성 신염, 요폐, 배뇨곤란이 나타날 수 있다는 보고가 있으며, BUN, 크레아티닌치 상승, 급성 신부전, 간질성 신염 등의 중증의 신장장애 나타날 수 있으므로 관찰을 충분히 실시하고 이상반응이 나타나는 경우에는 투여를 중지하는 등 적절한 처치를 한다. 요에서 적혈구 및 히말린결정이 발견되기도 한다.
4) 혈액계: 빈혈, 용혈성 빈혈, 혈소판 이상, 호중구 감소, 호산구 증가, 때때로 적혈구, 백혈구, 무세포구, 무핵구 등이 이 약을 투여하는 동안 보고되었다. 이들 이상반응은 투약을 중단하면 소실되었으며, 과민반응의 일종으로 여겨진다. 트롬빈 감소, 림프구, 다핵구·호중구·혈소판 증가, 혈장알부민 및 총 단백질 감소 등 중증의 혈액장애가 나타날 수 있으므로 정기적인 검사를 실시하고 관찰을 충분히 실시한다. 만약 이상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
5) 근교대증: 빈약 투여 및 장기연용으로 인해 진균을 포함한 비감수성균(주로 슈도모나스, 칸디다)이 과민증식 할 수 있다. 발진, 발진 근교대증(구내염, 칸디다증 등)이 발생하면 이 약의 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
6) 피부: 만일, 때때로 가려움, 그 외 다른 피부 반응, 드물게 스티븐스-존슨증후군, 독성표피괴사증후군, 다형성홍반, 두드러기, 발혈피부염이 보고되어 있으므로, 관찰을 충분히 하고 이상반응이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
7) 간·담도계: 빌리루빈혈중, 간효소치의 증가, 주로 GOT 증가, AST·ALT·ALP·LDH의 상승, AST·ALT의 일시적 상승과 같은 기능이상 및 황달이 나타날 수 있으므로 정기적인 검사를 실시하고 관찰을 충분히 실시한다. 만약 이상이 나타나는 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
8) 신장계: 드물게 경련 및 투통이 나타날 수 있다는 보고가 있으며, 구라투어 시 중증신장 흥분상태, 경직, 근경련 등의 신경이성 증상이 나타날 수 있다. 항부(목부위)경직, 발열, 두통, 오심·구토 또는 의식 혼탁 등이 수반되는 무균 성수막염이 나타날 수 있으며 이와 같은 증상이 나타날 경우에는 투여를 중지하고 적절한 처치를 한다.
9) 전신 이상 및 투여부위 상태: 드물게 피로, 관대, 흥동, 부종, 요관, 안면부종, 맥관부종, 일시적 미각변화, 구강건조감 등이 나타날 수 있다.
10) 호흡기, 흉각 및 중격 이상: 드물게 코피가 나타날 수 있다.
11) 비타민 K 결핍증: 드물게 비타민 K 결핍증상(지표트롬빈혈중, 출혈 경향 등), 비타민 B군 결핍증상(설염, 식욕부진, 신경염 등), 때때로 발열이 나타날 수 있다.

① 정제 : 국내에서 6년 동안 2470명을 대상으로 실시한 시판후 사용성적조사와 결과 이상반응은 인과관계와 상관없이 3.85%(95/2470례)로 보고되었고, 이 중 이 약과 인과관계가 있는 것으로 조사된 것은 3.56%(88례/2470례)이다. 이 약과의 인과관계가 있는 것으로 조사된(또는 인과관계를 배제할 수 없는) 이상반응을 발현빈도율이 높은 순으로 다음과 같이 나타내었다.

설사가 2.15%(53레/2470레)로 가장 많았고, 구역 0.53%(13레/2470레), 복통 0.49%(12레/2470레), 소화불량증 0.28%(7레/2470레)의 순으로 나타났다. 구루와 고창이 각 0.1%로 보고되었으며, 0.1% 미만에서 팔팔죽, 식육부진, 위염, 담담진, 발진, 부종, 아니필라르시양숙, 두통이 보고되었다. 이 중 시판 전 임상시험에서 확인되지 않은 새로운 이상반응으로 소화불량증 7건, 고창 3건, 소양감 2건, 팔팔죽, 위염, 두통이 각 1건씩 보고되었다.

2) 건조시험제: 국내에서 1991년 동안 649명을 대상으로 실시한 시판후 사용성적조사결과와 이상반응은 인과관계와 상관없이 16.18%(105례/649례)로 보고되었고, 이 중 이 약과 인과관계가 있는 것으로 조사된 것은 16.02%(104례/649례)이다. 이 약과의 인과관계가 있는 것으로 조사된(또는 인과관계를 배제할 수 없는) 이상반응을 발현빈도율이 높은 순으로 다음과 같이 나타내었다.

살사가 14.79%(96례/649례)로 가장 많았고, 복통 0.62%(4례/649례), 구역과 구토가 각 0.46%씩(3례/649례)의 순으로 나타났다. 식욕부진, 노닐리아증, 부종, 발진이 각 0.15%로 보고되었으며, 시판 전 임상시험에서 확인되지 않은 새로운 이상반응은 보고되지 않았다.

- 1) 이 약의 사용에 있어서 내성균의 발현을 방지하기 위하여 감수성을 확인하고 치료 상 필요한 최소 기간만 투여하는 것이 바람직하다.
- 2) 세팔로스포린계, 세파마신, 그리세오폴린, 페니실린에 불내성을 나타내는 환자는 페니실린에도 불내성을 나타낼 수 있다. 페니실린에 불내성을 나타내는 환자는 다른 페니실린에도 불내성을 나타낼 수 있다.
- 3) 이 약을 포함한 페니실린계 약물을 투여 받는 환자들에게서 종종 및 때때로 치명적인(아나필락시스상) 과민증상이 보고되었다. 이 반응은 페니실린 또는(그리고) 분할 알레르기원에 과민반응을 나타낸 환자에서 발생할 가능성이 더 크다. 세팔로스포린계 약물을 투여 받을 때 중증의 과민반응을 경험한 적이 있는 환자들 중에서 페니실린 과민증상의 병력이 있는 경우가 보고되었다. 페니실린을 투여하기 전에 페니실린, 세팔로스포린계 약물 및 다른 알레르기 유발 물질에 대하여 이전에 과민반응을 보인 경우가 있었는지에 대하여 충분한 호전과 사전에 피부반응 실험을 실시하는 것이 바람직하다. 알레르기 반응이 나타난 경우에는, 약물 투여를 중단하고 적절한 처치를 한다. 비특이적 항생제로 치료받은 환자들에서 심각하거나 때때로 치명적인(아나필락시스상) 과민반응이 여러 회로 관찰되었다. 그러므로, 이러한 약물의 투여를 위해서는 이전의 병력에 대한 조사가 필수적이다. 이러한 약물에 대한 알레르기 이력이 있는 경우, 그러한 환자에게 이러한 약물의 사용은 금기시된다.
- 5) 알레르기 반응을 일으키는 경우에는 즉시 투여를 중지하고 적절한 처치를 행해야 한다. 중증의 아나필락시스 반응을 나타내는 경우에는 산소공급, 스테로이드 주사제 투여 및 심판을 포함한 기도확보와 함께 에피네프린 투여 등 즉각적인 응급처치를 행한다.
- 6) 베타락탐 항생제, 베타락타마제 저해제를 포함한 거의 모든 항생제에서 위막성 대장염이 보고되었다. 증상의 정도는 다양하나 몇몇의 환자에서는 매우 중증일 수도 있으므로 항생제 투여 후 설사를 나타내는 환자는 진단을 받아보는 것이 바람직하다.
- 7) 장기간 투여에서는 장기간에도 간가는 및 신기능 장애를 행한다. 강한 전신작용을 나타내는 다른 약물의 경우와 마찬가지로, 장기 투여할 경우 신장, 간장 및 조혈계 독사를 증가시킬 위험이 있는 이상에 대해 정기적으로 검사할 것을 권장한다. 이러한 검사는 신생아(특히 조숙아인 경우) 및 유아에게 있어서 특히 중요하다.
- 8) 분제 투여 환자에서서 전균이나 세균으로 인한 균효대사를 일으킬 수 있다. 균효대감염증(흔히 슈도모나스 칸디다균)이 나타나면 약물투여를 중지하고 적절한 치료를 취해야 한다.
- 9) 이 약을 포함한 거의 모든 항생물질들은 중증에서 중증에 이르는 범위의 위막성대장염을 일으킨다는 보고가 있다. 이 약을 포함한 항생물질 투여 환자들은 지속적으로 설사가 나타나면 환자에게 대한 진단이 중요하다. 항생물질 사용에 의해 장내세균총이 변화를 일으켜 클로스트리듐의 과잉번식을 일으킬 수 있다. 위막에 의하면 클로스트리듐 다이피셀에 의해 생성되는 독소가 항생물질관련 대장염의 주 원인으로 알려졌다. 위막성대장염으로 진단이 내려지면 치료를 시작한다. 경미한 위막성대장염은 투약중지에 의해 회복될 수 있다. 중증도 또는 중증의 경우에는 수액, 전해질, 단백질을 보충 등의 처치를 하고 클로스트리듐 다이피셀에 대해 임상적으로 효과있는 항생물질로 치료한다.
- 10) 고용량 투여 시 아목시실린 결정도를 방지하기 위해서 적절한 수분섭취와 요량을 유지해야 한다.
5. 상호작용
- 1) 메트로세아이드 : 페니실린과 병용투여시 메트로세아이드의 정소율 감소 및 혈중농도 증가로 독성을 나타낼 수 있다.
- 2) 프로베네시드와 병용투여시 프로베네시드는 페니실린의 세뇨관 배설을 감소시켜 혈중농도 증가, 배설반감기 증가를 일으키므로 독성을 나타낼 수 있다. 하지만, 페니실린과 프로베네시드는 STD전염성 성병등의 감염증 치료에 항생제의 조직 및 혈중 농도를 증가, 연장시키기 위해 동시에 투여할 수 있다.
- 3) 알로푸리놀과 병용투여 시 피부의 이상반응을 증가시킬 수 있다.
- 4) 칼슘염 에스트라디올과 에스트론 및 에스트라디올의 혈중 농도의 일시적 감소가 보고되었다. 경구 피임약과 병용투여 시 피임의 효과가 감소될 수 있으므로 에스트론 또는 에스트라디올 투여를 받고 있는 여성의 경우, 이 약을 복용하는 동안 다른 피임법 및 추가적인 피임법을 사용하도록 권고된다.
- 5) 정교한 항생물질(클로람페니콜, 에리스로마인, 설프아마이드계 약물, 테트라사이클 등)과 병용투여 시 이 약의 살균작용을 감소시킬 수 있다.
- 6) 인도메타신, 살리실레이트의 소염제와 병용투여 시 이 약의 효과를 증가시킬 수 있다.
6. 임상부에 대한 투여
- 사람에 대한 대조실험은 행해지지 않았다. 임신중 아목시실린의 투여는 태아에게 독성을 나타내지 않으나 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 여겨지는 경우에만 투여해야 한다. 설박팀은 태반을 통과한다.
7. 수유부에 대한 투여
- 아목시실린과 설박팀은 모유로 분비된다. 아직까지 유의적인 문제는 발생하지 않았으나 수유부에 페니실린의 투여는 소아의 감작, 설사, 칸디다증, 피부발진을 일으킬 수 있다.
8. 수유에 대한 투여
- 지체중종생아, 신생아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않다. 대부분의 페니실린계 소아환자에게서 쓰여지고 있으나 아직까지 특별한 이상은 보고되지 않았다. 신생아 및 6개월 이하의 소아의 경우 신장기능이 완전히 않으므로 페니실린의 신장배설이 지연될 수 있다. 1세 미만의 소아는 1세 이상의 소아와 비교하여 점막의 건조 사색, 감작위험, 설사·붉은 및 발진현상이 높으므로 신중하게 투여한다.

고령자에 대한 투여
고령자의 경우에는 일반적으로 생리기능이 저하되어 있어 많은 이상반응이 발현하기 쉽고, 고령자에서 비타민 K 결핍으로 출혈경향이 나타날 수 있다는 점에 주의하여 용량 및 투여간격에 주의하는 등 환자의 상태를 관찰하고 신중히 투여한다.

- 1) 임상검사치에 대한 영향
- 2) 테스데이프반응을 제외한 베네딕트 시약, 펄링시약, 클리니티스트에 의한 요당검사에서 위양성이 나타날 수 있으므로 주의한다.
- 3) 임부에게 임피실린을 투여하고 난 후, 총 결합 에스트론, 에스트리올-글루쿠로나이드, 결합 에스트론 및 에스트라디올의 혈장 농도가 일시적으로 감소되는 것이 관찰되었다. 이러한 작용은 이 약에 의해 감소도 나타날 수 있다.
- 4) 다른 배아독립계 발생물과 마찬가지로 콤비네이션스 양성을 나타낼 수 있다.

1. 과량 투여시의 처리
- 1) 인체에 대한 이 약물 투여에 의한 급성 독성에 관한 자료는 매우 적다. 이 약물을 과량 복용한 경우에는 주로 이 약과 관련하여 보고되어 있는 이상반응에서 확대된 증상들이 나타날 것으로 예상된다.
- 2) 뇌척수액에서의 베타타르타르 황성물질의 농도가 높을 경우 발작과 같은 신경계 독성이 나타날 수 있다는 사실을 염두에 두어야 한다. 이 약물은 모두 혈액투석에 의해 전신 순환계로부터 제거되므로, 신기는 장에 환자에서 과량 투여된 경우 체내에서 이 약물을 제거해 내는 것을 혈액투석으로 촉진시킬 수 있다.
12. 작용상의 주의
- 1) 배합기기 : In vitro 상에서 아미노페니실린계 약물에 의해 이미노글리코사이드계 약물(황산디베크카신, 황산아르베크카신 등)이 불활성 화합물으로 동일 용기에 혼합하지 않도록 하고, 역가가 떨어진다든 보고가 있으므로 병용 투여 시에는 투여부위를 변화시키고 1시간 이상 투여간격을 두고 투여하는 등 투여방법에 주의한다.

【저장방법】 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 30, 300정

- ※ 유효기간이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 약국 개설자 및 의약품 판매업자에 한하여 교환하거나 드립니다.
- 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 유효기간이 경과되었거나 변질·변패·오염되었거나 손상된 의약품은 구입하신 약국을 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 대표전화 : 02-2672-1122 ※ 제품문의 : 080-655-1414 ※ 홈페이지 : www.guju.co.kr
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 온라인의약품도서관(<http://drug.mtds.go.kr>)→의약품 검색을 참조하시기 바랍니다.
- ※ 제조자 : 보령제약(주) 경기도 안산시 단원구 봉안로 107, 109
- ※ 제조외지자 : 구주제약(주) 경기도 화성시 정남면 덕철제길 5

설명서 문안 최종 개정연월일 : 2016. 1. 19