



시력개선 및 눈의 영양공급

웰시^{연질캡슐}

비타민 A 및 D제

■ 성분·함량 : 1캡슐 중

레티놀팔미테이트유(KP) (비타민 A로서 2000 I.U).....	2,00mg
사유 (생규).....	296,70mg
동글로로필(별규).....	0,30mg
에르고칼시페롤과립 (별규) (비타민 D로서 200 I.U).....	0,235mg

첨가제(타르색소) : 황색5호, 황색203호, 청색1호

※ 사유 : Boie에 속하는 Ancistrodon rhodostoma 또는 Ancistrodon bimiffer 및 근연동물의 장관막내 지방층에서 유래된 사유를 사용한다.

■ 성상 : 녹색의 내용물을 함유한 녹색의 타원형 연질캡슐

■ 효능·효과

1. 다음 증상의 완화 : 눈의 건조감 2. 치골의 발육불량 3. 아맹증(밤에 잘 못 보는 증상) 4. 구루병 예방
5. 다음 경우의 비타민 A, D의 보급 : 임신수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후) 체력저하 때, 발육기, 노년기

■ 용법·용량

15세 이상 성인 : 1일 1회, 2캡슐

7세 이상~15세 미만 : 1일 1회 1캡슐씩 복용하십시오.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고

임부에 비타민 A(레티놀)를 1일 5,000 I.U 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신할 가능성이 있는 부인에는 비타민 A를 5,000 I.U/일 이상 복용하지 마십시오. (비타민 A 결핍증 환자는 제외)

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 마십시오.

- 1) 복용 후 다음과 같은 증상이 나타날 경우 : 피부(가려움), 소화기(오심(구역), 구토)
- 2) 1개월 정도 복용하여도 증상이 개선되지 않을 경우
- 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 다음 환자에는 신중히 투여하십시오.

- 1) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
- 2) 이 약은 황색 5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여하십시오.

4. 다음 사람은 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 사람
- 2) 임신 3개월 이내 또는 임신을 원하는 여성(임신 전 3개월부터 임신 3개월 사이에 비타민 A를 1일 10,000 I.U 이상 섭취한 임부에서 태어난 아이에 선천성 이상 비율이 증가한다는 보고가 있습니다.)

5. 다음과 같은 증상이 계속 또는 증강되는 경우에는 복용(사용)을 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오 : 설사

6. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
- 2) 소아에 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 복용시키십시오.
- 3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절하십시오. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관하십시오.
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 피하고 품질을 보호, 유지하기 위해 다른 용기에 넣지 마십시오.

■ 사용기간 : 제조일로부터 36개월

■ 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

■ 포장단위 : 자사포장단위

■ 제조의뢰자 : (주)테라젠이텍스(경기도 안산시 단원구 산단로68번길 58 (초지동))

■ 제조자 : 동방에프티엘(주) (경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 78)

판매자 : **광동제약(주)**
경기도 평택시 산단로 114
www.ekdp.com

※ 의약품은 사용하기 전에 첨부문서(설명서)를 주의깊게 읽어야 하며, 이 첨부문서(설명서)를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 의약품은 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하시고, 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.

※ 본 의약품은 우수의약품 제조관리기준(KGMP)적격업체에서 제조하여 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다.

※ 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품은 공정거래위원회고시(소비자 분쟁해결기준)에 의거, 구입한 약국 및 의약품 판매업자를 통해 교환 받을 수 있습니다.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의약품서관(<http://drug.mfds.go.kr>)의 의약품 정보를 참조하세요.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국의약품안전관리원(의약품유해사례보고)에 알려주시기 바랍니다.

※ 이 첨부문서의 개정일 이후 변경된 내용은 02(3463-7111)이나 www.etexpharm.com에서 확인할 수 있습니다.

개정일 : 2015. 03. 27

WSS01-150327-04