



아로민

필름코팅정

ILDONG

일반의약품	분류번호	313(비타민 B제)(비타민B을 제외)
-------	------	-----------------------

아로민필름코팅정은 종래의 비타민에 비해 여러가지 특성을 갖는 무취·지속형 B₆인 피리독살포스페이트수화물, 활성비타민 B₁₂인 히드록소코발라민을 배합한 종합활성비타민제입니다. 활성비타민은 장에서 파괴되지 않고 흡수가 양호하여 혈중농도가 높으며 신경조직에 침투가 잘 되고 지속적으로 작용할 뿐 아니라 보효소형으로 전환이 잘 되어 생체내 이용율이 높은 비타민입니다.

원료약품의 분량 (1정중)

푸르셀티아민염산염 (KP).....	54.57mg
(활성비타민 B ₁ , 푸르셀티아민으로서 50.0mg)	
피리독살포스페이트수화물(KP).....	30.0mg
(활성비타민 B ₆)	
히드록소코발라민아세트산염 (KP)	0.261mg
(활성비타민 B ₁₂ , 히드록소코발라민으로서 0.25mg)	
리보플라빈 (KP) (비타민 B ₂)	5.0mg
첨가제 (타르색소) : 황색203호, 황색5호	

성상

이 약은 노란색의 타원형 필름코팅정입니다.

ARO-M

효능·효과

○다음 경우의 비타민 B₁, B₂, B₆ 의 보급 :

- 육체피로
- 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
 - 비타민B₁: 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 각기, 눈의 피로
 - 비타민B₂, B₆: 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

용법·용량

성인: 1회 2정을 1일 1회 또는 1회 1정씩 1일 2회 복용합니다.

사용상의 주의사항

복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 복용하십시오.

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.

- 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 만 3개월 미만의 젖먹이

ILDONG

- 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.
2. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 이 약은 황색5호(선셋옐로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에게는 신중히 투여합니다.
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의합니다. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지합니다.
 - 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우
: 구역, 구토, 묽은 변, 설사, 구내염(입안염), 식욕부진, 복부(배부분)팽만감
 - 2) 파리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
 - 3) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B12를 1일 10 μ g이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
 - 4) 우발적으로 과량복용 한 경우
 - 5) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우
4. 기타 이 약의 복용 시 주의사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지키십시오.
 - 2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있습니다.
5. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관합니다.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관합니다.
 - 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

저장방법 : 밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

포장단위 : 300정

- 이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- 이 설명서는 2014년 12월 1일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 홈페이지(www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

일동제약주식회사

본사: 서울특별시 서초구 바우길27길2 (전화) 02-526-3114
 공장: 경기도 안성시 공단1로 25
 소비자상담실: (전화) 080-022-1010 (수신자부담)

※5030013-1141201

ILDONG