




일반의약품
분류번호: 218

노콜레스 연질캡슐

Nocholess Soft Caps.



500캡슐

조아제약(주) KOSDAQ
CHO-A PHARM. CO., LTD. 코스닥상장법인

[원료약품 및 그 분량] 1캡슐 중
홍화유(USP).....333.33 mg
(리놀산으로서 250 mg)
토코페롤아세테이트(KP).....6.67 mg
피리독신염산염(KP).....0.67 mg
첨가제(타르색소): 청색 1호, 황색 5호, 황색 203호

[효능 및 효과] 비만증, 당뇨병 · 본태성 고콜레스테롤혈증에 의한 지질대사 개선

[용법 및 용량] 1일 3회, 1회 3캡슐을 식전 30분 전에 복용한다.

[성상] 미황색(연노랑)의 내용물이 든 일면 연녹색 일면 녹색의 타원형 연질캡슐

[사용상의 주의사항] 1. 다음 환자에는 투여하지 말 것 1) 구성 성분에 과민증 환자 2) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자 3) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자 2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 환자 3) 파킨슨병 치료제인 "레보도파"성분의 의약품을 이 약과 함께 복용하는 경우에는 피리독신에 의하여 말초에서 레보도파의 탈탄산화를 촉진시켜 레보도파 작용이 감약감소하여 복용될 수 있으므로 이 약과 함께 사용시 신중히 투여한다. 4) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 체장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자 5) 이 약은 황색 5호(섀넬로우 FCF, Sunset Yellow FCF)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다. 3. 부작용 1) 소화기계: 위부불쾌감, 설사, 변비 등이 나타날 수 있다. 2) 피부: 발진, 발적(충혈되어 붉어짐)이 나타날 수 있다. 3) 이 약의 투여에 의해 생리가 예정보다 빨라지거나, 양이 점점 많아질 수 있다. 출혈이 오래 지속될 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다. 4) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임약을 투여하는 여성 또는 혈전(혈관 막힘)성 소인이 있는 환자에게 이 약에 함유된 비타민 E를

투여할 경우에는 의사 또는 약사와 상의한다. 5) 이 약에 함유된 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상(neuropathy: 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다. 4. 일반적 주의 1) 정해진 용법 · 용량을 지킬 것 2) 1개월 정도 투여하여도 증상의 개선이 없을 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것 3) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장 지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다. 5. 보관 및 취급상의 주의 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것 2) 직사일광(햇빛)선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전하여(뚜껑을 꼭 닫아) 보관할 것 3) 오용(잘못 사용)을 피하고 품질을 보호 · 유지하기 위해 다른 용기와 교체하지 말 것

[저장 방법] 기밀용기, 실온(1~30 ℃) 보관

[수신자부담고객상담실] 080-988-8889

[제조회사] 조아제약(주)

본사: 서울특별시 영등포구 당산로2길 12
공장: 경상남도 함안군 함안면 광정로 318

[제조사] (주)알피코프

공장: 경기도 화성시 향남읍 제약공단4길 35-7
※ 기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오 ※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국에서 교환하여 드립니다.

Rev.3

제조번호:

사용기한:



8 806446 001210