

살포시®

(병용통상신건조엑스)

조아제약(주)



살포시®
(병용통상신건조엑스)
Salposi tab.

일반의약품 | 분류번호:219

【원료약품 및 그 분량】 1정 중
 병용통상신건조엑스(4.64 → 1)병규) 237.5 mg
 첨가제(타르소엑스) : 황색 203호 알루미노레이크

【효능 및 효과】
 배에 피하(피부하)지방이 많고 변비가 있는 환자의 다음
 증상 : 고혈압의 동반증상(두근거림, 어지러움, 흉조), 비만,
 부기, 변비

【용법 및 용량】
 보통 성인 1회 4정을 1일 3회 식전 또는 식간(식사때와 식사
 때 사이에 복용한다.

【성 상】 연두색의 원형 필름코팅정

【포장단위】 500정

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30 °C)보관

【사용상의 주의사항】
 1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성이 약에
 함유되어 있는 대황의 자궁수축작용 또는 골반내 장기의
 충혈작용에 의해 유·조산(조기분만)의 위험이 있
 다.)
 2) 수유부(이 약에 함유되어 있는 대황 중 인트라케린은 유
 도제는 모유중으로 이행되어 영아(젖먹이)에게 설사를

유발할 수 있으므로 수유중에는 약물복용을 금하거나
 수유를 중단한다.)
 3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스
 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분
 해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도
 당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose mal-
 absorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는
 투여하면 안된다.
 2. 이 약을 복용하고 있는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.
 - 다른 설사약
 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 한의사,
 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
 1) 고혈압 환자
 2) 심장제 또는 신장제(신장장애) 환자
 3) 부종(부기) 환자
 4) 저혈당(노인(일반적으로 고령자(노인)는 생리기능이
 저하되어 있으므로 감광(減量)하는 등 주의할 것.)
 5) 의사의 치료를 받고 있는 환자(다른 약물을 투여 받고
 있는 환자)
 6) 설사, 붉은 변의 증상이 있는 환자(증상이 악화될 수
 있다.)
 7) 위장이 허약한 환자(식욕부진, 위부불쾌감, 붉은 변, 복
 통(배아픔), 구역, 구토, 설사 등이 나타날 수 있다.)
 8) 식욕부진, 구역, 구토의 증상이 있는 환자(증상이 악화
 될 수 있다.)
 9) 병후의 쇠약기, 현저하게 체력이 쇠약해진 환자(이상
 반응이 쉽게 나타나고 그 증상이 악화될 수 있다.)
 10) 땀이 많이 나는 환자(땀과, 전신저혈압 등이 나타

날 수 있다.)
 11) 협심증, 심근경색 등의 순환기계 장애가 있는 환자 또
 는 그 병력이 있는 환자
 12) 배뇨(소변을 볼)장애 환자(질한 및 증상이 악화될 수
 있다.)
 13) 감광(減量)가능성 있는 환자(질한 및 증상이 악화될 수
 있다.)
 14) 지금까지 이 약에 의한 발진, 발적(충혈되어 붉어짐),
 가려움 등을 일으킨 적이 있는 환자
 15) 당뇨병 환자(마일(에테르린 류)에 의해 글리코겐의 분
 해가 촉진되어 혈당이 상승할 수 있다.)
 4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉시 중지하고 의사, 한
 의사, 치과의사, 약사, 한약사와 상의할 것. 상담시 가능
 한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
 (1) 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나, 얼굴과 손발
 이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈
 압이 높아지거나, 두통 등(1일 최대 배합량이 감소
 해서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할
 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨배설의 저하(구
 연, 발진), 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론
 증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈장칼륨치의 측정)
 을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지
 할 것.)
 (2) 근병증(근육병증) : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증
 (근육병증)이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히
 하고 무력감, 사(팔다리)경련, 마비 등의 이상이
 확인되는 경우 복용을 중지할 것.
 (3) 소화기계 : 식욕부진, 위부불쾌감, 구역, 구토, 복통
 (배아픔), 설사 등
 (4) 피부 : 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움 등이
 나타나는 경우
 (5) 자율신경계 : 불면, 땀 과다, 빠른맥, 소변을 자주
 볼, 두근거림, 전신무력감, 정신혼란 등
 (6) 비뇨기계 : 배뇨(소변을 볼)장애
 (7) 간기능장애, 황달 : AST, ALT, ALP, γ-GTP 등
 의 상승을 동반한 간기능장애(전신의 불쾌감, 황달
 (피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띠게 될))가 나타
 날 수 있으므로 관찰을 충분히 하고, 이상이 확인
 되는 경우 복용을 중지할 것.
 2) 1개월간 계속하여 복용하는 경우 1주)정도 복용하여도 증상
 이 개선이 없을 경우
 5. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 1) 장기간 계속하여 복용하지 않는 것이 원칙이나 부득이
 장기간 계속하여 복용할 경우에는 의사, 한의사, 치과
 의사, 약사, 한약사와 상의할 것.
 2) 자극성 완하제는 장기간 계속 복용시 약물에 대한 내
 성이 증가하고, 변비가 악화될 수 있으므로 1주 이상
 계속 복용해서는 안된다. 만약 매일 변비약이 필요한
 상태라면 원인을 조사하여야 한다.
 3) 정제된 용법 · 용량을 잘 지킬 것. 대황의 사하작용은
 개인차가 있으므로 용법 · 용량에 주의할 것.
 4) 다른 한약제제 등과 병용(함께 복용) 투여할 경우 함유

생약의 중독에 주의해야 한다. 대황 함유제제와 병용
 (함께 복용)투여 시 특히 주의할 것.
 5) 마황 또는 에페드린 함유제제, MAO 억제제, 감광신제
 제(티록신, 리오치온), 카테콜아민제제(에피네프린,
 이소프레날린), 코산틴제제(테오필린, 디프로필린)과
 병용(함께 복용)시 불면, 땀 과다, 빠른맥, 소변을 자주
 볼, 두근거림, 전신무력감, 정신혼란 등의 증상이 나타
 나기 쉬우므로 감광(減量)하는 등 신중히 복용할 것.
 6) 칼륨함유제제, 칼슘함유제제, 글리시리산산 또는 그 염
 류함유제제, 루르게 이노제(무로세미드, 에타크린산)
 또는 티아지드계 이노제(트루클로메타이드)와 병
 용(함께 복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로
 인하여 근병증(근육병증)이 나타나기 쉬우므로 신중히
 복용할 것.
 6. 저장상의 주의사항
 1) 직사광선을 피하고 되도록 습기가 적은 서늘한 곳에 보
 관할 것(사용 후 반드시 밀폐 보관할 것).
 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 3) 약박을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는
 것은 약박 오용(잘못 사용)에 의한 사고발생이나 의
 약품 품질 저 하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용
 기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.
【수신자부담고객상달시】 080-988-8889
【제조회사】 조아제약(주)
 경상남도 함안군 함안면 광릉로 318
 http://www.choa.co.kr
【제조자】 우리들제약(주)
 경기도 화성시 남양읍 제약공단2길 50
 ※ 기타 상세한 것은 의사 또는 약사의 지시에 따르십시오.
 ※ 본 의약품은 엄격한 품질관리를 위한 제품입니다. 만약 구
 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변색, 오손된 제
 품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.
 ※ 본 표시사항의 내용은 최신정보 및 허가사항의 변경에 따
 라 계속 수정되고 있으므로 사용전에 주의감에 유의주시
 고, 의약품과 함께 보관하여 주십시오.
 ※ 의약품이 어린이의 손에 닿지 않게 보관하여야 합니다.
 ※ 약박을 올바르게 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인의
 약도서(www.drug.mfds.go.kr)를 참조하십시오.
 ※ 표시되지 않은 부작용이 나타날 경우 의사나 약사 또는
 식약처의약품안전처에 전달하십시오.
 문인작성일 : 2015. 05. 28 (Rev.7)