

일반의약품

분류번호:319

피로회복·영양보급·눈의피로·체력보강·자율신경강화제

테스톤지 플러스 연질캡슐

TESTON-G Plus Soft Cap.

인체는 일반적으로 청년기를 거쳐 중년기로 접어들면서 개인 간의 차이는 다소 있으나 나이가 들어감에 따라 외부적인 자극요인으로 인하여 특별한 병인이 없어도 신체적 불균형이 나타나기 시작합니다. 이와 같은 증상의 예방과 치료에는 비타민群을 충분히 공급하고 간뇌의 기능을 강화시키는 강간(强肝)제를 동시에 복용하는 것이 가장 이상적이라 할 수 있습니다.

테스톤지플러스연질캡슐은 각종 비타민과 간기능항진제와 간뇌강화제를 균형있게 배합하여 체내 흡수가 빠르고, 복용이 편리하게 연질캡슐로 제조된 피로회복, 영양보급, 눈의 피로, 체력보강 및 자율신경 강화제입니다.

【원료약품의 분량】 1연질캡슐 중

레티놀팔미테이트	(KP)	2,500 IU
에르고칼시페롤	(KP)	250 IU
티아민염산염	(KP)	10 mg
리보플라빈	(KP)	5 mg
피리독신염산염	(KP)	2 mg
시아노코발라민	(KP)	2 mcg
니코틴산아미드	(KP)	20 mg
판토텐산칼슘	(KP)	5 mg
폴 산	(KP)	250 mcg
토코페롤아세테이트	(KP)	5 mg
(비타민E로서 5 IU)		
아스코르브산	(KP)	75 mg
DL-메티오닌	(KP)	20 mg
이노시톨	(KP)	20 mg
γ-오리자놀	(KP)	5 mg
첨가제(보존제): 파라옥시벤조산메틸	(KP)	0.1 mg
첨가제(보존제): 파라옥시벤조산프로필	(KP)	0.01 mg
첨가제(동물유래): 젤라틴(기원동물: 소, 사용부위: 피부)		
첨가제(타르색소): 황색 203호, 적색 40호, 청색 1호		

【성 상】 황갈색 유상물질이 든 흑갈색 장방형 연질캡슐제

【효능·효과】

- 다음 경우의 비타민 A, D, E, B1, B2, B6, C 보급 :
육체피로, 임신·수유기, 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시, 발육기, 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같다. :
눈의 건조감의 완화, 야맹증(밤에 잘 못 보는 현상), 뼈·이의 발육불량, 구루병의 예방

【용법·용량】 성인 1회 1캡슐, 1일 2회 복용한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 자사포장단위

- * 본 의약품은 엄격한 품질관리를 필한 제품이며, 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 설명서개정연월 이후 변경된 내용은 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)에서 확인하실 수 있습니다.
- * 이 약을 사용하기 전에 반드시 설명서를 주의 깊게 읽으시고, 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용하지 마시고, 설명서는 항상 의약품과 함께 보관하시기 바랍니다.

설명서개정연월 : 2015년 01월

제품문의 (032) 812-8356



제조발매원

영종제약주식회사

인천광역시 남동구 학박로 333



본 의약품은 정부의 KGMP
(우수 의약품 관리기준)에
의거하여 엄격한 관리에
의해 생산된 제품입니다.

【사용상의 주의사항】

1. 경고 - 임부에 비타민A(레티놀)를 1일 권장량 5,000IU 이상 투여하는 경우에는 선천성 기형을 유발할 위험이 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민A를 5,000IU/일 이상 투여하지 않는다. (비타민A 결핍증 환자는 제외)

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.

- 1) 고칼슘혈증(hypercalcemia: 혈액중에 칼슘이 과잉으로 존재하는 상태)환자, 유육정용(sarcoidosis: 원인을 알 수 없는 전신 염증질환), 신장질환 환자
- 2) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
- 3) 만 3개월 미만의 젖먹이
- 4) 신장결석 환자
- 5) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
- 6) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자

3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것.

레보도파

4. 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.

- 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 고옥살산뇨증환자(hyperoxaluria: 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태)
 - 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아
 - ① 외국에서 임신전 3개월부터 임신초기 3개월까지 비타민A를 10,000 IU/일 이상 섭취한 여성으로부터 태어난 아이에서 두부신경통 등을 중심으로 하는 기형발현(기형발생) 증가가 추정된다는 역학조사결과가 있으므로 임신 3개월 이내 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에는 비타민A 결핍증치료에 사용하는 경우를 제외하고는 이약을 투여하지 않는다. 또한 비타민A 보급을 목적으로 이 약을 사용하는 경우는 식품 등으로부터의 섭취량에 주의하고 이 약에 의한 비타민A 투여는 5,000IU/일 미만에 머물도록 하는 등 적절한 주의를 한다.
 - ② 비타민D는 모유로 분비되어 신생아에게 고칼슘혈증을 일으킬 수 있다.
 - 4) 통풍환자 또는 신장결석이 있는 환자
 - 5) 신장결석 병력이 있는 환자
 - 6) 고지단백혈증, 당뇨병성고지질혈증 및 췌장염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자
5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
- 1) 이 약 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 구역, 구토, 가려움, 건조하고 거친 피부, 통증성 관절부종, 설사, 위부불쾌감, 변비, 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 묽은 변.
 - 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며 출혈이 오래 지속 될 수도 있다.
 - 3) 에스트로겐을 포함한 경구용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전성 소인이 있는 환자가 비타민E를 복용할 경우 혈전증의 위험이 증가될 수 있다.
 - 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
 - 5) 피리독신을 1일 500mg-2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적증상(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있다.
 - 6) 폴산이 부족한 환자에게 비타민B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있다.
 - 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애) 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액 중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
 - 8) 장기간 고용량의 비타민A(베타카로틴으로부터 전환된 것을 제외한)를 섭취는 폐경기를 지난 여성의 골다공증(뼈영양증) 위험을 높일 수 있다.
 - 9) 우발적으로 과량 복용한 경우
 - 10) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

6. 기타 이 약의 복용시 주의사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킨다.
- 2) 이 약에 함유된 비타민A는 정상적인 식이에서 충분히 공급되므로 보조요법의 용량은 1일 5,000IU 이상을 넘지 않도록 한다.
- 3) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
- 4) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사시에 영향을 줄 수 있다.
- 5) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈당지질치를 점검할 것을 권장한다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절한다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 한다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것.
- 3) 오용(잘못사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.