

일반의약품 정보

이 약을 사용하기 전 반드시 포장의 기재사항을 확인하세요

[유효성분] 1정 중

디아스타제, 프로타이제, 셀룰라제 2000 IU(KP) 30 mg(전분당화력(pH5.0) 117단위, 단백소화력(pH6.0) 210단위, 섬유소당화력(pH4.5) 0.9단위), 셀룰라제(KP) 25 mg(섬유소당화력(pH4.5) 30단위), 리파아제(KP) 6 mg(지방소화력(pH6.0) 36단위)

[효능·효과] 소화불량, 식욕감퇴(식욕부진), 과식, 제함, 소화촉진, 소화불량으로 인한 위부팽만감

[용법·용량] •만 15세 이상: 1회 2정 •만 11세 이상~만 15세 미만: 1회 1½정 •만 8세 이상~만 11세 미만: 1회 1정 •1일 3회 식후 복용

[사용상의 주의사항]

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 만 7세 이하의 어린이가 과잉민감(과민)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), 락토 유당(젖당)불내, 효소 결핍症(lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다. 2. 다음과 같은

사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 1) 본인 또는 가족이 알레르기 체질인 사람. 2) 다른 약물을 복용하고 있는 사람. 3) 이 약은 황색4호(타르트린)를 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다. 3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 중단하지 않고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상감시 이 처방문서를 소지할 것. 1) 과장된 투여에도 증상의 개선이 없을 경우. 4. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항. 1) 장폐색, 용량용 잘 지킬 것. 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독하에 투여할 것. 5. 저장상의 주의사항. 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것. 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관할 것. 3) 오용·오남용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.

[저장방법]

- 밀폐용기, 실온(1~30℃)에서 보관
- 어린이의 손에 닿지 않게 보관

[사용기한] 제품 유효연 표시일까지(연, 월, 일)

[첨가제]

- 동물유래성분: 유당수화물(소, 우유)
- 첨가제(타르트색소): 황색4호, 황색203호, 청색1호
- 기타 첨가제: 미결정셀룰로오스, 스티라아크리나트, 스타일드 녹색(119811)

소화불량·과식·제함
메디다제[®] 정

- ※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나, 변질, 변패, 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입한 약국에서 교환해 드립니다.
- ※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 의약품안전나라(<http://nedrug.mfds.go.kr>)를 참조하십시오.
- ※ 의약품 사용 후 부작용 발생 시 한국의약품안전관리원(1644-6223)에 피해구제 신청을 할 수 있습니다.

일반의약품

메디다제[®] 정
Medidase[®] Tab.



소화불량



과식



제함



조아제약



맨체스터 유니াই티드 대한민국 공식 파트너

10정

소화불량·과식·제함
메디다제[®] 정

[성상] 녹색의 장방형 필름코팅정
[제조자] 조아제약(주) <http://www.choa.co.kr>
본사: 서울특별시 영등포구 당산로2길 12
공장: 경상남도 함안군 함안면 광정로 318
[수신자부담고객상담실] 080-988-8888

정부공인
KGMP
적격업체

개정연월일: 2020. 02. 10 (Rev.7)