

두통으로 잠이 오지 않을때

졸리민정

불면증의 보조치료

본 약은 사용하기 전에 본 첨부문서를 주의깊게 읽어야 하며, 본 첨부문서를 본 약과 함께 보관하시기 바랍니다.

[원료약품 및 그 분량] 1정 중

주성분 : 아세트아미노펜 (Kp).....500.0mg

주성분 : 디펜히드라민염산염 (Kp).....25.0mg

착색제(타르색소) : 청색1호

[성 상] 청색의 장방형 필름코팅정

[효능·효과] 두통, 동통 및 불면증을 수반하는 통증, 발열의 일시적 완화

[용법·용량] 성인 및 12세 이상의 소아 : 1일 1회 2정을 취침전 복용합니다.
추천량을 초과하지 않도록 합니다.

권장 용법 용량-통상 1회 1정을 잠자기 30분 전에 복용하며, 필요할 경우 1회 2정까지 복용할 수 있습니다.

[사용상의 주의사항]

1. 경고

매일 세잔이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 합니다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있습니다.

2. 다음 사람은 복용하지 마십시오.

- 1) 지금까지 이 약에 의한 과민증상(예를 들면, 발진, 발적(충혈 되어 붉어짐), 가려움, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등))을 일으킨 적이 있는 사람
- 2) 지금까지 이 약 또는 다른 감기약, 해열진통제를 사용하여 천식이 나타난 적이 있는 사람
- 3) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당 분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency)또는 포도당-갈락토스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.

3. 이 약을 복용하는 동안 다음과 같은 행위를 하지 말 것

이 약에는 아세트아미노펜이 함유되어 있다. 다른 아세트아미노펜 제품과 함께 복용하여 일일 최대용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용해서는 안 된다.

4. 다음 사람은 복용 전에 의사 또는 약사와 상의하십시오.

- 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성 비염(코염), 편두통, 음식을 알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람
- 2) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영·유아 및 어린이(14세이하)
- 3) 간장, 신장(콩팥), 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람, 또는 고열이 있는 사람
- 4) 고령자(노인)
- 5) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 부인, 수유부

6) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람

7) 천식, 녹내장, 전립선(전립샘)비대 환자

5. 복용할 때 다음 사항을 주의하십시오.

- 1) 용법·용량을 잘 지켜주세요.
- 2) 다음 약물과는 동시에 복용하지 마십시오. 다른 해열진통제, 감기약, 진정약 등
- 3) 어린이에게 복용시 경우는 보호자의 지도 감독하에 복용시키십시오.

6. 복용 중 또는 복용 후에도 다음 사항을 주의하십시오.

- 1) 이 약의 복용에 의해 드물게 다음과 같은 증상이 나타났다고 보고되어 있으므로 이와 같은 증상이 나타난 경우에는 즉시 복용을 중지하고 의사 또는 약사와 상담하십시오.
 - ① 이 약의 복용후 곧바로 두드러기, 부종(부기)(후두, 눈꺼풀, 입술 등), 가슴답답함 등과 함께 안색(얼굴빛)이 창백해지고, 수족(손발가락)이 차가워지고, 식은땀, 숨가쁨 등이 나타나는 경우
 - ② 고열을 수반하며 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 화상모양 수포(거품) 등의 격렬한 증상이 전신피부, 입 및 눈의 점막에 나타난 경우
 - ③ 천식이 나타난 경우
- 2) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있습니다. 알코올은 아세트아미노펜 과량투여의 간독성을 증가시킬 수 있습니다.
- 3) 복용하는 동안 발진, 발적(충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 변비, 식욕부진, 현기증 등의 증상이 나타나면 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
- 4) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피하십시오.
- 5) 수회 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우는 복용을 중지하고 의사, 약사와 상의하십시오.
- 6) 장기 연용(오랫동안 계속복용)하지 마십시오.

7. 보관 및 취급상의 주의

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 장소에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못사용)을 피하고 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

※ 어린이 안전용기(Hard push foil)를 사용한 제품입니다.

개봉시, 제품 파손이 우려되므로 뒷면의 은박(foil)부분을 손톱으로 눌러(가급적 제품의 중앙 부분을 피하여) 개봉바랍니다.

[저장방법] 기밀용기, 실온보관(1 ~ 30℃)

[사용기간] 제조일로부터 36개월

[포장단위] 10정

DS-1509-03

첨부문서 최초 작성년월일 2005.05.31

첨부문서 최종 개정년월일 2015.09.10

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드리며, 공정거래위원회 고시 "품목별 소비자 분쟁 해결기준"에 의거 정당한 피해는 보상하여 드립니다.

이 첨부문서의 작성일자 이후 변경된 내용은 동성제약 홈페이지(www.dongsung-pharm.co.kr) 및 식품의약품안전처 홈페이지 온라인의약품도서관(http://drug.mfds.go.kr)의 해당 제품정보란에서 확인할 수 있습니다.

제조 및 판매원


동성제약주식회사

공정 : 충남 아산시 둔포면 관대안길 45

본사 : 서울특별시 도봉구 도봉로 683(명학동)

☎ 소비자 상담전화 : 080-001-0921

www.dongsung-pharm.co.kr