

V⁺ 고향량 콘드로이틴 + 비타민B 복합제

콘센비타

연질캡슐

일반의약품

분류번호 316

혼합비타민제(비타민 A, D 혼합제제를 제외)

콘센비타 연질캡슐은 골관절염의 통증을 개선하는 콘드로이틴, 강장작용을 하는 마늘엑스, 만성피로를 개선하는 비타민B군, 혈액순환을 개선하는 비타민E가 복합 처방되어 골관절염 개선 뿐만 아니라 시력감퇴, 피로회복 등에 효과적입니다.

원료약품의 분량 (1캡슐 중)

콘드로이틴설페이트나트륨(KP)	300.0mg
마늘엑스(100→1)(KHP)	2.0mg
토코페롤아세테이트(KP)	50.0mg
티아민질산염(KP)	30.0mg
니코틴산아미드(KP)	30.0mg
판토텐산칼슘(KP)	30.0mg
피리독신염산염(KP)	25.0mg
시아노코발라민 1000배산(시아노코발라민으로서 30μg)(KP)	30.0mg
캡슐기제(타르색소) : 적색40호, 황색203호, 청색1호	

성 상 : 이 약은 분홍색의 내용물을 함유한 적색의 장방형 연질캡슐입니다.

IDP CV

효능·효과

○ 다음 경우의 비타민 E, B₁, B₆의 보급

- 육체피로 - 임신·수유기
- 병중·병후(병을 앓는 동안이나 회복 후)의 체력저하시 - 노년기
- 이 약에 함유된 비타민 등의 효능·효과는 다음과 같습니다.
 - 비타민E : 말초혈행장애 및 갱년기시 다음 증상의 완화 : 어깨·목결림, 수족저림·수족냉증(손발이 차가움)
 - 비타민B₁ : 다음 증상의 완화 : 신경통, 근육통, 관절통(요통, 어깨결림 등), 각기, 눈의 피로
 - 비타민B₆ : 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염

용법·용량

만8세 이상 어린이 및 성인 : 1일 2회, 1회 1캡슐 씩 식후에 복용합니다.

사용상의 주의사항

(이 약을 복용하시기 전에 아래의 주의사항을 잘 읽어보신 후 복용하시기 바랍니다.)

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분에 과민반응이 있는 환자
 - 2) 만 3개월 미만의 젖먹이
 - 3) 대두유에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자
 - 4) 콩 또는 땅콩에 과민증이 있는 환자
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
레보도파
- 다음과 같은 사람(경우)은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
 - 1) 만 1세 미만의 젖먹이 2) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 3) 임부 및 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부, 미숙아, 유아

※콘센비타-1141229

4) 고지단백혈증, 당뇨병성고지혈증 및 체장(이자)염 등 지방대사 이상 환자 또는 지질성 유제를 신중히 투여해야 하는 환자

**4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
상당 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지하십시오.**

- 1) 이 약의 투여에 의하여 다음의 증상이 있을 경우 : 위부불쾌감, 설사, 변비, 발진, 발적 (충혈되어 붉어짐), 구역, 구토, 묽은 변
- 2) 이 약의 투여에 의하여 생리가 예정보다 빨라지거나 양이 점점 많아질 수 있으며, 출혈이 오래 지속될 수 있습니다.
- 3) 에스트로겐을 포함한 경구(먹는)용 피임제를 복용하는 여성 또는 혈전(혈관막힘)성 소인이 있는 환자가 비타민 E를 복용할 경우 혈전(혈관막힘)증의 위험이 증가될 수 있습니다.
- 4) 피리독신을 1일 500mg ~ 2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병적 증상 (neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적변화)이 나타날 수 있습니다.
- 5) 폴산이 부족한 환자에게 비타민 B₁₂를 1일 10μg 이상 투여할 경우 혈액학적 이상반응이 나타날 수 있습니다.
- 7) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia, 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있습니다.
- 8) 우발적으로 과량복용 한 경우 9) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없을 경우

5. 기타 이 약의 복용 시 주의사항

- 1) 정해진 용법 • 용량을 잘 지키십시오.
- 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도 • 감독하에 투여하십시오.
- 3) 복용시 의사, 한의사, 약사, 한약사와 상의하십시오.
- 4) 지방과부하로 특별한 위험이 예상되는 환자에게 이 약을 투여할 때 혈장지질치를 점검할 것을 권장합니다. 이 점검을 통해 지방의 체외배설이 불충분하다고 판단될 경우에는 이 약의 투여를 적절히 조절합니다. 환자가 다른 정주용 지질제를 동시에 투여 받고 있다면 이 약 중의 부형제로 혼재되어 있는 지질의 양을 고려하여 그 지질제의 투여량을 감소해야 합니다.

6. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에 밀폐하여 보관하십시오.
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 마십시오.

저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃) 보관

포장단위 : 90, 180캡슐

※포장을 개봉하여 복용시 가끔 제품에 포장물(알루미늄 호일지)이 같이 따라 오는 경우가 있으므로 복용시 캡슐(알약)만 복용하시기 바랍니다.

※온도가 높은 곳에 보관시 캡슐(알약)이 변형될 수 있으므로 서늘한 곳에 보관하시기 바랍니다.

※개봉한 약을 냉장고, 욕실, 주방 등 습기가 많은 곳이나 직사광선이 닿는 곳에 보관하지 마십시오.
습기, 열, 빛은 약의 효과와 안정성에 영향을 줄 수 있으니 보관에 주의바랍니다.

○ 이 제품은 공정거래 위원회 고시 소비자 분쟁해결 기준에 의거 교환 또는 보상받을 수 있습니다.

○ 이 설명서는 2014년 12월 29일자로 작성되었으며 이후로 변경된 내용은 홈페이지 (www.ildong.com)에서 확인할 수 있습니다.

제조사 : (주)서흥

충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명로 61

제조의뢰자 :

일등제약주식회사

본사 서울특별시 서초구 바우피로27길 2

공장 경기도 안성시 공단1로 25

소비자상담실:(전화) 080-022-1010(수신자부담)

※콘센타-1141229