

팜비클로[®]정 750밀리그램

[팜시클로비르]

■ 원료약품 및 그 분량 : 1정 중

팜시클로비르(별규) 750.0mg

■ 성상 : 백색의 장방형 필름코팅 정제

■ 효능·효과 : 대상포진 바이러스 감염증

■ 용법·용량

1. 대상포진 감염증의 치료

성인 : 팜시클로비르로서 1일 1회 750mg을 7일간 경구투여 합니다. 매일 같은 시간에 복용합니다. 감염 후 증상이 나타나는 즉시 치료를 시작하는 것이 바람직합니다.

2. 신장에 환자 : 신장에 환자에서는 이 약의 크레아티닌 청소율이 감소하기 때문에 용량조절에 신중을 기해야 하며 이들에 대한 용법·용량은 아래와 같습니다.

1) 대상포진 감염증의 치료

크레아티닌 청소율 (mL/min/1.73m ²)	용 량
30 ~ 59	1회 250mg씩 1일 2회
10 ~ 29	1회 250mg씩 1일 1회

2) 혈정크레아티닌만 알고 있을 경우에는 다음 계산식으로 크레아티닌 청소율을 구할 수 있습니다.

남자 : $[(\text{체중(kg)} \times (140 - \text{나이})) / (72 \times \text{혈정크레아티닌(mg/dL)})]$

여자 : $0.85 \times \text{남자에 대해 구해진 값}$

3) 혈액투석을 실시하는 신장에 환자 : 혈액투석 환자는 투석간격을 고려하여 48시간마다 투여하는 것이 바람직합니다. 4시간 동안의 혈액투석은 이 약의 혈장 농도를 약 75% 감소시키므로 투석 직후 이 약의 전체 투여용량을 투여합니다.

3. 간장애 환자 : 만성 대상성 간질환 환자의 경우에는 별도의 용량조절이 필요치 않습니다. 명백한 만성 비대대상성간질환자에 대해서는 충분한 치료경험이 없으므로, 명확한 권장용량이 설정되어 있지 않습니다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.

1) 이 약 또는 이 약의 구성성분 및 이 약의 생리활성물질인 펜시클로비르에 과민반응의 병력이 있는 환자

2. 다음 환자에게는 신중히 투여하십시오.

1) 신장애 환자

3. 이상반응

1) 임상시험에서 두통 및 구역이 보고된 바 있으나 대개 경증 내지 중등도였고, 이와 같은 증상은 위약으로 치료받은 환자에게서도 유사한 빈도로 나타났습니다.

다른 모든 이상반응은 시험 후 경험에서 추가되었습니다. 빈도는 매우 흔함 ($\geq 1/10$), 흔함 ($\geq 1/100$, $< 1/10$), 흔하지 않음 ($\geq 1/1,000$, $< 1/100$), 드물게 ($\geq 1/10,000$, $< 1/1,000$) 매우 드물게 ($< 1/10,000$), 미상 (자료로부터 추정 불가)로 표시하였습니다.

2) 혈액 및 림프계 : 드물게 혈소판감소증이 나타났습니다. 임상시험에서는 이 약 투여군에서 위약군보다 백혈구 및 호중구 감소가 더 자주 나타났습니다.

3) 전신신경계 : 매우 흔하게 두통, 흔하게 어지러움, 흔하지 않게 착란 및 졸음(특히 고령자에서 많이 나타났습니다), 드물게 환각이 나타났습니다.

4) 심장계 : 드물게 심계항진

5) 소화기계 : 흔하게 구역, 구토, 복통 및 설사가 나타났습니다.

6) 간담도계 : 흔하게 간기능 검사 이상, 드물게 황달이 나타났습니다.

7) 피부 및 피하조직 : 흔하게 피부발진 및 가려움이 나타났고, 흔하지 않게 두드러기 및 혈관부종(예, 얼굴부종, 눈꺼풀부종, 눈주위부종, 인두부종)이 나타났습니다. 중증 피부반응(예, 다형홍반, 스티븐스-존슨 증후군, 독성표피괴사증) 및 백혈구파괴성혈관염이 나타났는데 자발보고 및 문헌에서 수집된 정보이기 때문에 그 빈도는 미상입니다.

8) 신장 : 신기능을 고려하여 적절히 이 약의 용량을 감소시키지 않은 신질환 환자에서 드물게 급성신부전이 보고되었습니다.

9) 국내 시판후 조사 결과(조사종래수 : 4,304명) 나타난 이상반응은 다음과 같으며, 이 약과의 관련 여부는 확실하지 않습니다. : 상복부통, 변비, 간기능 이상, 설사, 복부팽만감, 소화불량, 안면부종, 피로, 두통, 백혈구감소증, 불면, 생리기간 단축, 배뇨곤란

4. 일반적 주의

1) 이 약은 생식기포진을 완치시킬 수 없으며, 이 약 치료가 시작된 이후라도 생식기포진의 증상이 있을 때는 성적 접촉을 피할 것을 환자에게 조언해야 합니다. 또한 전염의 가능성이 있기 때문에 이 약의 치료와 더불어 안전한 성관계를 가질 것이 권장됩니다. 재발의 첫 증상이나 증후가 보이면 바로 치료를 시작하도록 교육합니다.

2) 이 약이 운전 또는 기계조작 능력에 영향을 미친다는 증거는 없습니다. 그러나 이 약을 복용하는 동안 어지러움, 졸음, 혼동 및 기타 중추신경계 장애를 경험한 환자들은 운전이나 기계조작을 삼가해야 합니다.

3) 경미 내지 중등증의 간장애 환자는 신기능이 정상이면 특별한 용량을 조절할 필요가 없습니다. 중증의 간장애 환자를 대상으로 연구된 바가 없지만, 이러한 환자에서 팜시클로비르가 생리활성물질인 펜시클로비르로 전환되지 않아 혈장 펜시클로비르 농도가 낮아서 약효가 감소될 가능성이 있습니다.

5. 상호작용

1) 전임상시험에서 이 약은 시토크롬 P450을 유도하거나 CYP3A4를 억제할 가능성은 없는 것으로 나타났습니다.

2) 이 약에 대한 다른 약물의 영향

– 알코올류(술), 시메티딘, 티오펜린, 지도부딘, 프로메타진, 제산제(마그네슘 및 수산화알루미늄) 투여 후, 혹은 엠트리시타빈과 동시에 이 약 500mg을 단회 투여 시 생리활성물질인 펜시클로비르의 약동학에 임상적으로 유의한 변화가 나타나지 않았습니다.

– 이 약 다회투여(1회 500mg, 1일 3회) 후 다극산을 다회 투여했을 때 펜시클로비르의 약동학에 임상적으로 유의한 변화가 관찰되지 않았습니다.

- 능동적 신세뇨관 분비에 의해 주로 배출되는 약물들은(예 : 프로베네시드) 혈장 펜시클로비르 농도를 상승시킬 수 있습니다. 따라서 이 약물 1회 500mg, 1일 3회 복용하는 환자가 프로베네시드를 며칠간 연속적으로 병용할 시에는 독성이 나타나는지 모니터링해야 하고, 이 약의 용량 감소를 고려할 수 있습니다.
- 펜시클로비르는 알데히드산화효소에 의해 대사되므로, 이 효소를 유도/억제하거나 이 효소의 대사를 받는 다른 약과 상호작용을 일으킬 가능성이 있습니다. In vitro 알데히드산화효소저해제인 시메티딘 및 프로메타진과의 임상적 상호작용을 알아보는 시험에서 병용투여가 생리활성물질인 펜시클로비르 형성에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났지만, 강력한 In vitro 알데히드산화효소저해제인 라목시펜은 펜시클로비르 형성을 감소시킬 수 있는 것으로 나타났기 때문에 이 약을 라목시펜과 병용시 치료 효과를 모니터링해야 합니다.

3) 다른 약물에 대한 이 약의 영향

- 이 약 500mg 단회 또는 다회투여(1회 500mg, 1일 3회)를 디곡신과 병용했을 때 디곡신의 약동학은 변하지 않았습니다.
- 이 약 500mg 단회투여를 지도부딘 또는 엠트리스타빈과 병용했을 때 지도부딘, 지도부딘의 대사체인 지도부딘글루쿠로니드 및 엠트리스타빈의 약동학에 임상적으로 유의한 영향이 관찰되지 않았습니다.
- 이 약은 In vitro 에서 알데히드산화효소를 약하게 저해하는 것으로 나타났습니다.

6. 임부, 수유부 및 가임여성에 대한 투여

- 1) 동물실험에서 이 약 및 생리활성물질인 펜시클로비르에 의해 태자독성이나 기형발생이 나타나지는 않았습니다. 동물실험에서는 고함의 병리조직학적 변화가 관찰되었으나, 사람에서는 이 약을 1회 250 mg, 1일 2회 장기간 투여했을 때 남성의 정자수, 정자 형태, 운동능 등에 유의적인 영향을 미치지 않았습니다. 500mg/kg을 투여한 수컷 랫드에서 생식능의 감소가 관찰되었으나, 암컷 랫드의 생식능에는 의미있는 변화가 나타나지 않았습니다.
- 2) 임신 중 투여에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로, 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.
- 3) 수유부 : 랫드를 이용한 동물실험에서 이 약의 경우 투여 후 펜시클로비르가 유즙으로 이행하는 것으로 나타났으나, 사람 모유로의 이행에 대한 정보는 알려진 바 없습니다. 수유부에게는 치료상의 유익성이 위험성을 상회한다고 판단되는 경우에만 투여합니다.
- 4) 가임여성 : 가임여성에 대한 자료는 없으며 특별한 추천사항은 없습니다.

7. 소아에 대한 투여

18세 미만의 소아에 대한 안전성 및 유효성은 확립되어 있지 않으므로 투여하지 않는 것이 바람직합니다.

8. 고령자에 대한 투여

일반적으로 고령자에게서 용량 조절은 요구되지 않으나 신장장애가 있는 경우 용량 조절이 필요합니다.

9. 과량투여시의 처치

이 약을 과량투여한 경험은 제한적입니다. 과량투여 시 적절한 보조적 치료 및 대증적 치료를 실시합니다. 혈액투석을 실시 할 수 있으며, 이 약의 생리활성물질인 펜시클로비르는 4시간의 혈액투석으로 혈중농도가 75%까지 감소될 수 있습니다.

10. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 30℃ 이하의 건조소에 보관합니다.
- 2) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.
- 3) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고의 원인이 되거나 품질 유지면에서 바람직하지 않으므로 주의합니다.

11. 기타

임상적 용량의 약 50배를 투여한 암컷 랫드 고용량 투여군(600mg/kg/day)에서 유선암의 발생빈도가 증가하였습니다. 어린 랫드를 대상으로 태어난 후 4일 제부터 10주 동안 매일 펜시클로비르 0, 40, 125 또는 400mg/kg/day를 투여했을 때, 투약과 관련된 사망 또는 임상적 관찰은 없었습니다. 성숙 동물에 비해 어린 랫드에서 펜시클로비르의 독성이 증가되지는 않았습니다.

■ 저장방법 : 기밀용기, 건조보관(30℃이하)

■ 포장단위 : 정

■ 제조의뢰자 : 태준제약

본사 : 서울특별시 용산구 대사관로 31길 8

공장 : 경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 109-30

■ 제 조 자 : (주)한국비엠아이

제주특별자치도 제주시 첨단로7길 11

※ 의약품용 사용하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽어야 하며, 첨부문서를 꼭 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 구입시, 사용기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환해 드립니다.

※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

※ 의사 또는 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

※ 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품정보는 온라인 의약도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.

※ 첨부문서에 기재되지 않은 이상반응이 나타날 경우 의사나 약사 또는 한국약품안전관리원(www.drugsafe.or.kr) → 의약품유해사례보고에 알려주십시오.

※ 소비자 문의 : (주)태준제약 CS팀 (02)799-0271

※ 이 첨부문서의 작성년월일은 2008년 06월 01일이며, 개정년월일은 2014년 01월 09일 입니다. 개정년월일 이후 변경 된 내용은 태준제약 홈페이지(www.taejoon.co.kr)나 전화번호[(02)799-0271]에서 확인할 수 있습니다.

※ 작성년월일, 개정년월일은 제품의 사용기한과는 무관합니다