


염증성 관절한 치료약
후루손 플러스 점안액
(플루오로메톨론-테트라히드로졸린염산염)



전문의약품	
의 약 품	131
분류번호	안과용제

【성분·함량】 1ml 중
플루오로메톨론(USP).....1mg
테트라히드로졸린염산염(KP).....0.25mg
첨가제(보존제):벤잘코늄염화물(KP).....0.05mg
첨가제(점조제):포비트(JP)
첨가제(안정제):에데트산나트륨수화물(KP)
첨가제(등장화제):염화나트륨(KP)
첨가제(완충제):붕산(KP)
첨가제(완충제):붕사(KP)
첨가제(안정제):폴리소르베이트80(KP)
첨가제(용제):염균정제수(KP)

【성상】
무색투명한 병에 든 무색 내지 미황색의 현탁액

【효능·효과】
1. 심한 부종과 충혈이 있는 급성 비강염성 결막염·알레르기성 각막염
2. 전안부의 비강염성 염증(전포도막염, 상공막염, 공막염)
3. 사시절개술·백내장·녹내장 수술 후 염증

【용법·용량】
1회 1방울 1일 2~3회 결막낭내에 점안합니다. 성인의 경우 처음 24~48시간 동안은 1시간 마다 1방울씩 점안할 수 있습니다.

【사용상의 주의사항】
1. 다음 사람에게는 사용하지 말 것.
1) 이 약 성분에 과민증 환자
2) 임부, 수유부
3) 감염성 각막염·결막염 환자
4) 녹내장 환자
5) 건성안 환자(특히 쇼그렌 증후군 환자)
6) 각막손상 및 각막괴양, 단순포진성 바이러스 및 기타 바이러스 감염, 세균감염, 진균 감염 환자
7) 2세 이하의 영아
2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.
1) 관상동맥질환, 고혈압, 크론치화세포증 등 중증의 혈액순환장애 환자
2) 갑상선 기능항진증, 당뇨병 등 대사성 장애 환자
3) MAO억제제 또는 고혈압 유발 가능성이 있는 약물을 투여 중인 환자
4) 백내장, 단순포진 감염의 병력이 있는 환자
5) 건조성 비염 환자
6) 유·소아
3. 부작용
1) 적용직후 잠깐동안 치료에는 영향을 주지 않는 완화된 자극증상이 나타날 수 있다.
2) 장기간 사용할 때 안압상승이 유발될 수 있으므로 정기적으로 안압검사를 실시한다.
3) 장기간 사용할 때 반응성 충혈이 유발될 수 있다.
4) 안검 습진 형태의 알레르기 반응, 증상 각막염, 눈주위의 피부염이 드물게 보고되었다.
5) 부신피질호르몬제 장기투여에 따른 백내장 및 각막결손이 유발될 수 있다.

【저장방법 및 사용기간】
기밀용기, 상온(15~25℃)보관 사용기간 : 제조일로부터 36개월

【포장단위】 5ml, 6ml

※ 본 의약품은 엄격한 품질관리하에서 제조된 (KGMP) 적격업체 제품입니다. 만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 유통 과정 중 변질·변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 주의
1. 사용전에 제품설명서를 자세히 읽어보십시오.
2. 올바른 사용법을 모르거나 의문사항이 있는 경우 의사·약사와 상의하십시오.
3. 정해진 용법·용량을 준수하십시오.
4. 어린이 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
5. 점안(눈에 넣음)시 용기의 끝이 눈에 닿지 않도록 주의하십시오.
6. 뚜껑을 잘 닫아 보관하시고 치료 종료후 남은 점안액이 있을시 이후 재사용하지 않는 것이 좋습니다.
7. 사용전에 잘 흔들어서 사용하십시오

■ 소비자상담전화 (서울)02-3477-1731 (부산)051-204-3831



대우제약(주)
부산광역시 사상구 대로 153 (신정동)
http://www.daewoopharm.com

최종개정년월일: 2014. 09. 19
작성년월일: 2014. 10. 06

※ 이 첨부로서 작성일자(2014년 10월 6일)이후 변경된 내용은 http://www.daewoopharm.com나 051-204-3831(대우 제약 개발부)에서 확인할 수 있습니다.

6) 안구조직에 진균에 의한 2차 감염이 일어날 수 있다(특히 진균감염증, 단순 포진성 감염증).
7) 상처치유의 지연, 산통, 아주 드물게 건선, 안구출혈, 영양성 각막손상이 1주일간의 치료후에 나타날 수 있다.
8) 후방하 백내장, 각막의 박막화, 안구천공이 일어날 수 있다.
9) 장기간 사용할 때(특히 소아의 경우) 두통 및 불면같은 전신적 부작용을 초래할 수 있다.
4. 일반적 주의
1) 치료중에는 소프트콘택트렌즈의 착용을 피한다.
2) 장기간 사용하지 않는다.
3) 2~3일 이상 장기투여시 안압, 전신 부작용과 관련된 2차 감염 검사를 정기적으로 실시한다.
4) 지속적인 각막괴양이 있는 경우 진균감염을 의심한다.
5) 이 약은 눈의 감염증을 없애, 활성화 또는 악화시킬 수 있고 이 약에 대한 과민반응을 유발할 수 있다.
6) 점안시 일시적인 시력불선명이 생길 수 있으므로 시야가 선명해 질 때까지 운전이나 위험한 기계조작을 하지 않도록 주의한다.
5. 상호작용
이 약은 혈관 수축작용을 통해 혈압을 상승시키는 MAO저해제 또는 삼환계 항우울약과 병용 투여하지 않는다.
6. 소아에 대한 투여
유소아에 대한 안전성이 확립되어 있지 않으며 전신적 부작용이 나타날 수 있으므로 신중히 투여한다.
7. 과량투여시의 처리
국소작용으로 인한 과량투여결과는 알려진 바 없다. 테트라히드로졸린의 급성 과량투여는 산동, 청색증, 고온, 심장장애, 중추신경 기능억제 등의 증상을 유발할 수 있다. 만약 경구투여시 약용탄, 위세척, 산소를 이용한 인공호흡, 고혈압약인 펜롤라민 5mg를 생리식염수에 넣어 정맥주사하고 필요시 해열제와 항경련제를 투여한다.
8. 작용상의 주의
1) 현탁액이므로 사용전 잘 흔든다.
2) 점안용도로만 사용한다.
3) 점안시 용기의 입구가 직접 눈에 닿지 않도록 주의한다.
4) 오염을 방지하기 위해 될 수 있는 한 공동으로 사용하지 않는다.
9. 저장상의 주의사항
1) 소아의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
2) 직사광선을 피하고 되도록(습기가 적은) 서늘한 곳에(밀전하여) 보관한다.
3) 오염을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 않는다.