

일반의약품
분류번호 : 490

흉터치료제 상처/화상/수술후 켈로벡스겔

K G M P
적격업체

켈로벡스겔은 헤파린나트륨, 양파연조엑스, 알란토인을 주성분으로 하는 흉터전문치료제입니다. 헤파린 나트륨은 단단해진 흉터의 피부조직(콜라겐구조)을 부드럽고 느슨하게 하는 작용을 가지며, 양파연조엑스는 흉터가 비정상적으로 성장하는 것을 억제하는 역할을 합니다. 또한, 알란토인은 흉터의 각질층을 녹여내어 흉터의 크기를 감소시킬 뿐만 아니라 보습 및 진정작용으로 자극없이 흉터조직을 정상화시킵니다. 켈로벡스겔은 이러한 세 가지 성분의 상승작용(synergic effect)으로 보기 흉한 흉터가 정상피부로 회복되는데 도움을 줍니다.

♣ 흉터란

정도의 차이는 있으나 화상이나 수술후, 교통사고 등으로 찢어져서 껴맨 경우 피부에 남게되는 피부조직의 손상을 의미합니다.

♣ 흉터의 종류

흉터는 크게 정상적인 흉터와 비정상적인 흉터로 나눌 수 있습니다.

▶ 정상적인 흉터는 면상반흔이라고도 하며 편평하게 남아 있거나 약간 꺼지면서 커지지 않는 일반적인 흉터를 말합니다.

▶ 비정상적인 흉터는 흔히 비후성 반흔(hypertrophic scar), 켈로이드(keloid)를 주로 말하며, 턱이나 가슴, 어깨부위에 잘 생깁니다. 색깔이 붉은 색을 띠고 가렵고 아프며 정상피부보다 당김이 심하여 환자들에게 불편을 줍니다.

▪ 비후성 반흔은 체질에 상관없이 누구에게나 생기며 흉터의 크기가 원래상처의 크기를 넘지 않는 경우가 대부분입니다.

▪ 반면 켈로이드는 흉터가 심하게 울퉁불퉁하게 튀어나온 것으로 외관상 비후성 반흔과 유사하지만 시간이 지남에 따라 증상이 적어지는 비후성 반흔과는 달리 켈로이드는 오히려 심해지는 것이 특징입니다. 이 켈로이드는 체질적인 켈로이드 소인을 가진 사람에게 주로 생깁니다.

따라서 흉터는 외관상·미용상·정신적으로 좋지 않은 영향을 줄 뿐 아니라 신체보호, 지각, 체온조절, 배설·분비, 흡수 등의 정상적인 피부의 기능을 하지 못하게 하여 일상생활에도 많은 불편을 유발시킵니다. 켈로벡스겔은 이러한 흉터를 예방 및 치료하기 위해 개발된 제품입니다.

【원료약품의 분량】 1g 중

헤파린나트륨(KP) 50IU
(헤파린나트륨으로서 0.4mg)
양파연조엑스(1.8→1)(별규) 100mg
(spiraeoside로서 2.0μg)
알란토인(USP) 10mg

*첨가제(보존제) : 소르빈산 1.5mg, 파라옥시벤조산프로필 1.0mg

*기원동물 및 사용부위 : 헤파린나트륨(돼지의 소장점막에서 유래)

【성상】

밝은 갈색의 수용성 불투명 겔제

【효능·효과】

수술, 절단, 화상, 사고 후의 비대성·켈로이드성, 운동제한성 또는 미용적 피부손상시의 상처 및 흉터, 외상성 경축(상처성 경련과 수축이 일어나 수축상태가 지속되는 현상), 상흔성 협착(좁아짐)

【용법·용량】

상처 부위에 충분히 침투할 때 까지 하루 수 회 가볍게 마사지 합니다. 상처가 심하거나 오래된 상흔일 경우 고정하여 하루 저녁을 지냅니다. 갓 생긴 상처의 경우, 극도의 추위, 자외선, 강한 마사지 등 신체적 자극을 피합니다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 경우에는 이 약을 사용하지 않습니다.

1) 파라옥시안식향산메칠 및 이 약의 구성성분에 과민증이 있는 환자

2) 임부

3) 절개되거나 아물지 않은 상처, 점막 피부에 진물이 나는 상처부위를 가진 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의하십시오.
수유부

3. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항

1) 장기간 사용 후 내성이 나타날 수 있으므로 주의합니다.

2) 매우 드물게 국소 피부자극이 나타날 수 있으므로 주의합니다(국내에서 647명을 대상으로 실시한 시판 후 조사 결과 가려움 7건, 과민반응 1건이 보고되었습니다).

3) 상처가 태양열이나 광선에 노출되지 않도록 주의합니다. 갓 생긴 상처의 경우 극도의 추위나 자외선 또는 강한 마사지 등 물리적 자극을 피합니다.

4) 어린이에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 사용합니다.

4. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관합니다.

2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관합니다.

【포장단위】 20그램 / 튜브×1 / 케이스

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【최종 개정연월일】 2017. 04. 01

【제조회사】 (주) 다림바이오텍 경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 107

【제 조 자】 콜마파마(주) 충청북도 제천시 바이오밸리2로 93

※본 제품은 우수약품 제조 및 품질관리기준(KGMP)에 의하여 생산된 제품입니다. 구입시 사용기한이 지났거나 유통과정 중 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환해 드립니다.

※이 첨부문서 작성일자(2017년 4월 1일)이후 변경된 내용은 홈페이지(www.dalimpharm.co.kr)에서 확인할 수 있습니다.


dalim (주)다림바이오텍
경기도 화성시 향남읍 제약공단3길 107
대표전화: 02) 335-1656
공장 및 연구소 : 031) 353-6091
소비자상담실 : 080) 333-1656(수신자부담)