

벤트락스 겔

(Bentlax Gel)

● 약리 작용

1. 복합 성분의 상승작용 : 오래된 상처, 갓생긴 상처등 어떠한 흉터에도 놀라운 치료효과를 나타내며 6개월 이내의 흉터에는 95%의 치료효과를 나타내고 결합조직의 섬유 아세포 증식차단과 콜라겐섬유 형성을 감소시킵니다.
2. 항염작용과 진정작용 : 2차 감염을 예방하며 흉터의 홍반(붉은 반점) 및 청반을 개선합니다.
3. 흉터의 크기 감소 : 갓생긴 상처에 적용시 비대성·켈로이드성, 함몰성 흉터 전이 예방 작용을 합니다.
4. 흉터의 탄력성 증대로 환자의 운동성 편이성이 증가합니다.
5. 장기간 사용시 내약성(약에 대한 내성)이 없고 흉터에 필름막을 형성하므로 드레싱 유무에 상관없이 사용 가능합니다.
6. 벤트락스겔의 주요 성분인 양파추출액은 항염 작용, 섬유아세포 과다증식 억제, 항알러지, 유사분열억제, 수렴 및 항균작용, 색소침착방지를 하며 헤파린은 콜라겐섬유 구조 이완, 상처조작을 수화, 항염, 항알러지, 섬유아세포 과다증식의 억제를 하며 알란토인은 각질용해작용, 약물투과작용, 상피(겔피부)형성, 상처치유진, 수화작용증대, 진정작용을 합니다.

● 원료약품 및 그 분량 : 1g 중

양파추출액(생규).....	100mg
(스피래오시드로서 2.0μg)	
헤파리나트륨(KP).....	50I.U
동물유래 : 헤파리나트륨(기원동물 : 돼지, 사용부위 : 장점막)	
알란토인(USP).....	10mg
보존제 : 소르브산(NF).....	1mg
보존제 : 파라옥시벤조산메틸(KP).....	1.5mg

● 성 상 : 흰색 내지 밝은 갈색의 수용성 반투명 겔제

● 효능·효과

수술, 절단, 화상, 사고 후의 비대성·켈로이드성, 운동제한성 또는 미용적 피부손상상의 상처 및 흉터, 외상(상처)성 경축(경련)과 수축이 일어나 수축상태가 지속되는 현상, 상흔성 협착(좁아짐)

● 용법·용량

상처 부위에 충분히 침투할 때까지 1일 수회(여러 차례) 가볍게 맞사지한다. 상처가 심하거나 오래된 흉터일 경우 드레싱으로 고정하여 하루 저녁을 지낸다. 갓 생긴 상처의 경우, 극도의 추위, 자외선, 강한 맛사지 등 신체적 자극을 피한다.

일반의약품
분류번호490

한국보건
KGMP
한국약품원리학회

● 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.
 - 1) 파라옥시벤조산메틸 및 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
 - 2) 임부
 - 3) 절개되거나 아물지 않은 상처, 점막 피부에 진물이 나는 상처부위를 가진 환자
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 수유부
 - 2) 이 약은 프로필렌글리콜을 함유하고 있으므로 이 성분에 과민하거나 알레르기 병력이 있는 환자에는 신중히 투여한다.
3. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항
 - 1) 장기간 사용 후 내성이 나타날 수 있으므로 주의할 것.
 - 2) 매우 드물게 국소 피부자극이 나타날 수 있으므로 주의할 것(국내에서 647명을 대상으로 실시한 시판 후 조사결과 가려움 7건, 과민반응 1건이 보고되었다.)
 - 3) 상처가 태양열이나 광선에 노출되지 않도록 주의할 것. 갓 생긴 상처의 경우 극도의 추위나 자외선 또는 강한 맛사지 등 물리적 자극을 피할 것.
 - 4) 어린이에게 사용할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 사용할 것.
4. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 의약품은 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣어 꼭 닫아 보관할 것.

● 저장방법 : 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

● 포장단위 : 10g, 15g, 30g / 튜브

* 반창고나 밴드 등으로 밀봉하여 사용하시면 더욱 좋습니다.

- ※ 본 의약품은 우수의약품 제조 및 품질관리 기준(KGMP)에 따라 엄격한 품질검사를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용(유효)기한이 지났거나 변질·변패·오염되거나 손상된 의약품일 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관해 주십시오.
- ※ 사용(유효)기한이 지난 의약품은 사용(복용)하지 마십시오.
- ※ 이 약을 사용(복용)하기 전에 첨부문서를 주의 깊게 읽고, 본 첨부문서를 이 약과 함께 보관하십시오.
- ※ 자세한 의약품 정보는 당사 홈페이지(<http://www.taiguk.co.kr>) 또는 식품의약품안전처 온라인의약품도서관(<http://drug.mfds.go.kr>)을 참조하십시오.
- ※ 부작용 보고 : 한국 의약품안전관리원(1644-6223)

첨부문서 개정 연월일 : 2017. 04. 11

제조·판매자
태극제약(주)

경기도 화성시 남양읍 제약공단3길 123
☎ 소비자상담전화 080-300-8282