

생약성분 순수소염제

마로비벤-에이주사

MAROBIVEN-A_{inj.}

KGMP 전문의약품
적격업체제품 분류번호 490

■ 원료약품의 분량 : 1앰플(2.2mL) 중

유효성분 : 아르니카틴크 D2(별규).....	2.2μL
카렌두라틴크 D2(별규).....	2.2μL
하마메리스틴크 D1(별규).....	0.22μL
밀레포리움틴크 D3(별규).....	2.2μL
벨라돈나틴크 D2(별규).....	2.2μL
아코니통틴크 D2(별규).....	1.32μL
카모밀라틴크 D3(별규).....	2.2μL
심피통틴크 D6(별규).....	2.2μL
벨리스페렌시스틴크 D2(별규).....	1.1μL
에치나세아안구스티폴린크 D2(별규).....	0.55μL
에치나세아플루르틴크 D2(별규).....	0.55μL
히페리쿰틴크 D2(별규).....	0.66μL
헤파살프리스 D3(별규).....	2.2mg(칼슘으로서 0.88μg)

기타첨가제 : 염화나트륨

용제 : 주사용수

■ 성상

무색 투명한 액체가 충전된 갈색 앰플제

■ 효능 · 효과

- 여러 기관과 조직에서 염증과 관련된 염증성 및 퇴행성 과정(건초염, 경동염, 상과염, 점액낭염, 관절주위염, 상완관절골염)
- 고관절, 무릎관절 및 작은 관절에서의 관절증
- 급성 뇌진탕
- 외상(뺨, 탈구, 타박, 골절), 혈액삼출 및 관절내 삼출
- 수술 후 및 외상 후의 유연부 부종 및 통증

■ 용법 · 용량

초기에는 1회 1앰플, 1일 3회 주사한다.
어느정도 증상이 완화되면 1회 1앰플을 1주 1~2회 2~3주간 정맥, 근육, 피하, 활액낭 주위 또는 관절 주위에 주사한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 경고

앰플주사제는 용기절단 시 유리파편이 혼입되어 부작용을 초래할 수 있으므로 사용 시 유리파편 혼입이 최소화될 수 있도록 신중하게 절단사용 하되, 특히 어린이, 노약자 사용시에는 각별히 주의한다.

2. 다음 환자에게는 투여하지 말 것

- 1) 중증의 고혈압 환자 또는 심장질환 환자
- 2) 신장에 환자
- 3) 임부 또는 수유부
- 4) 유아 및 소아
- 5) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 환자
- 6) 국화과 식물에 과민반응 환자
- 7) 결핵, 백혈병, 교원병, 다발경화증, AIDS, HIV 감염 및 다른 자가면역성질환과 같은 진행성 전신질환 환자

3. 이상반응

- 1) 과량투여 시 갈증, 어지러움, 산동, 피부조홍, 체온증가, 혈압상승, 말이 많음, 환각, 운동 항진이 올 수 있다.
- 2) 구역, 구토, 설사, 맥박이 느렸다가 차차 빨라짐, 호흡곤란, 근육의 쇠약 및 협동 기능 불능, 어지러움, 피부의 포도색 반점 등이 일어날 수 있다.
- 3) 경구복용으로 인한 급성중독 증상으로 구토, 설사, 토혈, 혈변 등 심장쇠약으로 인한 허탈과 동시 신장장애를 일으켜 사망할 수 있다.
- 4) 만성중독증으로 침출림, 구강염, 신장애, 환각증상 등이 일어난다.
- 5) 이 약 복용으로 타액 증가가 일어날 수 있으며, 이러한 경우에는 복용을 중지한다.
- 6) 환자에 따라 과민반응이 일어날 수 있다.
- 7) 에키나세아를 포함하는 제제를 복용하는 환자들에서 발적, 가려움, 드물게

얼굴 부종, 급성 호흡곤란, 어지러움 및 급성 저혈압 등이 관찰되었다.

- 8) 관절내 주사 시 드물게 관절에 일시적 자극성 통증이 일어날 수 있고 때로는 무균성 혈액 삼출이 일어날 수 있으나 이러한 증상은 소염제 치료로 쉽게 사라진다.
4. 일반적 주의
 - 1) 이물이 혼입되어 있을 때는 사용하지 않는다.
 - 2) 간혹 일시적으로 배가 거북함, 복부 팽만감 등의 위장 증상이나 흥분, 두통, 두중감의 증상이 나타나는 수가 있으며 이러한 경우에는 복용을 일시 중지한다.
 - 3) 간혹 민감한 체질을 가진 사람은 피부발진 등의 과민반응을 나타낼 수 있으므로 이러한 경우에는 복용을 중지한다.
5. 상호작용

이 약은 사이토크롬 P450 대사효소를 유도하므로 이 효소에 의해 대사되는 다음 약물의 혈중 농도를 감소시킬 수 있다. 따라서 다음 약물과의 병용은 가능하면 피하고 부득이하게 병용 시는 이상반응 발현 여부 및 아래 사항에 주의해야 한다.

 - 1) 항바이러스제 중 항레트로바이러스제 및 만성C형 간염 치료제(에파비렌즈, 네비라핀, 데라비르딘, 라미부딘, 지도부딘, 스타부딘, 아바카비르, 디다노신, 잘시타빈, 인디나비르, 사퀴나비르, 리토나비르, 넬피나비르, 암프레나비르, 소포스부비르, 레디파스비르 등)와 병용시 이러한 항바이러스약의 치료효과가 떨어지고 내성이 발현될 수 있다.
 - 2) 항응고제(아세노쿠마롤, 펜프로쿰몬, 와르파린, 다비가트란, 리바록사반, 아픽사반 등), 면역억제제(시클로스포린, 타크로리무스, 시롤리무스, 에베로리무스 등), 강심제(디기톡신, 디곡신, 메칠디곡신 등), 기관지확장제(아미노필린, 콜린테오필린, 테오필린 등), 항부정맥제(아미오다론, 퀴니딘, 디소피라미드, 프로파페논, 리도카인 등), 항전간제(페노바르비탈, 페니토인, 카르바마제핀, 프리미돈 등), 항우울제(이미프라민, 아미트립틸린, 노르트리프틸린 등), 항암제(시클로포스파미드, 타목시펜, 탁솔, 에도포시드 등), 진정수면제(미다졸람 등)와 병용 시 이러한 약들의 효과가 떨어질 수 있으므로 투여 시작 시와 종료 시 이러한 약들의 효과에 대한 신중한 모니터링 실시가 필요하다.
 - 3) 경구 또는 주사용 피임제(에티닐에스트라디올, 데소게스트렐, 노르에티스테론, 레보노르게스트렐 등) 또는 이 약물을 포함한 피임기구(이식제 포함) 등의 효능 감소 및 부정 성기출혈의 발현율이 증가할 수 있다.
 - 4) 선택적세로토닌재흡수저해제 등 항우울제(이미프라민, 아미트립틸린, 노르트리프틸린, 시탈로프람, 플루옥세틴, 플루복사민, 파록세틴, 설텔랄린, 네파조돈, 에스시탈로프람, 벤라팍신 등), 편두통 치료제(수마트립탄, 나라트립탄, 리자트립탄, 졸미트립탄 등)와 병용 시 이러한 약들의 이상반응이 증가할 수 있다.
 - 5) 지질저해제(심바스타틴과 같은 특정 HMG-CoA reductase 저해제(프라바스타틴은 제외))와 스테로이드 호르몬(경구용 또는 정맥 투여용)의 작용에 영향을 끼칠 수 있다.
 - 6) 비스테로이드성 소염진통제 및 COX-2 저해제 등의 관절염치료제, 칼슘채널 차단제 등의 혈압강화제, 경구용 혈당강화제(metformin) 또는 기타 혈당조절제, 마약성 진통제 등도 이약과 잠재적 상호작용이 발생할 수 있다.

■ 저장방법 : 밀봉용기, 차광실온(1~30℃)보관

■ 포장단위 : 50앰플

※ 의사 · 약사의 지시에 따라 사용하십시오.

※ 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질 · 변패 · 오염되었거나 손상된 의약품은 약국 등의 개설자에 한하여 교환하여 드립니다.

※ 본 첨부문서 문안 개정일자(2017년 09월 07일) 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.samjinpharm.co.kr)또는 소비자 상담실(수신자부담 전화 080-082-1234)에서 확인하실 수 있습니다.

※ 제품의 사용기한은 제품포장에 따로 표기되어 있습니다.

09017
MBA-03-08-1171

제조판매원
SAMJIN **삼진제약주식회사**
본 사 : 서울특별시 마포구 와우산로 121 (서교동)
공 장 : 경기도 화성시 향남읍 제약공단1길 52
☎ : 본사(02)3140-0700, 공장(031) 353-1712/6