

여드름, 거칠어진 피부

I-02

구바파정

【원료약품 및 그분량】 1정 (350mg) 중

리보플라빈부티레이트(KP)	10mg
피리독신염산염 97%과립 (별규)	51.55mg
아스코르브산 97%과립 (별규)	25.77mg
니코틴산아미드 (KP)	15mg
비오틴 1% (별규)	2.5mg
L-시스테인 (DAB)	15mg
의이인엑스 (13→1) (별규)	50mg
식약청인정타르색소 (KPTaCS) 적색 40호	

【성 상】 분홍색의 원형 필름코팅정

【효능 · 효과】

1. 다음 경우의 비타민 B2, B6의 보급 : 육체피로, 임신 · 수유기, 병중 · 병후 체력저하시
2. 다음 증상의 완화 : 구각염(입꼬리염), 구순염(입술염), 구내염(입안염), 설염(혀염), 습진, 피부염, 옷오름, 짓무름, 여드름, 거칠어진 피부

【용법 · 용량】 15세 이상 어린이 및 성인 : 1회 2정을 1일 1회 복용한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것 : 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해 효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수 장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 된다.
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것.
 - 1) 이 약 및 이 약에 포함된 성분과의 과민반응 환자
 - 2) 7세 미만의 어린이
3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것 : 레보도파
4. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 약사와 상의할 것.
 - 1) 의사의 치료를 받고 있는 환자
 - 2) 고수산뇨증(hyperoxaluria : 요중에 과량의 수산염이 배설되는 상태) 환자
 - 3) 임부 · 수유부
5. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.
 - 1) 발진 · 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움

- 2) 구역, 구토, 식욕부진, 위부불쾌감, 위부팽만감, 복부(배부분)팽만감
- 3) 설사가 지속되거나 심해질 경우
- 4) 장기간 고용량을 투여할 경우 내성이 생길 수 있다.
- 5) 피리독신을 1일 50mg~2g의 용량으로 장기간 복용하면 감각신경병 또는 신경병증(neuropathy : 말초신경계의 기능적 장애 또는 병적 변화)이 나타날 수 있다.
- 6) 고용량 투여에 의해 소화성 궤양을 촉진시키고 당내성(포도당 내성) 손상(glucose tolerance impairment : 신체의 포도당을 대사하는 능력 장애), 고요산혈증(hyperuricemia : 혈액중에 요산이 과잉으로 존재하는 상태), 간손상을 일으킬 수 있다.
6. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
 - 2) 어린이에게 투여할 경우에는 보호자의 지도·감독 하에 투여할 것.
 - 3) 1개월 정도 복용하여도 증상의 개선이 없거나 악화될 경우에는 의사 또는 약사와 상의할 것.
 - 4) 복용 시 의사, 한의사, 약사와 상의할 것.
 - 5) 임상검사치에 대한 영향
 - (1) 각종 요검사시에 혈당의 검출을 방해할 수 있다.
 - (2) 요를 황색으로 변하게 하여 임상검사치에 영향을 줄 수 있다.
7. 저장상의 주의사항
 - 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
 - 2) 직사광선을 피하고 될 수 있으면 습기가 적고 서늘한 곳에 밀전 (뚜껑을 꼭 닫아)하여 보관할 것.
 - 3) 오·남용을 피하고, 품질을 보호·유지하기 위해 다른 용기에 넣지 말 것.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 20T, 50T, 400T

【소비자상담실】 02-597-1020

문서개정일 : 20091023

※ 만약 구입시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지 (www.i-pharm.kr)에서 확인하실 수 있습니다.



(주)아이월드제약

인천광역시 남동구 논현동 430-1

www.i-pharm.kr



분리배출