

※ 이 문서는 본제를 사용할시에 필요한 주의사항을 기재한 것으로 본제와 같이 보관 하십시오.

K G M P
우수약품자랑업체

근이완작용·소염진통작용

일반의약품
분류번호:114

I-04

아 클 린^정

【원료약품 및 그분량】 1정(700mg)중

아세트아미노펜(USP) 300mg

클로르록사존(USP) 250mg

첨가제(타르색소) : 청색1호

【성 상】 연청색의 장방형 필름코팅정

【효능·효과】 신경통, 근육통, 관절통, 요통, 염좌통, 건통(어깨결림), 근경련(근육경련),
근경직등 근육의 이상 긴장을 수반하는 제질환

【용법·용량】 성인 : 1회 2정, 1일 4회까지 공복시를 피하여 복용한다.
연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

◎경고

※ 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열 진통제를 복용해
야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이약을 복용하면 간
손상이 유발될 수 있다.

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것

1) 클로르록사존에 과민증 환자 2) 아세트아미노펜에 과민증 환자

3) 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance),
Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스
흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는
투여하면 안 된다.

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것

1) 심한 간·신장애(신장장애) 환자 2) 알레르기 환자 또는 약물 알레르기가 있었던 환자

3. 부작용

1) 과민증 : 두드러기, 발적(충혈되어 붉어짐), 가려움증과 같은 과민증이 나타나면 투
여를 중지한다. 드물게 알레르기성 피부발진, 점상출혈(출혈점), 반상출혈
(피부에 검보라빛 얼룩점이 생기는 내부출혈), 요변색(소변색이 변함)등이
나타날 수 있다. 매우 드물게 혈관신경성 부종(부기) 또는 아나필락시속
(과민성 쇼크)이 나타날 수 있다.

2) 간 장 : 클로르록사존에 의해 간 손상이 나타날 수 있으므로 간기능 이상이 나타
나면 투여를 중지한다.

3) 소화기 : 때때로 위장장애가 나타날 수 있으며 드물게 위장출혈이 나타날 수 있다.

4) 정신신경계 : 때때로 졸음, 어지러움, 두통, 권태, 과도한 흥분이 나타날 수 있다.

4. 임부에 대한 투여

임부에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는
부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌다)한다고 판단되는 경우 투여한다.

5. 상호작용

알코올이나 중추신경억제제와 병용(함께 복용)투여시 상가작용이 나타나므로 신중히
투여한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관 【포장단위】 10정

【소비자상담실】 080-597-1020

문서개정일 : 20120216

※ 만약 구입시 사용기한이 경과 되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품이 발견될 경우에
는 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 이 첨부문서 작성(개정)일자 이후 변경된 내용은 홈페이지(www.i-pharm.kr)에서 확인
하실 수 있습니다.



(주)아이월드제약
인천광역시 남동구 함박외로 316(논현동)
www.i-pharm.kr



분리배출