

징코모아정 120mg

(은행엽건조엑스)

● 말초동맥 혈액순환

● 어지러움, 귀울림, 두통

● 기억력감퇴 ● 집중력 장애

【원료약품의 분량】 1정 중

유효성분 : 은행엽건조엑스(생규) 120 mg
(총 고콜라본배당체로서 28.8 mg)

첨가제(타르색소) : 청색1호알루미늄레이크, 황색203호알루미늄레이크

동물유래성분 : 유당수화물(기원동물-소, 사슴부위-우유)

기타첨가제 : 미결정셀룰로오스, 산하이드라트, 스테아르산마그네슘, 클로이드성산화규소, 크로스카멜로오스나트륨, 탈크, 프로필렌글리콜, 히프로멜로오스

【성상】 녹색의 원형 필름코팅정

【효능·효과】

1. 주 효능·효과

1) 말초동맥 순환장애(간혈성 파행증(이따금 절뚝거림))의 치료

2) 어지러움, 혈관성 및 퇴행성 이명(귀울림)

3) 이명(귀울림), 두통, 기억력 감퇴, 집중력 장애, 우울감, 어지러움 등의 치매성 증상을 수반하는 기질성 뇌기능 장애의 치료

【용법·용량】

1. 성인

1) 말초동맥 순환장애, 어지러움, 이명(귀울림) : 은행엽건조엑스로서 1회 40 mg, 1일 3회 또는 1회 80 mg, 1일 2회 경구투여(복용)하십시오.

2) 기질성 뇌기능 장애 : 은행엽건조엑스로서 1회 40 ~ 80 mg, 1일 3회 또는 1회 120 mg, 1일 2회 경구 투여(복용)하십시오.

2. 연령(나이), 증상에 따라 적절히 증감하십시오.

【사용상의 주의사항】

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하지 말 것

1) 이 약에 과민증 환자

2) 12세 이하의 소아(소아의 사용경험이 충분하지 않으므로 12세 이하의 소아에는 투여하지 않는다.)

3) 임부 (동물시험에서 기형발생은 없었으나 임신중의 투여에 대한 충분한 사용경험이 적다.)

4) 이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자

2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것

1) 출혈 장애가 있거나 출혈의 위험을 증가시키는 약물(항응고제(예: 펜프로쿰론, 와파린)), 항혈소판제(예:클로피도그렐, 아세틸살리실산 및 기타 비스테로이드성 항염증제)을 복용하고 있는 환자

2) 수유부(모유로 이행여부가 알려지지 않음)

3) 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중단하고 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것, 상담시 가능한 첨부문서를 소지할 것

1) 수술이 예정된 자

2) 복용 3개월 후 증상의 개선이 없거나 악화되는 경우

3) 이상반응

① 드물게 가벼운 위장관 불쾌감, 두통, 알레르기성 피부반응이 나타날 수 있다.

② 국내 자발적 이상사례 보고자료(1989-2013년)를 분석한 결과, 이상사례가 보고된 다른 의약품에서 발생한 이상사례에 비해 통계적으로 유의하게 많이 보고된 이상사례는 다음과 같이 나타났다. 다만, 이로써 곧 해당성분과 다음의 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

• 어지러움

• 가려움증

③ 기타 : 아나필락시스 또는 아나필락시스 반응 보고가 있다. 다만, 이로써 해당성분과 이상사례 간에 인과관계가 입증된 것을 의미하는 것은 아니다.

4. 기타 이약의 복용(사용)시 주의할 사항

이 약은 고혈압 치료제가 아니므로 특별한 치료를 요하는 고혈압 환자에는 투여하지 않는다.

5. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관한다.

2) 직사광선을 피하고 되도록이면 습기가 적은 서늘한 곳에 밀전하여 보관한다.

【저장방법】 기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】 100정(10정/PTP X 10)

【문의전화】 본사 : (02)2021-9300, 소비자상담실 : 080-023-1897(수신자 요금부담)

【제조자】 알리코제약(주), 충청북도 진천군 광혜면 용소2길 21

【제조외지사】 동화약품(주), 충청북도 충주시 충주산단1로 167

2201

본 의약품은 KGMP 품질관리를 필한 제품입니다. 구입시 사용기한 또는 유효기한이 경과되었거나 변질, 변태 또는 오손된 제품이 발견될 경우 공정거래위원회 고시 소비자 분쟁해결기준에 의거, 구입처를 통하여 교환 또는 환불 받을 수 있습니다.

본 의약품에 대한 자세한 허가사항은 동화약품(주) 홈페이지(www.dong-wha.co.kr) 또는 식품의약품안전처 의약품통합정보시스템(<https://nedrug.mfds.go.kr>)을 참조해주시기 바랍니다.

※ 의약품 부작용 신고·피해구제 상담 : 1644-6223 ※ 의약품 피해구제 상담 : 14-3330

※ 이 첨부문서 작성일자(2022년 01월 04일) 이후 변경된 내용은 www.dong-wha.co.kr에서 확인하실 수 있습니다.



동화약품

SINCE 1897