

레브로콜 시럽

(레보드로프로피진)

전문약품

의약품 분류번호	222 진해거담제
-------------	--------------

레브로콜시럽은 레보드로프로피진을 주성분으로 하는 말초작용성 진해제로 기침완화의 목적으로 사용되는 제제입니다. 레브로콜시럽은 기존의 중추작용성 진해제와 달리 CNS 부작용이 적으며, 진해효과가 우수하여 마약성 진해제와 동등이상의 효과를 나타냅니다.

【원료약품의 분량】100mL 중

레보드로프로피진(EP)	600mg
첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸(KP)	80mg
파라옥시벤조산프로필(KP)	20mg

【성상】

갈색의 유리병 또는 불투명한 백색의 플라스틱병 또는 알루미늄 호일포장에 든 딸기향이 있는 무색 내지 미황색의 시럽제

【효능·효과】

다음 질환에서의 기침 : 급·만성기관지염

【용법·용량】

성인 : 레보드로프로피진으로서 1회 60mg을 1일 3회 적어도 6시간 간격을 두고 경구투여한다.

소아 : 레보드로프로피진으로서 적어도 6시간 간격을 두고 투여한다.

10~20 kg : 1회 18mg을 1일 3회 경구투여한다.

20~30 kg : 1회 30mg을 1일 3회 경구투여한다.

연령, 증상에 따라 적절히 증감한다.

【사용상의 주의사항】

1. 다음 환자에는 투여하지 말 것.

- 1) 이 약 또는 이 약의 구성성분에 과민반응이 있는 환자
- 2) 기관지 점액 분비 증가 환자
- 3) 점액섬모기능이상(카르타게너증후군, 섬모이상운동증) 환자
- 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부
- 5) 중증의 간장애 환자

2. 다음 환자에는 신중히 투여할 것.

- 1) 중증 심부전 및 중증 신장부전 환자
- 2) 고령자
- 3) 만 2세 미만의 영아

3. 이상반응

- 1) 소화기계 : 구역, 탄산증, 소화불량, 설사, 구토
- 2) 중추신경계 : 피로, 기능쇠약, 반수, 혼수, 두통, 어지러움
- 3) 순환기계 : 심계항진
- 4) 피부 : 매우 드물게 알레르기 반응

4. 일반적 주의

드물게 반수상태가 초래되므로 운전이나 기계 조작 시 주의하며, 특히 알코올과 병용 시 작용이 증대 될 수 있다.

5. 상호작용

예민한 환자에게 진정제와 병용투여 시 주의한다.

6. 임부 및 수유부에 대한 투여

임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부에는 투여하지 않는다.

7. 보관 및 취급상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관한다.
- 2) 다른 용기에 바꾸어 넣는 것은 사고원인이 되거나, 품질유지면에서 바람직하지 않으므로 주의한다.

【저장방법】

차광기밀용기, 실온(1~30℃)보관

【포장단위】

10mL, 10mL×90포, 75mL, 500mL

【제품문의처】

한미약품(주) 소비자상담실 : 080-916-9000 (수신자요금부담)

※ 본 제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 보상받을 수 있습니다.
(구입 시 사용기한 또는 유통기한이 경과되었거나 변질, 변패, 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환 또는 환불하여 드립니다.)

※ 사용기한이 경과한 제품은 복용하지 마십시오.

※ 주의

1. 처방된 증상, 처방된 환자 이외에는 사용하지 마십시오.
2. 사용 후에는 뚜껑을 꼭 닫아 보관하십시오.

제품 개봉 시 또는 취급 시에 포자재(용기, 케이스)에
상처를 입을 수 있으니 주의하십시오.

설명서 개정연월일 : 2014. 03. 13

제조의뢰자:

Hanmi 한미약품(주)

(본사)서울특별시 송파구 위례성대로 14
(공장)경기도 화성시 팔탄면 무하로 214

제조사:

한국콜마(주) 세종특별자치시 전의면 산단길 245

※ 의약품을 사용하기 전에 사용자께서는
설명서를 주의깊게 읽으시고, 설명서를 의약품과 함께 보관하십시오.

※ 이 제품설명서 작성(개정)연월일 이후 변경된 내용은 한미약품(주) 홈페이지(www.hanmi.co.kr)의 제품정보 또는 제품문의처 전화를 통해 확인하실 수 있습니다.

8 801121 007310

Ver. 00731003