

※ 복용전에 사용설명서를 숙지하시고 의약품과 함께 보관하십시오.

정부공인 KGMP
적격업체제품

일 반 의 약 품
분류번호 : 398

클로미딘정

건조레드클로버엑스

【성분 · 함량】

1정 중
건조레드클로버엑스(별규) 100mg
(총 이소플라본으로서 40mg 이상)
첨가제(타르색소) : 적색40호 알루미늄레이크, 청색1호 알루미늄레이크, 퀴놀린황색 알루미늄레이크

【성 상】

클로버 모양의 분홍색 필름코팅정

【효능 · 효과】

갱년기의 다음 증상의 개선 : 홍조, 야한증, 감정기복으로 인한 화, 초조, 흥분, 불면증

【용법 · 용량】

1회 1~2정, 1일 1회

【사용상의 주의사항】

- 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 마십시오.
 - 호르몬 의존성 종양이 있는 환자
 - 임산부 및 수유부
 - 이 약은 유당(젖당)을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(galactose intolerance), Lapp 유당(젖당)분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스 흡수장애(glucose-galactose malabsorption) 등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안됩니다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 마십시오.
 - 에스트로겐, 프로게스테론, 안드로겐과 같은 호르몬제는 에스트로겐 수용체의 경쟁적 억제작용으로 잠재적 위험이 발생할 수 있으므로 이 약과 함께 복용하여서는 안됩니다.
 - H₂ 저해제(억제제) 또는 proton pump 저해제(억제제)는 병용(함께 복용)투여 시 식물성 에스트로겐의 작용을 감소시킬 수 있습니다.
 - 쿠마린계 약물(와파린)과 병용(함께 복용)투여 시 약물상호작용이 나타날 수 있습니다.
- 이 약을 복용하는 동안 다음의 행위를 하지 마십시오.
이 약의 주성분인 이소플라본은 모유로 이행되므로 수유하는 동안 이 약을 복용해서는 안됩니다.
- 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항
 - 이 약은 상용량에서 특별한 이상반응은 없었으며 12주 동안 실시된 위약(속임 약) 대조임상시험 후에 체중의 증가가 나타나지 않았습니다.
 - 아주 드물게 편두통, 설사, 발진, 여드름, 근육통 등(1% 미만)이 보고되었습니다.
- 저장상의 주의사항
 - 20~30℃의 서늘하고 직사광선이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
 - 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오
 - 오용(잘못 복용)을 피하고 품질을 보호하기 위하여 다른 용기에 넣어 보관하지 마십시오.

【포장단위】 30정

【저장방법】 차광밀폐용기, 실온(1~30℃)보관

- * 본품을 구입할 때 사용기한이 경과하였거나 변질, 변패 또는 오손된 제품은 구입처를 통하여 교환하여 드립니다.
- * 본제품은 공정거래위원회 고시 소비자분쟁해결기준에 의거 교환 또는 보상 받을 수 있습니다.
- * 의약품 용어설명 및 기타 자세한 의약품 정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>) → 「정보마당」 → 「의약품 정보」를 참조하십시오.

〈이 첨부문서 작성일자 이후 변경된 내용은 www.seoulpharma.com이나 (080)780-1931에서 확인할 수 있습니다.〉

최종작성일자 : 2010. 04. 12

원료공급 및 기술제휴 - 스위스

L I N N E A



마음까지 건강하게
(주)서울제약
경기도 시흥시 정왕동 1248-8번지
문의전화 : (080)780-1931