



[분류번호 : 219 기타의 순환계용약]

[일반의약품]

[유효성분의 명칭 및 분량]

마늘가루300mg

[성상]

정당의 원색적 논쟁

[해설 · 해답]

죽상 동맥경화의 예방

[50] [51]

12세 이상의 소아 및 성인 : 1회 1정, 1일 3회

[사용상의 주의사항]

1. 이 약을 복용(사용)하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 마십시오.
마늘에 대해 알레르기가 있거나 혈액응고 장애가 있는 경우 복용하지 말고, 다른 의약품, 특히 항응고에 영향을 미치는 의약품을 함께 복용할 경우 반드시 의사와 상담하십시오.
2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용(사용)하기 전에 의사, 약사와 상의하십시오.
 - 1) 임신 또는 임신 가능성이 있는 부인에는 치료상의 유익성이 위험성을 상회(웃돌, 웃돌다)한다고 판단되는 경우에만 투여하십시오.
 - 2) 수유부에는 마늘성분이 모유로 전달될 수 있다는 보고가 있으므로, 이 약을 복용하는 경우에는 수유를 금하십시오.
 - 3) 12세 미만의 소아에 대한 안전성은 확립되어 있지 않으므로 복용을 제한하십시오(사용 경험이 없음).
3. 다음과 같은 경우 이 약의 복용(사용)을 즉각 중지하고 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 이 제품설명서를 소지하십시오.
 - 1) 과량 복용 후에 오심, 구토, 복통, 설사와 같은 위장장애가 나타나는 경우 중독을 고려하여야 하며, 고용량의 신선한 마늘의 복용 후 출혈이 개별사례로 보고된바 있습니다.
 - 2) 오심, 구토, 복통, 설사와 같은 위장장애, 경증(경증상, 가벼운 증상) 혈압감소(주로 고용량 복용 후), 드물게 알레르기 반응이 나타날 수 있으며, 증상이 지속되는 경우 복용을 즉각 중지하고, 의사, 약사의 상담을 받으십시오.
 - 3) 4~6주 이상 복용한 후에도 증상의 개선이 없는 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고, 의사, 약사와 상의하십시오.
4. 다음 환자에는 투여하지 마십시오.
이 약은 유당을 함유하고 있으므로, 갈락토오스 불내성(Galactose intolerance), Lapp 유당분해효소 결핍증(Lapp lactase deficiency) 또는 포도당-갈락토오스

흡수장애(Glucose-galactose malabsorption)등의 유전적인 문제가 있는 환자에게는 투여하면 안 됩니다.

5. 기타 이 약의 복용(사용)시 주의할 사항

- 1) 본 의약품을 규칙적으로 복용하지 않을 경우 효능에 영향을 미칠 수도 있습니다.
- 2) 본 의약품 복용과 함께 피부 및 호흡에 따른 냄새 변화가 있을 수도 있습니다.

6. 상호작용

- 1) 혈압강화제: 혈압강화 작용을 상승시킬 수 있습니다.
- 2) 항응고제: 항응고 작용을 상승시킬 수 있습니다.

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 2) 의약품을 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용(잘못 사용)에 의한 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관하십시오.
- 3) 본 제품은 25℃이하에서 보관하십시오.

[제조번호 및 사용기한] 외포장 하단에 별도표기

[저장방법] 밀폐용기, 25℃이하 보관

[포장단위] 100정

※ 사용기간 또는 유효기간이 경과되었거나 변질·변패·오염되었거나 손상된 의약품은 약국개설자 및 의약품판매업자를 통하여 교환하여 드립니다.

※ 의약품 용어 설명 및 기타 상세한 의약품 정보는 이지드럭(<http://ezdrug.kfda.go.kr>)→[정보마당]→[의약품등정보]를 참조 하십시오.

※ 기타 자세한 사항은 알리코제약(주) 080-585-0004으로 문의하시기 바랍니다.

설명서 최종개정연월일 : 2010년 6월 1일

제조원



KLOSTERFRAU
HEALTHCARE GROUP

Klosterfrau Berlin GmbH,
Motzener Strasse 41, 12277 Berlin, Germany

수입원

5h 비엘엔에이치(주)

서울시 구로구 구로4동 97-3 대림오피스밸리 9층
Tel : 02-3281-9072~4
<http://www.blmh.co.kr>

판매원



서울시 서초구 양재동
70-5번지 알리코제약빌딩
Tel. 080-585-0004

